




13.634

OVIDIU GACEU

Elemente de
climatologie practică



Ovidiu Gaceu

ELEMENTE DE CLIMATOLOGIE PRACTICĂ

Donat pentru Biblioteca
Universității "Al.I. Cuza" Iași

Iași, 29.10.2009

O. Gaceu

Ovidiu Gaceu

ELEMENTE DE CLIMATOLOGIE PRACTICĂ

328 957



317628

B.C.U. IASI

Editura Universității din Oradea
2002

Referenți științifici:

Prof. univ. dr. Gheorghe Măhăra – Universitatea din Oradea

Prof. univ. dr. Octavia Bogdan – Universitatea din Sibiu

Cercet. șt. pr. I dr. Carmen Dragotă – Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
GACEU, OVIDIU

Elemente de climatologie practică / Gaceu, Ovidiu. –

Oradea: Editura Universității din Oradea, 2002

p.195; 20,5 cm.

Bibliogr.

ISBN 973 – 613 – 216 – 1

551.58

Grafica: Ioan Gaceu

Maria Gallantai

Tehnoredactare: Ioan Gaceu

Corectura: Ramona Malița

Tipar: METROPOLIS SRL, Oradea

Tel.: 472 640, 0788 845 160

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE.....	9
1. ORGANIZAREA OBSERVAȚIILOR METEOROLOGICE	11
2. PRELUCRAREA PRIMARĂ, CONTROLUL DATELOR REZULTATE DIN OBSERVAȚIILE METEOROLOGICE ȘI TIPURILE DE TABELE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA STUDIILOR CLIMATICE.....	13
3. PRELUCRAREA DATELOR REZULTATE DIN OBSERVAȚIILE METEOROLOGICE ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNEI SINTEZE CLIMATICE GENERALE.....	20
3.1. Omogenizarea șirurilor de observații meteorologice.....	20
3.1.1. Metoda diferențelor.....	20
3.1.2. Metoda corelației.....	22
3.2. Aducerea șirurilor scurte de observații la perioade multianuale (prelungirea șirurilor de date).....	23
3.2.1. Metoda diferențelor.....	24
3.2.2. Metoda rapoartelor.....	25
3.3. Prelucrarea datelor privind temperatura aerului.....	27
3.3.1. Temperatura medie.....	27
3.3.2. Temperaturile extreme.....	28
3.3.3. Amplitudinea termică.....	30
3.3.4. Abaterile temperaturilor medii anuale față de media multianuală.....	30
3.3.5. Frecvența zilelor cu diferite temperaturi caracteristice.....	33
3.3.6. Probabilitatea de producere și gradul de asigurare a diferitelor valori de temperatură.....	35
3.3.7. Data trecerii temperaturilor medii zilnice prin diferite praguri, durate și suma de grade realizate pentru fiecare interval.....	37
3.3.8. Variațiile de lungă durată ale temperaturii aerului...	38
3.3.9. Indicii de temperatură.....	40
3.4. Prelucrarea datelor privind umezeala aerului.....	42
3.4.1. Valorile medii zilnice, decadaie, lunare și anuale...	42
3.4.2. Frecvența medie a zilelor cu diferite valori ale umidității relative.....	43

3.4.3. Variațiile de lungă durată ale umezelii aerului.....	45
3.5. Prelucrarea datelor privind nebulozitatea atmosferică...	46
3.5.1. Valorile medii zilnice, decadaie, lunare și anuale..	46
3.5.2. Frecvența medie a zilelor cu diferite grade de înnorare.....	47
3.5.3. Frecvența genurilor de nori.....	48
3.5.4. Variațiile de lungă durată ale nebulozității.....	49
3.6. Prelucrarea datelor privind durata de strălucire a Soarelui.....	50
3.6.1. Sumele zilnice, decadaie, lunare și anuale ale duratei de strălucire a Soarelui.....	51
3.6.2. Numărul zilelor cu soare.....	52
3.6.3. Frația de insolație.....	53
3.6.4. Variațiile de lungă durată ale duratei de strălucire a Soarelui.....	54
3.7. Prelucrarea datelor privind precipitațiile atmosferice...	55
3.7.1. Cantitatea medie lunară, anotimpuală, semestrială și anuală.....	55
3.7.2. Cele mai mari și cele mai mici cantități lunare, anotimpuale și anuale.....	58
3.7.3. Probabilitatea de producere și gradul de asigurare a diferitelor cantități de precipitații.....	59
3.7.4. Abaterea cantităților anuale de precipitații față de media multianuală.....	61
3.7.5. Frecvența zilelor cu diferite cantități de precipitații	64
3.7.6. Cantitatea de precipitații maximă în 24 ore.....	65
3.7.7. Ploile torențiale.....	67
3.7.8. Indicii pluviometrici.....	68
3.7.9. Variațiile de lungă durată ale precipitațiilor atmosferice.....	75
3.8. Prelucrarea datelor privind presiunea atmosferică.....	77
3.9. Prelucrarea datelor eoliene.....	78
3.9.1. Frecvența și viteza medie și maximă, lunară și anuală a vântului pe direcții cardinale.....	78
3.9.2. Viteza medie a vântului indiferent de direcție.....	79
3.9.3. Frecvența vântului pe intervale de viteze.....	81

3.10. Prelucrarea datelor privind principalele fenomene meteorologice.....	83
3.10.1. <i>Data medie de producere a primului și ultimului strat de zăpadă</i>	84
3.10.2. <i>Durata medie posibilă a stratului de zăpadă</i>	85
3.10.3. <i>Probabilitatea de producere a primului și ultimului strat de zăpadă</i>	85
3.10.4. <i>Datele extreme de apariție a primului și ultimului strat de zăpadă</i>	88
3.10.5. <i>Durata maximă posibilă a stratului de zăpadă</i> ...	89
3.10.6. <i>Grosimea medie și maximă decadală a stratului de zăpadă</i>	90
3.10.7. <i>Numărul de zile cu sol acoperit cu zăpadă</i>	91
3.10.8. <i>Intervalul de risc pentru stratul de zăpadă</i>	92
3.11. Intocmirea diagramelor climatice.....	93
3.11.1. <i>Curbele de variație</i>	93
3.11.2. <i>Climograma Walter – Lieth</i>	94
3.11.3. <i>Climograma Péguy</i>	95
3.11.4. <i>Diagrama bilanșului hidric lunar</i>	97
3.12. Întocmirea hărților climatice.....	99
3.12.1. <i>Metoda izoliniilor</i>	99
3.12.2. <i>Metoda fondului calitativ</i>	101
3.12.3. <i>Metoda arealelor</i>	103
3.12.4. <i>Metoda punctelor</i>	105
3.12.5. <i>Metoda liniilor în mișcare</i>	105
3.12.6. <i>Metoda cartogramei</i>	106
3.12.7. <i>Metoda cartodiagramei</i>	107
4. PRELUCRAREA DATELOR METEOROLOGICE ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI STUDIU BIOCLIMATIC.....	108
4.1. <i>Indicii de temperatură</i>	108
4.2. <i>Indicii de umezeală</i>	111
4.3. <i>Indicii de temperatură – umezeală</i>	113
4.4. <i>Indicii de presiune</i>	114
4.5. <i>Indicii de stres bioclimatic</i>	115
4.5.1. <i>Indicele de stres bioclimatic cutanat</i>	115
4.5.2. <i>Indicele de stres bioclimatic pulmonar</i>	116
4.5.3. <i>Indicele de stres bioclimatic total</i>	118

5. PRELUCRAREA DATELOR METEOROLOGICE IN VEDEREA REALIZĂRII UNUI STUDIU CLIMATO - TURISTIC.....	119
5.1. Indicii climato - turistici.....	119
5.1.1. <i>Indicii elementari.....</i>	120
5.1.2. <i>Indicele climato-marin.....</i>	123
5.1.3. <i>Indicele planetar.....</i>	125
5.1.4. <i>Indicele biomedical.....</i>	128
5.2. Tipurile de timp.....	129
5.2.1. <i>Metoda Feodorov-Ciubukov.....</i>	129
5.2.2. <i>Metoda meteorologilor brazilieni.....</i>	134
5.2.3. <i>Metoda meteorologilor canadieni.....</i>	137
5.2.4. <i>Metoda Besancenot-Mounier-Lavenne.....</i>	139
6. MIC DICȚIONAR DE TERMENI CLIMATICI.....	145
7. ANEXE.....	173
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.....	187

CUVÂNT ÎNAINTE

În peisajul învățământului geografic românesc, Universitatea din Oradea se afirmă tot mai mult cu deplin succes. Mărturie sunt preocupările susținute pentru un învățământ de calitate pe care îl desfășoară cadrele didactice vârstnice și mai tinere, cu tot sufletul și cu tot interesul de a forma buni specialiști care să corespundă necesităților majore pe care le incumbă dezvoltarea durabilă a societății contemporane.

Unul din principiile acestei dezvoltări durabile este și acela, conform căruia, resursele naturale care se exploatează să nu lase "răni" în mediul înconjurător, iar produsul finit să poarte, în valoarea lui, acea parte destinată refacerii și conservării acestuia. Ca urmare, se impune necesitatea de a respecta calitatea mediului înconjurător, iar societatea modernă contemporană să contribuie în permanență la îmbunătățirea ei. Pentru aceasta sunt necesari însă specialiști care să monitorizeze nu numai activitățile economice, ci și factorii de mediu, care, adesea, amplifică impactul antropic și contribuie la degradarea lui.

Din acest punct de vedere, în cadrul acestei universități există preocupări permanente pentru un învățământ geografic de înaltă ținută științifică. Printre multiplele discipline în care se studiază mediul sub diferitele sale componente, există și discipline care studiază cel mai dinamic component al său, *atmosfera*, atât sub aspect meteorologic, cât și climatic și de risc.

Recent (în 2001), literatura de specialitate s-a îmbogățit cu un curs de *Meteorologie*, elaborat de distinsul profesor dr. Gh. Măhăra, care întrunește toate calitățile unui curs modern și competitiv. La scurt timp, în același an, a apărut un nou volum intitulat *Elemente de meteorologie practică* elaborat de tânărul cadru didactic doctorand, Ovidiu Gaceu, care își urmează profesorul pe un drum continuu ascendent, volum care completează în chip fericit, prin valoarea sa practică, noțiunile predate la cursul magistrului său. Anul acesta (2002), același tânăr cadru didactic ne prezintă un nou volum intitulat *Elemente de climatologie practică* menit să completeze, de asemenea activitatea didactică destinată desăvârșirii pregătirii profesionale în domeniul respectiv.

Acest ultim volum, care face obiectul prezentării de față, are o deschidere mult mai largă decât domeniul strict citat. El se adresează, în egală măsură, atât studenților, primii chemați să-și însușească limbajul corect și abc-ul acestei discipline, cât și cadrelor didactice de profil din învățământul superior și tehnic de specialitate și, de asemenea,

cercetătorilor și tuturor specialiștilor din domeniul meteorologiei, climatologiei, protecției și conservării mediului înconjurător.

Volumul de față este foarte bine structurat și reflectă concepția integralistă a autorului de a cunoaște cât mai mult, dacă nu totul, despre latura aplicativă a climatologiei. Lucrarea poartă cititorul prin toate treptele cunoașterii, începând cu metodologia efectuării observațiilor, continuând cu prelucrarea datelor statistice în scopuri climatice, bioclimatice, climato-turistice etc., pentru ca, în final, să prezinte un mic dicționar de termeni de specialitate.

Metodologia prelucrării datelor statistice este ordonată pe elemente climatice (temperatură, umezeală relativă, nebulozitate, durata de strălucire a Soarelui, precipitații, vânt presiune atmosferică, diferite fenomene climatice), direcționate pe cele trei mari domenii invocate: climă, bioclimă și turism.

De asemenea, *reprezentările grafice* care constituie expresia vizuală a interpretării datelor statistice, sunt foarte bine selectate și explicate, astfel încât acestea să devină mijloace operaționale de lucru. Din acest punct de vedere, un rol important revine curbelor de variație anuală și multianuală și tendinței de variație a unor elemente climatice, diagramelor, histogramelor, climogramelor, precum și hărților climatice generale și speciale.

În finalul volumului *cei 180 de termeni explicați* largesc și mai mult orizontul cunoașterii cu alte noțiuni prezentate în ordine alfabetică, în scopul creșterii utilității practice a lucrării.

Conchidem apreciind că acest volum are un vădit caracter științific, metodologic și mai ales practic. El constituie un îndreptar util și absolut necesar pentru stăpânirea celor mai diverse metode de cercetare, pentru oricine care dorește să cunoască "secretele" acestui domeniu de studii; căci tot ce se prezintă în acest volum are ca mesaj final să contribuie la formarea unor buni specialiști, unor buni cercetători care să cunoască, să interpreteze și să monitorizeze toți factorii meteorologici sau climatici ce pot deveni factori de risc, în vederea punerii la adăpost a tuturor bunurilor materiale.

Așadar, o nouă apariție universitară într-o editură universitară la fel de prestigioasă cum este însăși universitatea căreia îi aparține.

Publicarea acestui volum va aduce mari servicii, nu numai climatologiei, dar și geografiei în ansamblul ei care are nevoie de mijloace operaționale concrete.

Prof. univ. dr. Octavia Bogdan

1. ORGANIZAREA OBSERVAȚILOR METEOROLOGICE

Valoarea științifică a concluziilor desprinse în urma analizei datelor meteorologice depinde de calitatea și cantitatea observațiilor efectuate la stațiile meteorologice, motiv pentru care se acordă o atenție deosebită problemelor referitoare la:

- *locul de amplasare a stațiilor meteorologice;*
- *densitatea stațiilor meteorologice;*
- *durata perioadei de observație;*
- *standardizarea instrumentelor și a metodelor de observație*

(Dumitrescu, Glăja, 1972).

Amplasarea stațiilor meteorologice trebuie să respecte regulile impuse de Organizația Meteorologică Mondială (OMM), astfel încât valorile elementelor meteorologice măsurate să nu fie influențate de topografia locului, de vegetația, de apele sau de clădirile învecinate. Fiecare stație trebuie să aibă un istoric care să cuprindă descrierea detaliată, planul poziției sale, eventuala mutare a ei și cauzele care au impus evenimentul respectiv. Dacă stația a fost mutată pe un nou amplasament este necesar ca o perioadă să funcționeze în paralel cu cea veche, pentru ca ulterior, cele două serii de observații să poată fi corelate. Pentru a evita aceste probleme, se recomandă instalarea stației în condiții cât mai bune care să rămână constante o perioadă foarte lungă de timp (INMH, 1995).

Densitatea stațiilor meteorologice depinde de variabilitatea elementelor meteorologice într-o anumită regiune. Astfel, într-o regiune joasă puțin fragmentată se pot amplasa un post pluviometric la 100 km², un post termohidrometric la 500 km², un post barometric, anemometric și heliografic la 5000 km², iar pentru studiul ploilor torențiale un post la 20 km². În schimb, într-o regiune montană cu o circulație atmosferică accentuată, cu elemente fizico-geografice foarte variabile, în funcție de altitudine și orientare se impune o rețea de stații meteorologice mult mai densă (Grisollet et.al., 1964; Dumitrescu, Glăja, 1972).

Durata perioadei de observații prezintă o mare importanță pentru studiul climatului regional și trebuie să fie cât mai mare pentru a atenua efectul variațiilor întâmplătoare. Astfel, în regiunile în care variabilitatea elementelor meteorologice este mai puțin accentuată sunt suficienți 30 ani, iar în cele montane supuse unei variabilități mai mari a circulației atmosferice este necesară, mai ales pentru precipitații, o perioadă de 50 ani. De asemenea, pentru studiul variațiilor de lungă durată ale elementelor climatice sunt necesare serii de date foarte lungi, peste 100 ani, continue și omogene.

Durata perioadei normale depinde de o serie de factori precum: începutul observațiilor în țară, variabilitatea elementelor, momentul schimbării metodelor și aparatelor de observație. Perioada de bază luată în analiză nu este obligatorie pentru toți autorii, așa cum se poate observa și în tabelul nr.1.

Obligatoriu este ca pentru analiza unui element climatic, stațiile meteorologice luate în considerare să aibe o perioadă comună. Dacă observațiile sunt incomplete și perioada este neomogenă, se recurge la omogenizarea șirurilor de date prin metode statistico-matematice specifice (vezi cap. 3).

Tabelul nr. 1 - Durata perioadei normale de observații (în ani) după diferiți autori

Elementul / Autorul	Kostin	Alisov	Clima RSR
Temperatura medie	50-55	60-70	60
Temperaturi extreme	45	-	-
Intervalul fără îngheț	45	15-20	-
Temperatura solului	20	-	-
Umiditatea relativă	30-35	35-45	50
Tensiunea vaporilor	30-35	35-45	30
Nebulozitatea	25	-	50
Durata strălucirii Soarelui	10-15	-	15
Precipitațiile atmosferice	45	-	55
Stratul de zăpadă	15-20	-	30
Presiunea atmosferică	45-55	-	60
Vântul	15-20	-	15

Standardizarea instrumentelor și a metodelor de observație conform normelor O.M.M. este necesară pentru a putea compara valorile rezultate din observațiile meteorologice.

2. PRELUCRAREA PRIMARĂ, CONTROLUL DATELOR REZULTATE DIN OBSERVAȚIILE METEOROLOGICE ȘI TIPURILE DE TABELE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA STUDIILOR CLIMATICE

Prelucrarea primară a datelor de observație meteorologică reprezintă prima etapă, de pregătire, a acestor date în vederea realizării analizei climatice și constă în aplicarea corecțiilor la valorile citite cu ajutorul instrumentelor meteorologice, descifrarea diagramelor de la aparatele înregistratoare, verificarea rezultatelor observațiilor meteorologice și întocmirea tabelelor lunare. Toate aceste operații trebuie efectuate conform instrucțiunilor în vigoare, la toate stațiile meteorologice sau, pentru unele cazuri, la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie (INMH), în cadrul laboratorului de metodică prelucrării climatice a datelor.

Controlul tehnic al datelor rezultate din observațiile meteorologice se efectuează în scopul sesizării și îndepărtării eventualelor erori, verificării corectitudinii calculelor în vederea obținerii sumelor și mediilor decadaale, lunare, a frecvențelor și a extragerii extremelor. De asemenea, șeful stației are obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise în tabelele meteorologice, concordanța care trebuie să existe între diferite elemente cum ar fi între creșterea nebulozității și scăderea duratei de strălucire a Soarelui, între creșterea nebulozității și scăderea temperaturii aerului, între creșterea umezelii aerului și intensificarea ceații și scăderea vizibilității etc. Controlul tehnic de la stații trebuie făcut cu mare atenție, astfel încât să se aibă în vedere toate elementele și fenomenele meteorologice. De asemenea, se va verifica modul în care au fost prelucrate diagramele și datele care trebuie înscrise pe ele (INMH, 1995).

În final, specialiștii de la birourile meteorologice (Biroul meteorologic Oradea, Biroul meteorologic Timișoara etc.), realizează *controlul tehnic integral* care presupune compararea datelor meteorologice obținute la stațiile amplasate în condiții geografice asemănătoare, răspândite pe o suprafață extinsă cum ar fi, de exemplu, Câmpia Banato-Crișană sau dintr-un bazin hidrografic (Crișuri, Someș, Timiș etc.) și *analiza critică*.

Ultimul și cel mai eficient control al datelor se efectuează în cadrul I.N.M.H., unde se validează fiecare valoare a fiecărui element meteorologic, în funcție de caracteristicile specifice: circulația aerului, condițiile genetice, specificitatea elementului analizat etc.

După realizarea controlului tehnic, datele meteorologice se transcriu în tabele, sunt publicate în anuare meteorologice sau se înregistrează pe suporturi magnetice, putând fi utilizate de climatologi sau alți specialiști pentru analize și interpretări științifice (Dumitrescu, Glăja, 1972; Erhan, 1999).

Datele de observație meteorologică sunt înscrise în *tabele meteorologice lunare sau anuale*.

Tabelele meteorologice lunare, în funcție de elementele cuprinse, pot fi de mai multe tipuri:

- *tabela TM_1* conține datele privitoare la observațiile și măsurătorile efectuate la orele climatologice (0, 6, 12, 18) asupra principalelor elemente și fenomene meteorologice. Astfel, pe prima pagină sunt incluse indicații cu privire la denumirea stației, numărul său de ordine, coordonatele geografice, altitudinea absolută a stației, înălțimea rezervorului barometrului deasupra nivelului mării, tipul barometrului, numărul și corecția lui instrumentală, luna și anul pentru care este alcătuită tabela respectivă. În cadrul mai multor coloane sunt incluse:

- *valorile presiunii atmosferice* pentru orele 0, 6, 12, 18, suma și media acestor valori exprimate în milibari;

- *valorile temperaturii aerului* pentru cele patru termene de observație, suma și media lor, valorile maxime și minime de temperatură și amplitudinea termică;

- *valorile umezelii relative a aerului* exprimate la termenele climatologice și calculate sub formă de sumă și medie zilnică;

- *corecțiile termometrului de minimă* pentru termenele 6 și 18.

Toate aceste valori ale elementelor meteorologice sunt notate pentru fiecare zi din luna respectivă, iar în sinteză la partea finală a paginii sunt incluse datele cu privire la:

- cea mai mare și cea mai mică valoare a presiunii atmosferice din luna respectivă și datele producerii lor;

- cea mai mare și cea mai mică valoare termică medie zilnică și datele producerii acestora;

- maxima și minima absolută termică lunară și datele la care au fost înregistrate;

- numărul nopților geroase (temperatura minimă $\leq -10^{\circ}\text{C}$);

- numărul zilelor de iarnă (temperatura maximă $\leq 0^{\circ}\text{C}$);

- numărul zilelor de îngheț (temperatura minimă $\leq 0^{\circ}\text{C}$);

- numărul zilelor de vară (temperatura maximă $\geq 25^{\circ}\text{C}$);

- numărul zilelor tropicale (temperatura maximă $\geq 30^{\circ}\text{C}$);

- numărul nopților tropicale (temperatura minimă $\geq 20^{\circ}\text{C}$);

- numărul zilelor cu temperaturi medii zilnice cuprinse între diferite limite (din 5 în 5°C);

- tensiunea maximă și minimă a vaporilor de apă și datele la care s-au produs;

- deficitul de saturație, maxima din observații și ziua în care s-a produs;

- umezeala relativă minimă și data de înregistrare a acesteia;

- numărul zilelor în care cel puțin la unul din termenele de observație, umezeala relativă a fost $\leq 30\%$ și $\leq 50\%$;

- numărul zilelor în care, la ora 12, umezeala relativă a fost $\geq 80\%$;

- temperatura suprafeței solului pentru cele patru ore climatologice, suma și media acestora, valorile maxime și minime ale temperaturii solului la orele 6 și 18;

- starea suprafeței solului.

Pe cealaltă pagină a tabelului TM_1 sunt înscrise:

- datele privind nebulozitatea totală și inferioară la termenele climatologice, sumele și mediile pentru cele două tipuri de nebulozitate și genul norilor și existența ceții la cele patru termene de observație;

- datele referitoare la vizibilitate determinată la orele climatologice, suma și media acestora; direcția și viteza mediată (pe intervalul de două minute); viteza maximă la rafală; viteza maximă și direcția vitezei maxime a vântului; viteza vântului măsurată la anemometru (2 m) la cele patru termene climatologice, sumele și mediile acestora;

- cantitatea precipitațiilor atmosferice la orele 6 și 18, totalul acestora, grosimea stratului de zăpadă, indicații privind unele fenomene meteorologice și durata acestora.

În partea de jos a paginii există mai multe rubrici rezumative care cuprind frecvențe simple, selective (pe diferite praguri) și procentuale ale vântului, ale vizibilității, ale nebulozității și ale precipitațiilor; numărul de zile și durata (ore și minute) fenomenelor meteorologice (vezi anexa, pag. 173 - 174).

Tabela TM_2 cuprinde datele referitoare la cantitatea de apă provenită din apă sau zăpadă, respectiv:

- cantitatea de apă măsurată la termenele 6 și 18 și totalul acestora;

- grosimea stratului de zăpadă;

- fenomenele atmosferice care s-au produs de la ora 18 din ajun până la ora 18 din ziua respectivă;

- sumele decadice și totalul lunar al cantităților de precipitații;

- cantitatea maximă în 24 ore;

- numărul zilelor cu precipitații;

- numărul zilelor cu anumite cantități de precipitații ($\geq 0,1$; $0,5$; $1,0$; $2,0$; $5,0$; $10,0$; $20,0$; $30,0$);

- numărul zilelor cu fenomene atmosferice, respectiv ploaie, burniță, zăpadă, lapoviță, grindină, ceață, aer cețos, păclă, rouă, brumă, chiciură, polei, solul acoperit cu zăpadă, manifestări electrice, fulgere, furtună de praf și viscol.

Datele orare ale precipitațiilor atmosferice se notează în tabelele TM_3 și TM_4 .

Tabela TM_3 cuprinde datele obținute din descifrarea pluviogramelor în raport cu punctele caracteristice, când ploile au avut o intensitate $\geq 0,04$ mm/min, oferind informații privind cantitatea, durata și intensitatea ploilor pe intervale caracteristice, data, începutul ploii, durata intervalului și intensitatea ploilor în intervalul dat (vezi anexa, pag. 175).

Tabela TM_4 conține valorile orare ale precipitațiilor atmosferice obținute din descifrarea pluviogramelor:

- cantitatea de apă căzută în intervalele orare de la 0-1 până la 23-24 și durata în minute a căderii acestor cantități pentru fiecare interval orar sub formă de fracție având la numărător cantitatea, iar la numitor durata;

- cantitatea de apă calculată pentru intervalul 0-24 și în intervalul orar 18-18 pentru fiecare zi;

- durata precipitațiilor în 24 ore obținută prin însumarea duratelor parțiale din intervalele orare;

- totalul lunar al cantităților de precipitații calculat pentru fiecare interval orar (vezi anexa, pag. 176).

Tabela TM_5 conține valorile orare obținute din descifrarea termogramelor, barogramelor și higrogramelor:

- valorile pentru cele 24 de ore ale unei zile;

- sumele pentru fiecare zi, decadă și lună, precum și media pentru fiecare zi și lună;

- media zilnică obținută din valorile de la termenele climatologice, diferențele obținute între media zilnică din 4 ore de observație;

- maxima, minima și amplitudinea zilnică (vezi anexa, pag. 177 - 178).

Tabela TM_6 cuprinde datele orare ale duratei de strălucire a Soarelui obținute din descifrarea heliogramelor, respectiv:

- durata strălucirii Soarelui pentru fiecare oră din zi și pentru fiecare zi din lună;

- sumele zilnice și lunare;

- suma duratei efective, a duratei posibile;

- fracția de insolație;

- maximă în 24 ore;
- numărul zilelor cu și fără Soare (vezi anexa, pag. 179).

Tabela TM₇ se referă la datele privind depunerile de gheață pe conductorii aerieni, respectiv:

- data, diametrul și grosimea depunerii;
- greutatea, durata creșterii stratului de gheață și durata fenomenului;

- date privind grosimea stratului de zăpadă, nebulozitatea, felul norilor, fenomenele atmosferice, direcția și viteza vântului și temperatura aerului care evidențiază condițiile în care au avut loc depunerile de gheață (vezi anexa, pag. 180 - 181).

Mai nou datele zilnice de observație se introduc în *Registrul de observații meteorologice* care cuprinde mai multe rubrici codificate după cum urmează: Z (ziua); Ora (UTC); i_R (include grupa 6); I_x (include grupa 7); h, m (înălțimea bazei norilor); vv, km (vizibilitatea orizontală); N (nebulozitatea totală); dd (direcția vântului); ff (viteza vântului); cod (caracteristica vântului); Vr (viteza rafalei); Va (viteza la anemometru); C I (citirea I); C II (citirea II); s_n (semnul); TTT (valoarea temperaturii aerului); Uh (valoarea umezelii aerului măsurată la higrometru); Tv (valoarea tensiunii vaporilor); Ds (valoarea deficitului de saturație); $T_d T_d T_d$ (valoarea temperaturii punctului de rouă); s_n (semnul pentru punctului de rouă); Tss (semnul și valoarea temperaturii solului); Ta (temperatura termometrului alipit la barometrul cu mercur); Pb (valoarea presiunii indicată de barometrul cu mercur); Pcb (valoarea corectată a presiunii atmosferice); P (valoarea presiunii transformată din mm în mb); 0^0C (corecția de temperatură); Nm (corecția la nivelul mării); semn (tendința barică); a (caracteristica tendinței barice); ppp (valoarea tendinței barice); în clar (cantitatea de precipitații în clar); t_R (durata perioadei cu precipitații); stare timp ww (starea timpului în momentul observației); $w_1 w_2$ (starea timpului pe trecut); N_h (norii mijlocii și inferiori); gen și specie CL (genul și specia norilor Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus); gen și specie CM (genul și specia norilor Altocumulus, Alostratus, Nimbostratus); gen și specie CH (genul și specia norilor Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus); nume (numele observatorului); fenomene meteorologice; însemnări și constatări finale (vezi anexa pag. 184 - 185).

Tabelele meteorologice anuale cuprind:

Tabela TM₁₁ reprezintă sinteza anuală a tuturor observațiilor meteorologice și cuprinde:

- valorile medii, maxime și minime lunare și datele la care au avut loc aceste extreme ale presiunii atmosferice;

- mediile lunare, extremele absolute, frecvența zilelor cu anumite temperaturi caracteristice, frecvența nopților geroase, a zilelor de iarnă, cu îngheț, de vară, tropicale și a nopților tropicale în cazul temperaturii aerului;

- tensiunea medie a vaporilor de apă la orele de observație, media lunară și media anuală, deficitul de saturație cu valorile medii lunare, orare, media de la ora 12, maxima din orele de observație și data când a avut loc, media anuală, umezeala relativă de la orele de observație, media lunară, minima din orele de observație, numărul zilelor cu umezeală relativă $\leq 30\%$, $\leq 50\%$, $\geq 80\%$ la ora 12 pentru umezeala aerului;

- nebulozitatea (totală și inferioară) este exprimată în zecimi, atât la orele de observație, cât și ca medii lunare ale acestora; numărul de zile cu anumite grade de înnorare de la orele de observație, felul norilor, cazurile cu timp senin și a celor în care nu s-au făcut aprecieri asupra norilor, precum și cauzele care au determinat aceste situații;

- vizibilitatea este marcată sub forma frecvenței pe grupe de valori codificate;

- caracteristicile vântului, frecvența și viteza pe cele opt direcții cardinale, viteza medie la orele de observație, viteza medie lunară și frecvența vitezei vântului pe intervale de intensități (0-1, 2-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-24, 25-28, 29-34, 35-40 și peste 40 m/s) sunt marcate pe verso;

- precipitațiile atmosferice sunt înscrise sub forma sumelor decadice și lunare, a maximelor din 24 ore, a numărului zilelor cu precipitații și a frecvenței zilelor cu anumite valori ale precipitațiilor;

- stratul de zăpadă este notat prin valorile grosimii decadice (în cm) și ale densității pentadice;

- temperatura solului este înscrisă prin mediile lunare și anuale, maximele și minimele, datele de producere a acestora, precum și numărul zilelor cu temperatura solului $\leq 0^{\circ}\text{C}$.

Tabela TM – 12 în varianta calculator, se execută pe baza unui program adecvat (Fox Pro sau Excel), folosind datele din tabelele lunare TM – 2C de la posturile pluviometrice (observații meteorologice zilnice efectuate la orele 06 și 18 UTC). Cuprinde: cantitățile zilnice de precipitații, precum și sumele lunare și anuale ale precipitațiilor atmosferice, cantitatea maximă căzută în 24 ore; numărul zilelor cu anumite cantități de precipitații, numărul zilelor cu diferite fenomene meteorologice, numărul zilelor cu precipitații lichide sau solide; date despre grosimea stratului de zăpadă.

Tabela TM – 13 cuprinde datelele anuale privind cantitatea, durata și intensitatea ploilor pe intervale caracteristice; cuprinde numai ploile semnificative care au fost notate pe puncte caracteristice, cele nesemnificative nu se înscriu în tabelă.

Tabela TM – 16 cuprinde datelele anuale privind durata orară de strălucire a Soarelui. În cadrul ei, fiecărei luni a anului îi corespunde câte un rând în care se înscriu sumele lunare pe intervale orare, fracția de insolație și numărul zilelor cu soare (vezi anexa, pag. 182 - 183).

Tabela TM – 17 reprezintă sinteza datelor lunare și anuale rezultate din măsurători speciale asupra depunerilor de gheață pe conductorii aerieni ai chiciuometrului (vezi anexa, pag. 186).

3. PRELUCRAREA DATELOR REZULTATE DIN OBSERVAȚILE METEOROLOGICE ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNEI SINTEZE CLIMATICE GENERALE

3.1. Omogenizarea șirurilor de observații meteorologice

Pentru a realiza un studiu climatic de calitate, datele de observații meteorologice trebuie să fie *exacte* și *omogene*, respectiv să reflecte fidel evoluția vremii la o anumită stație meteorologică, într-un anumit interval de timp, observațiile fiind efectuate după aceeași metodologie și cu aceleași tipuri de instrumente. În situațiile în care *elementele meteorologice suferă modificări determinate de alți factori decât cei naturali*, precum schimbarea tipurilor de instrumente, schimbarea amplasamentului platformei meteorologice, modificarea programului de observații, schimbarea instrucțiunilor meteorologice, uzarea aparaturii etc., seriile (șirurile) de observații pot deveni neomogene, incompatibile între ele pe anumite perioade, deci inutilizabile pentru realizarea studiilor climatice. În aceste cazuri, pentru a omogeniza șirurile de observații se utilizează metode speciale (metoda diferențelor, metoda corelației) care se bazează pe principiul conform căruia procesele atmosferice care afectează o anumită regiune, imprimă elementelor meteorologice măsurate la stațiile din spațiul respectiv o evoluție concordantă ilustrată de reprezentările grafice ale acestora.

Astfel, scăderea valorilor unui element meteorologic analizat trebuie să se producă la toate stațiile situate în perimetrul respectiv, deoarece procesele atmosferice afectează spații mari și acționează în același sens pentru toate punctele apropiate.

3.1.1. Metoda diferențelor

Utilizată și prezentată de multă vreme în lucrările de climatologie din România (Belozarov, Fărcaș, 1971; Dumitrescu, Glăja, 1972; Fărcaș, 1988; Erhan, 1999 etc.), metoda diferențelor se folosește în cazul elementelor cu variabilitate redusă de la un an la altul: presiunea atmosferică, viteza vântului, temperatura aerului, umezeala aerului și nebulozitatea.

Metoda constă în calcularea diferențelor dintre valorile unui element la două stații situate în condiții similare, în scopul verificării, consultării și corectării neomogenităților. Astfel, dacă începând cu un anumit an se constată apariția unei creșteri sau a unei scăderi a valorilor în șirul de date al unei stații, se va stabili care dintre acestea are șirul neomogen, respectiv se compară datele celor două stații cu cele de la o a treia stație, situată în vecinătate, cu șir omogen verificat. În final,

studiind istoricul stației cu șir neomogen se precizează și cauza care a dus la apariția acelei neomogenități în șirul de date.

Considerăm, spre exemplu, două stații A și B (tabelul 2) cu șir de observații asupra temperaturii aerului în luna septembrie în perioada 1881-1955.

Tabelul 2 - Temperatura medie lunară a lunii septembrie (1881-1955).

Corectarea seriei neomogene de la stația B după stația A.

Anul	Stația A	Stația B	Diferența	Stația B – valori corectate
1881	14,4	15,7	1,3	15,2
1882	16,6	17,3	0,7	16,8
1883	15,9	16,8	0,9	16,3
1884	14,3	15,0	0,7	14,5
1885	15,3	15,9	0,6	15,4
1886	15,7	16,3	0,6	15,8
1887	16,9	17,6	0,7	17,1
1888	16,9	17,8	0,9	17,3
1889	13,2	14,7	1,5	14,2
1890	14,0	14,8	0,8	14,3
1891	16,2	16,7	0,5	16,2
1892	16,5	16,9	0,4	16,4
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
1940	15,7	16,4	0,7	15,9
1941	11,3	12,7	1,4	12,2
1942	17,5	17,9	0,4	17,4
1943	17,0	17,9	0,9	17,4
1944	15,7	16,7	1,0	16,2
1945	15,6	16,3	0,7	15,8
1946	17,5	17,8	0,3	17,8
1947	15,4	15,9	0,5	15,9
1948	15,3	15,4	0,1	15,4
1949	14,4	14,6	0,2	14,6
1950	16,5	16,8	0,3	16,8
1951	16,7	16,9	0,2	16,9
1952	15,9	16,3	0,4	16,3
1953	15,5	15,7	0,2	15,7
1954	16,4	16,7	0,3	16,7
1955	14,4	14,6	0,2	14,6
Media z: 1881 – 1945			0,8	
Media w: 1946 – 1955			0,3	
Corecția z – w			-0,5	

Sursa: Erhan, 1999

Calculând diferențele dintre valorile acestora, se constată că în perioada 1881-1945, stația B are valori încorecte, deoarece diferențele dintre cele două stații sunt mult prea mari ($0,4-1,5^{\circ}\text{C}$), față de perioada 1946-1955 ($0,1-0,5^{\circ}\text{C}$). Utilizând relația:

$$x = y + (z - w), \text{ în care:}$$

x – temperatura medie corectată a stației B pentru perioada neomogenă, pe care trebuie să o găsim din calcule;

y – temperatura necorectată din perioada cu șir neomogen de la stația B;

z – diferența medie a temperaturilor în perioada omogenă;

w – diferența medie a temperaturilor dintre cele două stații în perioada neomogenă;

$z-w$ – corecția care trebuie aplicată valorilor din perioada neomogenă,

pentru luna septembrie a anului 1881, s-a determinat valoarea corectată a temperaturii aerului la stația B, respectiv $15,2^{\circ}\text{C}$, valoare obținută în urma aplicării corecției de $-0,5^{\circ}\text{C}$ (corecția având semnul minus, se scade).

3.1.2. Metoda corelației

Se folosește pentru omogenizarea șirurilor de date referitoare la elementele climatice cu mare variabilitate în timp și spațiu precum precipitațiile atmosferice, stratul de zăpadă sau fenomenele meteorologice.

De exemplu, pentru a compara valorile anuale sau semestriale (semestrul rece, semestrul cald) ale cantităților de precipitații înregistrate în aceeași perioadă la două stații A și B, se construiește un grafic de corelație, în care pe axa orizontală se notează valorile de precipitații înregistrate la stația A, iar pe axa verticală, cele de la stația B, care vor fi verificate (figura 1). În continuare se marchează printr-un punct valorile medii de precipitații căzute în sezonul rece. Pentru fiecare punct (valoare) se notează prescurtat și anul înregistrării. Dacă stațiile sunt amplasate la mică distanță una de alta, în condiții similare și dacă observațiile s-au făcut corect, valorile de precipitații înregistrate la cele două stații vor fi dispersate grupat. În final, prin centrul lor începând din origine, se va trasa o linie dreaptă în așa fel, încât suma distanțelor punctelor așezate de o parte și de alta a acesteia să fie egale, dreapta respectivă numindu-se *linia de dependență* sau *linia de corelație*.

Din figura 2 rezultă că în perioada 1953-1959, toate punctele sunt deplasate mult spre dreapta celor din perioada 1937-1952, deci pentru

ambele perioade se poate trasa câte o linie de corelație care trece prin originea axelor de coordonate.




Fig. 1. Corelația cantităților de precipitații în sezonul rece pentru stațiile A și B cu șiruri de observații omogene (după Erhan, 1999).




Fig. 2. Corelația cantităților de precipitații în sezonul rece pentru stațiile A și B cu șiruri de observații neomogene (după Erhan, 1999, cu completări).

Considerând (în urma analizei istoricului stației) că la stația B șirul este neomogen, este necesar să se aplice un *coeficient de corecție* care se poate calcula cu ajutorul graficului de corelație din fig. nr. 2. Pentru aceasta se citesc valorile precipitațiilor p_1 și p_2 pentru stația B pe ambele linii de dependență pentru o anumită valoare (spre exemplu 100 mm) de pe axa verticală (ordonată). Acestei valori îi corespunde pe prima linie (interioară) valoarea $p_1 = 79$ mm, iar pe linia exterioră valoarea $p_2 = 150$ mm. Raportând p_2 la p_1 obținem un coeficient de corecție de 1,9 care indică valoarea cu care au crescut cantitățile de precipitații de la stația B în a doua perioadă. Așadar, pentru a omogeniza șirul de date al stației B, trebuie ca toate valorile perioadei în care a avut loc creșterea precipitațiilor (1937-1952) să fie recalculat, respectiv înmulțite cu valoarea coeficientului de corecție.

3.2. Aducerea șirurilor scurte de observații la perioade multianuale (prelungirea șirurilor de date)

După cum am mai menționat, pentru studierea climei unei regiuni sunt necesare date exacte și omogene, rezultate din perioade lungi de observație efectuate sincron la mai multe stații meteorologice. Din păcate, stațiile meteorologice au fost înființate pe rând, iar alteori observațiile au fost întrerupte, astfel încât datele sunt de cele mai multe ori incomparabile.

Pentru a aduce șirurile scurte de observații la o perioadă normală după datele studiilor cu șiruri lungi, se folosesc aceleași metode: a diferențelor și a rapoartelor (graficelor de corelație).

3.2.1. Metoda diferențelor

Se utilizează în cazul elementelor cu variabilitate redusă de la un an la altul: presiunea aerului, umiditatea aerului, frecvența nebulozității.

Luăm ca exemplu stația Făgăraș (Dumitrescu, Glăja, 1972), stație care deși a fost înființată în anul 1924, dispune de un șir scurt de observații (1938-1959), datorită frecvențelor întreruperi în activitate. Pentru a prelungi șirul de date de la stația Făgăraș vom utiliza datele de la Sibiu, stație apropiată, amplasată în condiții similare și care dispune de un șir lung și omogen de date (1896-1959).

Tabelul 3 - Temperatura medie a aerului la Făgăraș obținută prin metoda diferențelor după datele de la stația Sibiu

Anul	Temperatura medie anuală		Diferența
	Sibiu	Făgăraș	
1938	9,1	8,4	-0,7
1939	9,5	8,7	-0,8
1940	7,2	7,1	-0,1
1941	8,2	7,7	-0,5
1942	-	-	-
1943	9,2	8,1	-1,1
1944	-	-	-
1945	8,5	7,9	-0,6
1946	9,9	9,4	-0,5
1947	9,6	8,6	-1,0
1948	9,0	8,2	-0,8
1949	8,8	8,1	-0,8
1950	10,0	9,1	-0,9
1951	10,0	9,4	-0,6
1952	9,7	8,7	-1,0
1953	8,7	8,3	-0,4
1954	8,2	7,7	-0,5
1955	8,8	8,5	-0,3
1956	8,2	7,3	-0,9
1957	9,6	8,6	-1,0
1958	9,2	8,7	-0,5
1959	8,1	7,4	-0,7
Media: 1938-1959	8,9	8,2	-0,7
Media: 1896-1959	8,9	8,2	

Sursa: Dumitrescu, Glăja, 1972.

Calculând diferențele dintre mediile din fiecare an de la cele două stații în perioada comună (tabelul 3), se observă că acestea oscilează puțin, respectiv între $-0,3$ și $-1,1^{\circ}\text{C}$, în timp ce valorile măsurate la Sibiu variază între $7,2^{\circ}\text{C}$ și $9,4^{\circ}\text{C}$. Diferențele dintre valori sunt relativ constante, deci se poate prelungi șirul de date de la Făgăraș după valorile de la Sibiu, sens în care valorii de temperatură medie multianuală de la Sibiu i se aplică diferența medie calculată pentru perioada comună:

$$t = 8,9^{\circ}\text{C} - 0,7^{\circ}\text{C} = 8,2^{\circ}\text{C}$$

3.2.2. Metoda rapoartelor

Se folosește la prelungirea șirurilor scurte ale precipitațiilor atmosferice, grosimii stratului de zăpadă, duratei insolației, numărului de zile cu diferite fenomene meteorologice (Dumitrescu, Glăja, 1972).

Calculând mediile pentru perioada comună de observații la două stații, se obține raportul:

$$R = \frac{h(B_n)}{h(A_n)}, \text{ în care:}$$

R – raportul;

$h(A_n)$ – cantitatea medie pentru perioada comună de la stația cu șir lung;

$h(B_n)$ – cantitatea medie pentru perioada scurtă de observație de la stația la care se face prelungirea.

Cunoscând valoarea medie multianuală pentru seria lungă de observații (N) de la stația A , se poate calcula media pentru aceeași perioadă la stația B cu șir scurt, conform relației:

$$h(B_N) = h(A_N) \cdot R$$

De exemplu, pentru a stabili cantitatea medie multianuală de precipitații de la stația Făgăraș se utilizează ca stație de referință stația Sibiu care dispune de un șir lung de observații, seria scurtă fiind cuprinsă în perioada lungă a acesteia. Se calculează apoi cantitățile medii pentru o perioadă comună de 19 ani, atât la stația Făgăraș pentru care se face prelungirea, cât și la stația Sibiu.

$$h(B_n) = 731,6 \text{ mm}$$

$$h(A_n) = 628,4 \text{ mm}$$

$$R = \frac{h(B_n)}{h(A_n)} = \frac{731,6}{628,4} = 1,10.$$

Cantitatea medie de precipitații la Făgăraș, adusă la perioada de 110 ani a stației Sibiu, va fi:

$$628,4 \times 1,1 = 691,2 \text{ mm.}$$

Prelungirea șirurilor de date prin metoda rapoartelor se poate realiza și indirect, cu ajutorul *graficelor de corelație*. Pentru aceasta, datele de la stația cu șir lung se suprapun pe axa orizontală, iar cele de la stația cu șir scurt, pe axa verticală. Pe grafic se notează apoi, prin puncte, datele de la cele două stații, precum și anul în care s-au înregistrat. Punctele astfel obținute trebuie să se distribuie în mod proporțional în jurul unei drepte care trece prin originea axelor de coordonate. Media plurianuală de la stația cu șir lung se va proiecta pe linia de dependență, iar perpendiculara dusă din acest punct pe axa verticală va indica valoarea medie plurianuală pentru stația cu șir scurt de observații (figura 3).

Prelungirea șirului de date este cu atât mai corectă, cu cât gradul de împrăștiere a punctelor în jurul liniei de dependență este mai redus.




Fig. 3 – Graficul de corelație a cantităților de precipitații din perioada rece a anului la stațiile Sibiu și Făgăraș (după Dumitrescu, Glăja, 1972).

3.3. Prelucrarea datelor privind temperatura aerului

Temperatura aerului reprezintă unul din elementele climatologice de bază ce caracterizează în mare măsură condițiile climatice ale unei regiuni, motiv pentru care într-un studiu climatic, acest element trebuie analizat cât mai detaliat.

Temperatura aerului, prin evaporația și înghețul apei, prin contractarea și dilatarea unor materiale etc., influențează un mare număr de procese fizice și biologice, fapt pentru care cunoașterea valorilor acestui element este necesară în numeroase domenii de activitate precum agronomia, zootehnia, silvicultura, transporturile, construcțiile etc.

Principali parametri care caracterizează temperatura aerului sunt:

- temperatura medie;
- temperatura extremă;
- amplitudinea termică;
- abaterile valorilor termice anuale față de media plurianuală;
- frecvența zilelor cu diferite valori de temperatură;
- probabilitatea de producere și gradul de asigurare a diferitelor valori de temperatură;
- data trecerii temperaturii medii zilnice prin diferite praguri, durata și suma temperaturilor realizate în fiecare interval: >0 , >5 , >10 , >15 , $>18^{\circ}\text{C}$;
- variațiile de lungă durată ale temperaturii aerului;
- indicii de temperatură.

3.3.1. Temperatura medie

Valorile medii ale temperaturii aerului se stabilesc prin calcul, raportând suma termenilor la numărul lor și pot fi: *orare, diurne, decadale, lunare, anotimpuale, anuale și plurianuale.*

Spre exemplu, *media diurnă* a temperaturii calculată după valorile înregistrate la termenele climatologice (0, 6, 12, 18), este dată de relația:

$$m = \frac{t_0 + t_6 + t_{12} + t_{18}}{4}$$

Astfel, dacă la stația meteorologică Nușfalău, în data de 15 iulie 2002, la cele patru termene de observație, s-au înregistrat în ordine:

21,8⁰C, 17,5⁰C, 31,9⁰C și 29,4⁰C, temperatura medie a zilei respective va fi dată de relația:

$$t = \frac{21,8+17,5+31,9+29,4}{4} = 25,1^{\circ}\text{C}$$

Așadar *media* temperaturii aerului exprimă *starea mijlocie* a succesiunii în timp a valorilor termice, cu ajutorul acestui parametru putându-se aprecia dacă într-o anumită localitate, regiune fizico-geografică sau administrativă ori țară, verile sunt răcoroase sau călduroase, dacă iernile sunt aspre sau blânde etc., deci permite compararea particularităților climatice ale diferitelor unități geografice.

3.3.2 Temperaturile extreme

Acest parametru servește la caracterizarea completă a climei (valorile medii sunt de cele mai multe ori insuficiente) și indică limitele reale între care oscilează valorile temperaturii aerului într-o anumită regiune, motiv pentru care are o mare importanță teoretică și practică.

Tabelul 4 – Temperaturile extreme anuale și absolute și amplitudinile extreme anuale și absolute la Stâna de Vale (1979-1998)

Temperatura extremă (°C)				Amplitudinea extremă anuală (°C)
Maxima anuală		Minima anuală		
Data	Valoarea (°C)	Data	Valoarea (°C)	
03.08.1979	27,3	06.01.1979	-28,2	55,5
06.08.1980	25,2	29.01.1980	-24,4	49,6
03.08.1981	28,3	09.01.1981	-24,9	53,2
27.06.1982	27,5	09.01.1982	-24,2	51,7
02.08.1983	25,7	23.02.1983	-23,2	48,9
13.07.1984	26,8	14.02.1984	-22,8	49,6
26.08.1985	27,3	17.02.1985	-26,4	53,7
03.08.1986	25,5	28.02.1986	-27,4	52,9
20.07.1987	29,6	31.01.1987	-28,9	58,5
06.07.1988	29,2	22.02.1988	-22,3	51,5
16.08.1989	26,0	11.12.1989	-23,6	49,6
31.07.1990	26,5	06.01.1990	-19,5	46,0
17.06.1991	28,0	01.02.1991	-25,9	53,9
28.08.1992	29,3	23.02.1992	-24,4	53,7
20.07.1993	27,5	31.01.1993	-22,7	50,2
11.08.1994	28,6	16.02.1994	-23,0	51,6
23.07.1995	25,5	15.01.1995	-23,0	48,5
08.07.1996	28,0	28.12.1996	-25,0	53,0
29.06.1997	26,0	18.12.1997	-25,0	51,0
03.08.1998	28,7	12.12.1998	-22,6	51,3
Maxima absolută		Minima absolută		Amplit. extr. abs.
20.07.1987	29,6	31.01.1987	-28,9	

Temperatura extremă poate fi: *anuală* (cea mai mare și cea mai mică valoare de temperatură înregistrată într-un an), *absolută* (cea mai mare și cea mai mică valoare înregistrată într-o perioadă multianuală) și *mijlocie* (media maximelor și media minimelor lunare și anuale).

Valorile extreme lunare, anuale și absolute se extrag din tabelele meteorologice, în dreptul fiecăreia notându-se și data apariției (tabelul 4), iar extremele mijlocii se obțin calculând media maximelor și minimelor diurne (tabelul 5).

Din tabelul 4 rezultă că la Stâna de Vale temperaturile extreme anuale au oscilat între $-28,9$ și $29,6^{\circ}\text{C}$, ambele valori fiind înregistrate în anul 1987, la data de 31 ianuarie, respectiv 20 iulie. Aceste valori reprezintă, în același timp, și temperaturile extreme absolute înregistrate la Stâna de Vale în perioada 1979-1998.

Tabelul 5, arată că la aceeași stație meteorologică, temperaturile extreme mijlocii au oscilat între $-1,7^{\circ}\text{C}$, în anul 1985 și $11,2^{\circ}\text{C}$, în anul 1994.

Tabelul 5 – Temperaturile extreme mijlocii și amplitudinile extreme mijlocii la Stâna de Vale (1979-1998)

Anul	Temperatura extremă mijlocie ($^{\circ}\text{C}$)		Amplitudinea extremă mijlocie ($^{\circ}\text{C}$)
	maxima (media maximelor lunare)	minima (media minimelor lunare)	
1979	10,1	0,1	10,0
1980	8,6	-1,2	9,8
1981	9,6	-1,1	10,7
1982	10,8	-1,1	11,9
1983	10,3	-0,9	11,2
1984	9,7	-1,0	10,7
1985	9,3	-1,7	11,0
1986	10,6	-1,3	11,9
1987	9,5	-1,7	11,2
1988	9,9	-1,0	10,9
1989	10,5	-0,7	11,2
1990	10,9	-0,6	11,5
1991	9,6	-1,2	10,8
1992	10,5	-1,1	11,6
1993	10,1	-1,3	11,4
1994	11,2	0,4	10,8
1995	9,8	-0,9	10,7
1996	9,4	-0,9	10,3
1997	9,3	-1,3	10,6
1998	9,6	-1,0	10,6
	11,2	-1,7	12,9

Sursa: Arhiva I.N.M.H.

3.3.3. Amplitudinea termică

Se obține ca diferență între valorile maxime și minime ale temperaturilor aerului luate ca medii sau extreme, în funcție de care deosebim *amplitudinea absolută* (tabelul 4, tabelul 5) și *amplitudinea medie* (diurnă, lunară, anuală, multianuală). Din cele două tabele menționate mai sus, rezultă că la Stâna de Vale, în perioada 1979-1998, amplitudinea termică absolută a fost de $58,5^{\circ}\text{C}$ (în anul 1987), iar cea mai mare amplitudine termică medie a fost de $12,9^{\circ}\text{C}$. Valorile nu foarte ridicate ale amplitudinilor termice de la Stâna de Vale, indică un climat mai puțin excesiv datorat rolului moderator al muntelui.

3.3.4. Abaterile temperaturilor medii anuale față de media multianuală

Temperaturile medii calculate pentru un interval de timp reprezintă "normala" sau mijlocia multianuală a temperaturilor în punctul respectiv, față de care valorile lunare și anuale ale temperaturii aerului, înregistrate lună de lună și an de an, pot diferi, motiv pentru care se calculează sensul și valoarea acestor abateri de la o lună la alta sau de la un an la altul.

Pentru aceasta, se urmărește numărul de cazuri în care temperatura a depășit sau a fost sub valoarea medie (normală), considerată arbitrar și zero relativ, apoi cazurile respective se exprimă în procente care reprezintă frecvența abaterilor pozitive sau negative în regiunea analizată.

De asemenea, se calculează valoarea abaterilor pozitive și negative față de medie, iar pe baza pragurilor abaterilor se poate stabili caracterul termic al lunilor și al anilor dintr-o perioadă multianuală, conform criteriului Hellman (tabelul 6).

Tabelul 6 – Caracterul termic al lunilor și anilor după criteriul Hellman

Abaterea medie lunară ($^{\circ}\text{C}$)	Abaterea medie anuală ($^{\circ}\text{C}$)	Calificativul
$> 10,0$	$> 5,0$	excesiv de cald
$5,1 \dots 10,0$	$2,1 \dots 5,0$	foarte cald
$2,1 \dots 5,0$	$1,1 \dots 2,0$	cald
$1,1 \dots 2,0$	$0,6 \dots 1,0$	călduros
$-1,0 \dots 1,0$	$-0,5 \dots 0,5$	normal
$-2,0 \dots -1,1$	$-1,0 \dots -0,6$	răcoros
$-5,0 \dots -2,1$	$-2,0 \dots -1,1$	rece
$-10,0 \dots -5,1$	$-3,0 \dots -2,1$	foarte rece
$< -10,0$	$< -3,0$	excesiv de rece

Exemplificăm tot cu stația meteorologică Stâna de Vale, la care în perioada 1979-1998, s-a înregistrat o temperatură medie de $3,9^{\circ}\text{C}$. Față de această temperatură medie multianuală, cele mai mici și cele mai mari valori medii anuale de temperatură au oscilat între $3,1^{\circ}\text{C}$, în anul 1985 și $5,2^{\circ}\text{C}$, în anul 1994, deci au prezentat abateri cuprinse între $-0,8^{\circ}\text{C}$ și $+1,3^{\circ}\text{C}$, motiv pentru care conform criteriului Hëllman (tabelul 6), anii 1980 și 1985 sunt considerați răcoroși, anul 1994, cald; anii 1979 și 1990 sunt călduroși, iar ceilalți ani sunt considerați normali din punct de vedere termic. În ansamblu, se remarcă o ușoară dominare a abaterilor negative care reprezintă 50% din numărul total de cazuri, față de cele pozitive, 30% din cazuri, în timp ce în 20% din situații nu s-au înregistrat abateri de la media multianuală, deci, valorile anuale au coincis cu normala (tabelul 7). Concluzia generală care se desprinde din această analiză este că la Stâna de Vale, variațiile neperiodice ale temperaturii aerului, determinate de circulația diferitelor tipuri de mase de aer, nu sunt foarte pronunțate datorită rolului moderator al muntelui.

Tabelul 7 – Abaterile valorilor termice față de media plurianuală la Stâna de Vale

Anul	Media anuală ($^{\circ}\text{C}$)	Media multianuală ($^{\circ}\text{C}$)	Abaterea ($^{\circ}\text{C}$)	
			+	-
1979	4,6	3,9	0,7	
1980	3,2	3,9		-0,7
1981	3,8	3,9		-0,1
1982	3,9	3,9	0	0
1983	4,1	3,9	0,2	
1984	3,7	3,9		-0,2
1985	3,1	3,9		-0,8
1986	3,7	3,9		-0,2
1987	3,4	3,9		-0,5
1988	3,9	3,9	0	0
1989	4,2	3,9	0,3	
1990	4,4	3,9	0,5	
1991	3,6	3,9		-0,3
1992	4,2	3,9	0,3	
1993	3,9	3,9	0	0
1994	5,2	3,9	1,3	
1995	3,9	3,9	0	0
1996	3,8	3,9		-0,1
1997	3,5	3,9		-0,4
1998	3,8	3,9		-0,1
Abaterea (%)	+		30	
	-			50

Sursa: Arhiva INMI

Reprezentarea grafică a abaterilor valorilor termice anuale față de valorile plurianuale se face sub formă de coloane care indică valoarea abaterilor pozitive sau negative din fiecare an, în $^{\circ}\text{C}$, față de media multianuală, considerată arbitrar zero relativ sau normală.

Calcularea abaterilor, în $^{\circ}\text{C}$, la stația meteorologică Stâna de Vale s-a făcut astfel: pentru anul 1979, când s-a înregistrat o temperatură




Fig. 4 - Abaterile valorilor termice anuale față de media plurianuală la Stâna de

medie de $4,6^{\circ}\text{C}$, față de media multianuală de $3,9^{\circ}\text{C}$, făcând diferența dintre cele două valori, s-a obținut o abatere de $+0,7^{\circ}\text{C}$. Calcularea abaterilor în procente s-a făcut cu ajutorul regulei de trei simplă, respectiv s-a urmărit numărul de cazuri în care temperatura medie anuală a depășit sau a fost sub valoarea medie multianuală, cazurile respective fiind exprimate apoi în procente. Astfel, din totalul de 20 cazuri posibile care reprezintă 100%, în 6 cazuri temperatura medie anuală a fost peste media multianuală, deci abaterile pozitive s-au înregistrat în procent de 30%.

$$\text{Exemplu: } 20 \text{ cazuri} \dots\dots\dots 100\% \qquad x = \frac{6 \cdot 100}{20} = 30\%$$

$$6 \text{ cazuri} \dots\dots\dots x$$

În 10 cazuri din cele 20 posibile care reprezintă 100%, temperatura medie anuală a fost sub cea medie multianuală, deci abaterile negative s-au înregistrat în procent de 50%, iar în 4 ani temperatura medie anuală a corespuns cu cea medie multianuală (20%).

Exemplu: 20 cazuri 100% $x = \frac{10 \cdot 100}{20} = 50\%$

10 cazuri x

3.3.5. Frecvența zilelor cu diferite temperaturi caracteristice

În caracterizarea climatică a unei regiuni interesează în mod deosebit *frecvența lunară și anuală* a zilelor și a nopților peste sau sub anumite praguri caracteristice (tabelul 8), exprimată în număr de zile (Fărcaș, 1988).

Tabelul 8 – Zile și nopți cu diferite temperaturi caracteristice

Temperatura	Caracteristica
Min $\leq -10^{\circ}\text{C}$	Noapte geroasă
Max $\leq 0^{\circ}\text{C}$	Zi de iarnă
Min $\leq 0^{\circ}\text{C}$	Zi cu îngheț
Max $\geq 25^{\circ}\text{C}$	Zi de vară
Max $\geq 30^{\circ}\text{C}$	Zi tropicale
Min $\geq 20^{\circ}\text{C}$	Noapte tropicală

Tabelul 9 – Frecvența zilelor cu îngheț la Stâna de Vale

Anii	Numărul de zile cu îngheț ($t_{\min} \leq 0^{\circ}\text{C}$)													An
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1979	25	24	22	23	1	0	0	2	3	18	20	24	162	
1980	31	28	30	26	12	1	0	1	6	9	24	30	198	
1981	31	28	22	28	2	0	0	2	2	9	27	29	180	
1982	30	28	29	26	10	0	0	0	0	13	29	22	187	
1983	29	26	25	13	3	0	0	0	8	20	27	28	179	
1984	31	29	28	23	0	2	0	1	0	9	27	31	181	
1985	29	28	30	19	4	0	0	0	6	19	26	29	190	
1986	30	27	30	17	4	1	0	0	8	24	29	31	201	
1987	31	27	27	19	11	2	0	1	1	16	21	30	186	
1988	25	27	28	25	8	0	0	0	3	19	30	29	194	
1989	31	26	27	11	9	0	0	0	2	13	22	25	166	
1990	28	28	27	20	9	4	0	0	7	18	18	31	190	
1991	27	27	26	27	7	0	0	0	5	12	25	31	187	
1992	29	28	27	12	9	0	1	0	12	14	22	28	182	
1993	30	28	26	27	1	1	1	0	9	8	23	28	182	
1994	31	27	29	15	6	1	0	0	0	18	23	30	180	
1995	31	27	28	24	6	0	0	0	3	14	25	27	185	
1996	31	29	31	21	2	3	1	0	4	13	18	28	181	
1997	30	26	31	27	7	1	0	0	13	20	22	27	204	
1998	30	27	28	15	10	0	0	1	1	11	27	31	181	
Med	29,5	27,3	27,6	20,9	6,1	0,8	0,2	0,4	4,7	14,9	24,3	28,5	184,8	

Sursa: Arhiva INMH

În acest scop, din tabelele meteorologice, pentru fiecare *lună* în parte se extrage numărul zilelor cu anumite valori de temperatură. Însușind valorile respective și împărțind rezultatul obținut la numărul lunilor din șirul de ani luați în calcul, se obține *numărul mediu lunar* de zile cu temperaturi caracteristice (tabelul 9), care se reprezintă grafic prin coloane, pe același grafic putând fi reprezentate mai multe zile cu temperaturi caracteristice (figura 5).




Fig. 5 - Frecvența zilelor cu diferite temperaturi caracter la Stâna de Vale

Figura 5 arată că la Stâna de Vale cele mai multe zile cu îngheț și cele mai multe zile de iarnă se produc în luna ianuarie, 29,5 și respectiv 15 zile, iar cele mai multe zile de vară, 3,9 zile se produc în luna august.

Pentru a obține *frecvența anuală* se însumează valorile înregistrate în cele 12 luni ale anului fără să se facă media (spre exemplu, la Stâna de Vale s-au înregistrat 162 zile cu îngheț în anul 1979), iar pentru a obține *frecvența medie multianuală*, se însumează valorile anuale din șirul luat în calcul și se împarte la numărul anilor (184,8 zile cu îngheț la Stâna de Vale în perioada 1979-1998) (tabelul 9).

3.3.6. Probabilitatea de producere și gradul de asigurare a diferitelor valori de temperatură

În practică se folosesc datele referitoare la probabilitatea și gradul de asigurare a producerii anumitor valori lunare, anotimpuale și anuale de temperatură, care pot fi exprimate pe intervale de valori, pe intervale de abateri față de normală (Kostin, Pokrovskaia, 1964; Belozarov, Fărcaș, 1971).

Probabilitatea se calculează pe baza numărului de cazuri corespunzătoare fiecărui interval și se exprimă în procente. Asigurarea (probabilitatea totală) se obține prin însumarea frecvențelor în procente, plecând de la ultimul interval. În final, se obține asigurarea de 100% care corespunde intervalului cu cantitățile cele mai mici (tabelul 10).

Tabelul nr. 10 – Probabilitatea de producere și gradul de asigurare a valorilor lunare de temperatură la stația Stâna de Vale în perioada 1979-1998

Intervalul	Frecvența		
	Nr.cazuri	Probabilitatea (%)	Asigurarea % (suma frecvențelor)
17,9...16,0	1	0,4	99,7
15,9...14,0	7	2,9	99,3
13,9...12,0	36	15,0	96,4
11,9...10,0	22	9,1	81,4
9,9...8,0	17	7,1	72,3
7,9...6,0	23	9,6	65,2
5,9...4,0	13	5,4	55,6
3,9...2,0	15	6,2	50,2
1,9...0,0	24	10,0	44,0
-0,1...-2,0	18	7,5	34,0
-2,1...-4,0	27	11,2	26,5
-4,1...-6,0	19	7,9	15,3
-6,1...-8,0	14	5,8	7,4
-8,1...-10,0	3	1,2	1,6
-10,1...-12,0	1	0,4	0,4
Total	240		

Sursa: Arhiva INMH




Fig. 6 – Probabilitatea de producere și gradul de asigurare a valorilor de temperatură la Stâna de Vale în perioada 1979-1998

Valorile obținute se transpun sub forma unor curbe normale pe un grafic care are trecute pe ordonată frecvențele, iar pe abscisă mijlocul corespunzător intervalelor. Acest grafic servește la determinarea valorilor corespunzătoare unor asigurări caracteristice (20%, 50%, 80%, 95%), precum și a valorilor corespunzătoare asigurărilor minime și maxime. În acest sens din fig. 6 reiese că la Stâna de Vale, temperaturile medii lunare cuprinse între 12 și 13,9°C au cea mai mare frecvență, 15%, și cel mai mare grad de asigurare, 96,4 %. Probabilități mari de producere au și valorile de temperatură cuprinse între 6 și 7,9°C, între 0 și 1,9°C și între -2,1 și 4,0°C, dar aceste valori au un grad de asigurare mai mic, respectiv 65,2%, 44,0 % și 26,5 %. Graficul mai evidențiază că temperaturile medii lunare cu valori mai mari de 13,9°C și mai mici de -6,0°C, au probabilități mici, sub 6%, iar gradul de asigurare scade o dată cu scăderea valorilor de temperatură.

De reținut că această metodă se poate aplica și celorlalte elemente și fenomene meteorologice; spre exemplu, pentru determinarea probabilității și gradului de asigurare a diferitelor praguri termice calculate din 5 în 5 °C; a diferitelor intervale de viteze ale vântului (0-1; 2-5; 6-10; 10-15; >15 m/s); a zilelor cu umezeală relativă $\geq 80\%$ la ora 12 și $\leq 30\%$ la unul din termenele de observație; a numărului de zile cu grindină; numărului de zile cu oraje; a numărului de zile cu sol acoperit cu zăpadă.

3.3.7. Data trecerii temperaturilor medii zilnice prin diferite praguri, durate și suma de grade realizate în fiecare interval

În scopuri practice este necesară cunoașterea datelor de trecere a temperaturii prin anumite praguri, precum și durata medie a intervalului de timp cu temperaturi mai mari sau mai mici decât pragurile respective și suma temperaturilor realizate într-un anumit interval de timp (în $^{\circ}\text{C}$).

Spre exemplu, în agricultură interesează datele trecerii temperaturii medii zilnice ale aerului prin pragurile de: -5° ; 0° ; 5° ; 10° și 15°C , pentru diferite lucrări.

Determinarea acestor date se face cu ajutorul unui grafic propus de A. A. Șepelevski, care presupune înscrierea lunilor și zilelor pe axa orizontală și a valorilor de temperatură pe cea verticală. Se recomandă utilizarea următoarelor scări: 1 zi = 1 mm; $1^{\circ}\text{C} = 10$ mm. Temperaturile medii lunare se înscriu sub formă de coloane, având lățimea egală cu numărul de zile din luna respectivă și înălțimea egală cu valoarea medie plurianuală a temperaturii lunii respective. Prin mijlocul capătului superior al coloanelor se trasează curba temperaturii lunare care trebuie să aibă un mers uniform și să unească mijlocul capătului de sus al coloanelor în așa fel, încât partea exclusă din suprafața dreptunghiului să fie egală cu cea inclusă, curba având aspectul unui clopot (figura 7). Cu cât șirul de date este mai mare, cu atât curba seamănă mai mult cu un clopot.




Fig. 7 – Exemplu de întocmire a histogramei temperaturii aerului
histograma astfel construită permite aflarea următoarelor date:

- temperatura medie plurianuală pentru orice zi din an aflată la intersecția dreptei ridicate de pe abscisă, în dreptul zilei respective cu linia curbei.

- data medie de trecere a temperaturii medii zilnice prin anumite valori care se obține ducând o linie din dreptul valorii temperaturii respective pe curbă și de aici pe axa orizontală.

- durata medie a intervalului cu temperaturi mai mari sau mai mici decât pragurile stabilite.

- suma de grade dintr-un anumit interval de timp, care se obține delimitând mai întâi intervalul, numărând apoi zilele din fiecare lună aflate în acel interval și înmulțindu-le cu media lunii respective. În final, din valoarea obținută se scad gradele rămase în afara curbei clopotului.

Spre exemplu, la Stâna de Vale, datele medii de trecere a temperaturilor medii zilnice prin pragurile de 0°C , 5°C , 10°C se produc în ordine la 24 martie, 26 aprilie, 28 mai, iar de la valori pozitive la cele negative în a doua parte a anului, la 16 noiembrie, 15 octombrie, 7 septembrie. Numărul mediu al zilelor cu temperaturi $\geq 0^{\circ}\text{C}$, $\geq 5^{\circ}\text{C}$, $\geq 10^{\circ}\text{C}$ este de 63, 54, 102; primul și ultimul îngheț apar la 16 noiembrie, respectiv 23 martie, durata intervalului fără îngheț se cifrează la 238 zile etc. (Gaceu, 1997).

De reținut că histogramele se folosesc și pentru reprezentarea grafică a altor elemente climatice, cum este cazul cantităților medii lunare și maxime în 24 ore, al zilelor cu diferite caracteristici termice sau cu diferite valori ale umezelii relative, ale stratului de zăpadă etc.

3.3.8. Variațiile de lungă durată ale temperaturii aerului

Orice caracterizare climatică a unei regiuni trebuie să aibă în vedere și problema variațiilor de lungă durată a principalelor elemente climatice (temperatură, precipitații, presiune etc.) care are ca scop depistarea și evaluarea fluctuațiilor climei. Pentru aceasta, se folosesc șiruri foarte lungi, continue și omogene de observații meteorologice, de peste 100 de ani, pentru care se calculează valorile medii pe intervale succesive de 5, 10, 20 sau 30 ani, decalate succesiv cu câte un an, conform *metodei atenuării sau a mediilor alunecătoare (medii glisante)*, reducându-se astfel amplitudinile oscilațiilor accidentale și evidențiindu-se schimbările de lungă durată. Cu cât intervalul de glisare este mai mare, cu atât sunt atenuate mai mult oscilațiile minore și tendința de evoluție este mai clar exprimată. Spre exemplu, Bogdan (1980), Teodoreanu (1980) au utilizat intervale de glisare pe 5 ani;

Neacșa și colab. (1974), pe 35 ani; Dumitrescu, Glăja (1972), Iliescu (1994), pe 10 ani etc.

Considerând că intervalul de glisare este de zece ani, calculul mediilor se face pentru fiecare valoare din șirul de 10 ani, lunecând de fiecare dată cu un an, de-a lungul seriei de 10 ani:

$$m_1 = \frac{t_1 + t_2 + t_3 + \dots t_{10}}{10};$$

$$m_2 = \frac{t_2 + t_3 + t_4 + \dots t_{11}}{10};$$

$$m_3 = \frac{t_3 + t_4 + t_5 + \dots t_{12}}{10};$$

Valorile respective se transpun pe un grafic în care pe axa orizontală sunt marcate intervalele de glisare, iar pe cea verticală valorile de temperatură (figura 8). Curba rezultată scoate în evidență creșterea ușoară a temperaturii aerului în ultimele decenii la București - Filaret, ca urmare a intensificării procesului de urbanizare (Neacșa și colab., 1974).




Fig. 8 – Medii glisante pe intervale de câte 35 ani, la stația București-Filaret, în perioada 1891-1971 (după Neacșa și colab., 1974).

Menționăm că această metodă nu trebuie absolutizată, deoarece poate introduce cicluri sau tendințe false când se utilizează serii de numere absolut întâmplătoare, nefiind clar dacă trăsăturile curbei

ajustate se datorează unui fenomen fizic în sine sau procedurii utilizate. Din acest motiv este nevoie de o analiză mai riguroasă, ca de exemplu folosirea *polinoamelor ortogonale* sau a *analizei spectrale de putere*, conform descrierii din *Nota tehnică OMM nr. 79 - Schimbări climatice* (OMM, 1990).

3.3.9. Indicii de temperatură

Se utilizează în diferite scopuri practice. Unul dintre cei mai importanți este *tetraterma Mayr*, indice care se calculează ca medie a valorilor de temperatură a lunilor mai, iunie, iulie, august și care exprimă optimul termic al vegetației din perioada cu activitate biologică maximă. Valoarea lui scade o dată cu creșterea altitudinii, evidențiind astfel răcirea locală a climatului, fapt ce influențează gradul de dezvoltare a vegetației. La Stâna de Vale acest indice are valoarea de $11,5^{\circ}\text{C}$, la Borod crește la $11,7^{\circ}\text{C}$, iar la Oradea ajunge la $18,9^{\circ}\text{C}$.

Alt indice termic utilizat în studiile agroclimatice îl constituie *temperatura activă*, ce reprezintă valoarea de temperatură peste o anumită limită necesară plantelor pe întreaga perioadă de vegetație care diferă de la o cultură la alta. Se calculează cu ajutorul formulei:

$$t_a = n \cdot t, \text{ unde}$$

t_a – temperatura activă, cuprinsă între 10°C (limita inferioară) și 30°C (limita superioară);

t – temperatura medie zilnică;

n – durata perioadei de vegetație, în zile, în care temperatura medie zilnică este mai mare decât pragul temperaturii active, respectiv este cuprinsă între 10 și $25-30^{\circ}\text{C}$.

Selianinov, citat de Belozarov și Fărcaș (1971), arată că unele plante mai puțin pretențioase la căldură ca rapița, cartoful, sfecla, morcovul, inul au nevoie de căldură puțină, 1500°C , în timp ce plante precum roșia, porumbul au nevoie de $2000-2500^{\circ}\text{C}$, iar bumbacul și vița de vie $3000-3500^{\circ}\text{C}$.

Temperatura efectivă constituie un indice agroclimatic frecvent utilizat în studiile de specialitate, în vederea determinării minimului biologic sub care procesul de asimilare și dezasimilare nu mai este posibil. Minimul biologic depinde de tipul de plantă și de perioada de vegetație în care se află.

Temperatura efectivă se obține scăzând minimul biologic din valoarea temperaturii active, conform formulei:

$$t_e = nt - t_l, \text{ unde:}$$

t_e – temperatura efectivă;

nt – temperatura activă;

t_l – limita inferioară a temperaturii efective stabilită pentru fiecare cultură și perioadă de dezvoltare (minimul biologic).

Pentru porumb necesarul față de temperatura efectivă este de 1200-1350°C, în funcție de perioada de vegetație.

Indicele de temperatură "grade-zile" reprezintă diferența algebrică, exprimată în grade, între temperatura medie a unei zile date și o temperatură de referință, de exemplu 10°C sau 0°C. Pe o perioadă dată (luni, ani), acesta reprezintă suma algebrică a "gradelor-zile" ale diferitelor zile din perioada respectivă.

3.4. Prelucrarea datelor privind umezeala aerului

Umezeala aerului este caracterizată prin mai multe mărimi: *tensiunea vaporilor de apă, umezeala absolută, umezeala specifică, umezeala relativă, deficitul de saturație, starea higrometrică, punctul de rouă* care au mare importanță în studierea condițiilor de evaporare de la suprafața solului și a apei, în studiul secetelor, în vederea condiționării umezelii din spațiile închise etc. Principalele mărimi care se utilizează în aceste calcule sunt: umezeala absolută, umezeala relativă și deficitul de saturație. Mai frecvent se utilizează *umezeala relativă* pentru care se determină următorii parametri:

- valorile medii zilnice, decada, lunare și anuale;
- frecvența medie a zilelor cu diferite valori ale umezelii relative;
- variațiile de lungă durată ale umezelii aerului.

3.4.1. Valorile medii zilnice, decada, lunare și anuale

Aceste valori se prelucrează pe baza datelor din tabelele meteorologice, pe o perioadă multianuală ca în cazul temperaturii aerului (tabelul 11). Mediile zilnice și decada se pot obține și pe cale grafică pe baza metodei elaborate de Șepelevski (vezi cap. 3.3.7).

Tabelul 11 – Valorile medii lunare ale umezelii relative (%) la Stâna de Vale

Anii	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Med
1979	85	86	92	87	85	84	90	90	90	88	86	95	88,1
1980	90	85	92	88	88	90	89	88	94	89	95	96	90,3
1981	95	91	94	92	90	90	88	92	94	90	93	95	92,0
1982	95	92	90	91	87	89	91	93	90	89	83	89	89,9
1983	96	87	83	85	85	91	88	90	89	91	92	89	88,8
1984	92	90	90	82	88	88	88	91	92	89	90	93	89,4
1985	93	97	90	92	94	95	91	93	93	92	94	96	93,3
1986	98	95	93	90	92	92	94	89	91	89	92	94	92,4
1987	96	89	90	85	90	87	81	91	87	90	94	98	89,8
1988	95	92	94	92	89	92	87	87	93	90	94	98	91,9
1989	93	92	91	84	87	91	89	94	96	91	92	91	90,9
1990	95	91	89	91	87	90	87	88	94	90	95	94	90,9
1991	91	90	90	84	85	82	82	86	87	89	88	89	86,9
1992	89	82	76	87	84	88	85	82	88	93	94	92	86,6
1993	88	91	92	92	81	84	87	87	94	89	92	94	89,2
1994	93	87	85	85	83	83	80	84	86	86	88	92	86,0
1995	89	85	82	82	83	84	81	84	91	86	91	90	85,6
1996	87	87	88	78	83	84	86	89	96	92	89	94	87,7
1997	91	87	83	86	82	86	89	90	92	91	88	95	88,3
1998	90	82	88	89	92	95	91	89	92	90	91	91	90,0
1999	90	93	83	87	85	90	89	89	88	91	90	91	88,8
Med	91,9	89,0	88,3	87,0	86,6	88,3	87,2	88,8	91,2	89,7	91,0	93,1	89,3

Sursa: Arhiva INMH

Pentru exemplificare în figura 9, este reprezentat grafic mersul umezelii relative la stația meteorologică Stâna de Vale.




Fig. nr. 9 -Mersul lunar și anual al umezelii la Stâna de Vale

Din figura 9, rezultă că în decursul unui an, umezeala relativă are un mers invers temperaturii aerului, respectiv prezintă un maxim în luna decembrie (93,1%), când advecția aerului mai cald și mai umed de origine oceanică este mai frecventă, și un minim în luna mai (86,6%), determinat de temperatura aflată în creștere. Așadar, în decursul unui an limitele între care oscilează umezeala relativă sunt mici, apropiate de media multianuală (89,3%), fapt ce atestă că la Stâna de Vale este o umiditate relativă mare (cea mai mare din țară).

3.4.2. Frecvența medie a zilelor cu diferite valori ale umidității relative

Acest parametru se exprimă în număr de zile (sau în procente) din numărul total al zilelor dintr-o lună sau dintr-un an, pentru valorile de umezeală relativă care la ora 12 depășesc 80% și pentru cele care scad sub 50% și 30% la unul din termenii climatologice, în vederea aprecierii evaporăției apei din sol și cunoscând caracteristicile temperaturii aerului și ale vitezei vântului.

Spre exemplu, la Stâna de Vale, frecvența medie a zilelor cu umiditate relativă $\geq$ cu 80% la ora 12, este mai mică în intervalul aprilie – octombrie (8-12 zile), când advecția aerului cald și uscat de origine tropicală sau continentală în regim anticiclonic este mai frecventă și mai mare în perioada rece a anului (12-20 zile), ca urmare a temperaturilor mai scăzute și a frecvenței mai ridicate a maselor de aer oceanic

(figura 10). În decursul unui an, se înregistrează un număr de 148 zile cu umezeală relativă, care la ora 12 atinge sau depășește 80%.

Similar, pentru regiunile situate sub 700 m altitudine, de deal, podiș și câmpie, se calculează și frecvența zilelor cu umezeală relativă < 50%, care indică prezența zilelor de uscăciune, și ≤ 30%, care reflectă prezența fenomenelor de secetă.

Tabelul 12 – Numărul de zile cu umezeală relativă ≥ 80% la Stâna de Vale (1979-2001)

Anii	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Sum	Med
1979	19	12	17	11	13	8	13	10	5	7	17	13	145	12
1980	17	10	18	11	13	16	18	9	12	14	23	28	189	16
1981	24	15	14	12	13	15	11	9	13	15	20	28	189	16
1982	22	13	10	11	8	9	14	13	5	8	4	21	138	12
1983	28	15	9	5	8	19	8	7	6	7	9	13	134	11
1984	19	12	12	8	13	11	14	11	13	9	10	16	148	12
1985	16	22	10	15	18	21	13	8	12	12	22	23	192	16
1986	28	17	14	9	11	14	21	7	4	5	12	19	161	13
1987	24	8	11	7	14	9	3	12	4	8	20	28	148	12
1988	19	16	21	14	15	13	9	9	14	5	19	30	184	15
1989	12	12	10	9	12	17	10	14	17	10	13	20	156	13
1990	20	9	9	15	1	13	8	6	13	9	20	24	147	12
1991	12	7	14	7	11	8	5	5	4	13	13	12	111	9
1992	14	9	4	12	8	14	6	2	7	18	21	17	132	11
1993	10	13	18	15	5	6	11	8	16	9	17	22	150	13
1994	18	14	8	8	8	7	6	7	5	6	11	21	119	10
1995	10	17	8	8	8	10	14	8	13	3	20	18	137	11
1996	16	17	9	1	13	6	8	9	24	10	15	26	154	13
1997	18	11	6	10	5	9	14	9	9	14	15	21	141	12
1998	17	6	14	15	16	20	14	10	15	16	15	16	174	15
1999	13	17	7	11	7	12	12	7	2	8	15	20	131	11
2000	17	11	11	8	3	4	7	2	9	3	5	13	93	8
2001	13	12	12	8	5	10	10	3	10	12	18	17	130	11
Med	18	13	12	10	10	12	11	8	10	10	15	20	148	12

Sursa: Arhiva INMH




Fig. 10 - Frecvența medie a zilelor cu umezeală relativă > 80% la Stâna de Vale (2001)

3.4.3. Variațiile de lungă durată ale umezelii aerului

Calcularea acestui parametru se face tot prin metoda mediilor glisante (vezi cap. 3.3.8.) și permite evidențierea tendinței de evoluție a mărimilor care definesc umezeala aerului, sub influența cauzelor generale sau locale. Spre exemplu, pentru București – Filaret, curba graficului din figura 11 indică o tendință descendentă în ultimele decenii, ca urmare a creșterii temperaturii aerului din această parte centrală a orașului (Dumitrescu, Glăja, 1972).




Fig. 11 – Mediile glisante ale umezelii relative medii anuale la București – Filaret (după Dumitrescu, Glăja, 1972).

3.5. Prelucrarea datelor privind nebulozitatea atmosferică

Nebulozitatea sau gradul de acoperire a cerului cu nori constituie un important element climatologic care influențează desfășurarea celorlalte procese atmosferice, de aceea se impune a fi realizată amănunțit și corect.

Principalii parametri calculați în studiile privind nebulozitatea atmosferică sunt:

- valorile medii zilnice, decada, lunare și anuale;
- frecvența medie a zilelor cu diferite grade de înnorare;
- frecvența genurilor de nori;
- variațiile de lungă durată ale nebulozității.

3.5.1. Valorile medii zilnice, decada, lunare și anuale

Se determină și se reprezintă grafic la fel ca în cazul celorlalte elemente prezentate anterior. În figura 12 este prezentat regimul anual al nebulozității la Stâna de Vale. Se observă că cele mai mari valori de nebulozitate se înregistrează în luna aprilie (6,8 zecimi), datorită intensificării activității ciclonice deasupra Mării Mediterane și amplificării convecției termice și dinamice pe versanții Munților Bihor și Vlădeasa. Minimul de nebulozitate apare în luna august (4,7 zecimi) și reprezintă o excepție de la mersul general, care are minimul în luna octombrie. Cauza o reprezintă persistența regimului anticiclonic de la sfârșitul verii.




Fig. 12 - Mersul anual al nebulozității la Stâna de Vale (1979-1981)

3.5.2. Frecvența medie a zilelor cu diferite grade de înnoirare

Valorile medii lunare și anuale sunt de multe ori prea generale, astfel încât pentru unele domenii de activitate (transporturi, agricultură, turism etc.) este necesară cunoașterea frecvenței de producere a anumitor grade de înnoirare. Frecvența se calculează în procente sau în număr de cazuri de zile cu cer senin, noros și acoperit. În sistem internațional, prin cer senin se înțelege un grad de nebulozitate mai mic de 2 zecimi din bolta cerească, cerul noros este dat de nebulozitatea cuprinsă între 3 și 7 zecimi, iar cerul acoperit este definit de valorile nebulozității care depășesc 8 zecimi. În România s-a utilizat un alt sistem de notare, conform căruia cerul senin este indicat de nebulozitatea până la 3,5 zecimi, cerul noros de cea cuprinsă între 3,6 și 7,5 zecimi, iar cerul acoperit când acesta depășește 7,6 zecimi. În anul 1961, s-a introdus un nou criteriu de stabilire a frecvenței zilelor cu cer senin și acoperit, conform căruia zilele senine sunt acelea în care suma valorilor observate la cele patru termene climatologice este mai mică de 4 zecimi, iar zilele cu cer acoperit, cele în care suma valorilor de la termenele climatologice de observație depășește 32 zecimi (Fărcaș, 1988).

În figura 13 este evidențiată frecvența zilelor cu cer senin și acoperit la stația Stâna de Vale. Cele mai multe zile senine se înregistrează în luna august (6,0), iar cele mai puține în luna mai (1,7). Cele mai multe zile cu cer acoperit (13,1) se produc în luna decembrie, ca urmare a intensificării activității ciclonice deasupra Mării Mediterane, iar cele mai puține în luna august (5,5), datorită predominării regimului anticiclonic.

Tabelul 13 – Numărul de zile cu cer senin și acoperit la Stâna de Vale

Lun	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Zs	5,8	5,1	3,2	1,9	1,7	2,0	4,3	6,0	5,0	6,3	4,8	5,2	4,2
Za	12,7	10,0	12,1	11,5	10,1	8,6	6,7	5,5	8,0	9,3	12,1	13,1	9,9




Fig. 13 - Frecvența zilelor cu cer senin și acoperit la Stâna de Vale (1979-19)

3.5.3. Frecvența genurilor de nori

Datele referitoare la diferite genuri de nori interesează în mod deosebit în validarea datelor climatologice (regimul precipitațiilor, al umezelii aerului etc.), în lucrările de sprijinire a transportului aerian, precum și în cercetările actinometrice și se prelucrează conform metodologiei prezentate anterior.

Forma, mărimea, înălțimea, frecvența diferitelor genuri de nori variază în funcție de altitudine, latitudine, tipul masei de aer sau al frontului atmosferic, intensitatea convecției termice și dinamice, particularitățile fizico-geografice locale etc.

Spre exemplu, la Vârful Omu norii Cumulonimbus au o frecvență mare, fiind întâlniți în 15,6% din cazuri (tabelul 14), în timp ce la Întorsura Buzăului, stație amplasată în depresiunea intramontană omonimă, predomină norii stratiformi caracteristici inversiunilor de temperatură, respectiv genul Stratocumulus, întâlnit în 14% din cazuri (Păun, 1998).

Tabelul 14 – Frecvența genurilor de nori (în număr de cazuri și procente) la stațiile meteorologice Vârful Omu și Întorsura Buzăului în perioada 1970-1994

Genul de nori	Frecvența	Stația meteorologică	
		Vf. Omu	Întorsura Buzăului
Cirrus	Nr. cazuri	107	75
	%	13,9	4,0
Cirrocumulus	Nr. cazuri	4	0
	%	0,3	0,0
Cirrostratus	Nr. cazuri	265	567
	%	22,1	30,5
Alto cumulus	Nr. cazuri	265	576
	%	22,1	30,5
Altostratus	Nr. cazuri	131	426
	%	10,9	22,6
Nimbostratus	Nr. cazuri	26	110
	%	2,2	5,8
Stratocumulus	Nr. cazuri	292	266
	%	24,3	14,1
Stratus	Nr. cazuri	6	8
	%	0,5	0,4
Cumulus	Nr. cazuri	82	112
	%	6,8	5,9
Cumulonimbus	Nr. cazuri	187	293
	%	15,6	15,5
Total cazuri anual		1200	1888

Sursa: Păun, 1998, cu modificări.

3.5.4. Variațiile de lungă durată ale nebulozității

Pot fi analizate cu ajutorul mediilor glisante ale valorilor medii lunare, anotimpuale și anuale ale nebulozității totale, inferioare sau ale nebulozității la diferite ore de observație. Curbele respective arată tendința de evoluție a acestui element climatic, așa cum reiese din figura 14 care indică tendința de creștere a nebulozității medii anuale (n) și a numărului mediu anual de zile cu cer acoperit (a), în paralel cu scăderea numărului mediu anual de zile cu cer senin (s), în orașul București, ca urmare a dezvoltării sale industriale și urbane (Neacșa și colab., 1974).




Fig. 14 – Graficul mediilor glisante pe intervale de 20 ani la stația București – Filaret în perioada 1881-1971 (după Neacșa și colab. 1974).

3.6. Prelucrarea datelor privind durata de strălucire a Soarelui

Durata de strălucire a Soarelui constituie un element climatic important, atât din punct de vedere teoretic, pentru caracterizarea climatică a unei regiuni, cât și practic, în studiile agroclimatice, balneoclimatice, climato - turistice etc., ea având un rol important în ritmul dezvoltării plantelor, în tratarea unor boli, în precizarea intervalului favorabil activităților turistice etc.

Durata de strălucire a Soarelui depinde de trei categorii de factori: astronomici, geografici și meteorologici, în funcție de care se distinge *durata astronomică*, *durata maximă posibilă* și *durata efectivă de strălucire a Soarelui* (Fărcaș, 1988).

Durata astronomică depinde de declinația Soarelui, de latitudine, de înălțimea Soarelui deasupra orizontului; pe baza acestor elemente se alcătuiesc diagrame de calcul pentru latitudinea și perioada din an dorită.

Durata maximă posibilă depinde de poziția stației meteorologice în cadrul formelor de relief. Astfel, o stație amplasată într-o depresiune sau o vale adâncă și îngustă va avea o durată de strălucire a Soarelui mai mică decât una situată pe o culme montană, unde orizontul nu mai este limitat de versanții învecinați, iar norii stratiformi sunt situați de cele mai multe ori sub nivelul ei. Durata maximă posibilă se determină pe baza observațiilor vizuale privind apariția și dispariția Soarelui la orizont, observații efectuate pentadic în condiții de cer senin. În lipsa măsurătorilor, determinările se pot face și prin calcul.

Durata efectivă indică perioada reală în care Soarele a strălucit pe cer și, pe lângă factorii menționați, depinde de regimul nebulozității. Datele se obțin pe baza înregistrărilor furnizate de heliografe sau prin calcul, aplicând duratei maxime coeficienți de reducere calculați în funcție de nebulozitate.

Pe baza măsurătorilor efectuate la stațiile meteorologice, se calculează următorii parametri care definesc durata de strălucire a Soarelui:

- sumele zilnice, decadale și anuale ale duratei de strălucire a Soarelui;
- numărul de zile cu și fără soare;
- fracția de insolație;
- variațiile de lungă durată.

3.6.1. Sumele zilnice, decadaie, lunare și anuale ale duratei de strălucire a Soarelui

Acești parametri se determină însumând valorile zilnice, decadaie și lunare în vederea obținerii sumelor anuale ale duratei de strălucire a Soarelui. Reprezentarea grafică este simplă: prin curbe sau coloane și evidențiază regimul duratei de strălucire a Soarelui dintr-o anumită perioadă. În figura 15, se poate urmări regimul anual al duratei de strălucire a Soarelui la Stâna de Vale. Acesta prezintă un maxim în luna august (226,5 ore), datorită predominării regimului anticlinal de la sfârșitul verii și începutul toamnei și un minim în luna decembrie (50,2 ore), ca urmare a predominării norilor stratiformi determinați de intensificarea activității ciclonice sau de formarea inversiunilor termice. Anual, la Stâna de Vale se înregistrează doar 1601,4 ore cu soare față de 2300-2400 ore cât înregistrează litoralul, cauzele fiind date de prezența cețurilor și a nebulozității stratiforme, precum și de existența obstacolelor naturale care limitează orizontul la Stâna de Vale.




Fig. 15 - Mersul lunar al duratei de strălucire a Soarelui la Stâna de

3.6.2. Numărul zilelor cu soare

Numărul zilelor cu soare constituie un alt parametru climatic care întregeste imaginea asupra duratei de strălucire a Soarelui. Se consideră zi cu soare, ziua în care Soarele a strălucit pe cer indiferent de durată. Interesează atât numărul zilelor cu soare, cât și cele fără soare dintr-o lună, precum și anul în care s-au realizat. Figura 16, evidențiază la Stâna de Vale un număr maxim de zile cu soare în lunile iulie-august, ca urmare a predominării norilor convectivi și a regimului anticiclonic și un minim în lunile decembrie-ianuarie, datorită persistenței norilor stratiformi.

Tabelul 15 – Numărul zilelor cu soare la Stâna de Vale (valori medii lunare, anuale și sume anuale) în perioada 1986-1999

Anii	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Sum
1986	10	13	26	25	31	29	29	31	29	26	23	18	290
1987	11	24	24	25	25	29	31	30	29	29	17	13	287
1988	12	20	15	22	28	27	30	28	27	29	18	14	270
1989	27	22	20	25	27	25	30	26	24	26	23	22	297
1990	23	22	29	25	29	27	31	29	27	26	20	16	304
1991	20	23	22	28	25	27	29	31	30	20	23	21	299
1992	19	18	27	25	30	27	31	31	26	22	15	22	293
1993	19	22	23	21	31	28	29	27	25	26	21	12	284
1994	21	18	24	25	28	27	31	29	29	25	19	14	290
1995	16	21	23	25	27	26	31	29	25	31	14	14	282
1996	18	11	23	28	28	27	28	28	12	24	20	15	262
1997	22	21	29	21	29	27	26	28	26	28	24	14	295
1998	19	25	19	24	25	27	26	31	23	22	19	24	284
1999	23	16	25	26	28	26	31	30	28	26	19	17	295
Med.	18,5	19,7	23,5	24,6	27,9	27,0	29,5	29,1	25,7	25,7	19,6	16,8	288
													24

Sursa: Arhiva INMH




Fig. 16 - Numărul mediu de zile cu soare la Stâna de Vale

3.6.3. Frația de insolație

Raportul dintre durata efectivă și durata posibilă, exprimat în procente, reprezintă *fracția de insolație*. Acest parametru este important, deoarece reliefează reducerea duratei efective față de cea posibilă, sub influența nebulozității.

În practică se calculează valorile orare, lunare și anuale ale fracției de insolație, iar prelucrarea datelor se face asemănător cu a duratei efective de strălucire a Soarelui.

Tabelul 16 – Valorile medii lunare, anuale și multianuale ale fracției de insolație la Stâna de Vale în perioada 1986-1999

Anii	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Med
1986	013	018	033	047	039	031	032	059	060	049	032	022	038
1987	008	032	024	036	028	041	059	038	050	045	010	015	034
1988	015	025	017	028	034	034	052	056	033	049	024	015	034
1989	038	036	027	034	030	025	041	038	030	037	031	022	033
1990	032	042	041	030	044	035	052	057	034	048	017	016	039
1991	028	031	033	025	020	047	043	044	047	026	026	021	034
1992	024	028	039	032	041	034	049	068	057	024	017	025	037
1993	028	034	023	030	046	046	048	053	032	043	026	014	035
1994	019	024	031	032	038	044	045	049	057	042	021	016	035
1995	015	029	025	029	029	036	055	044	031	055	017	016	035
1996	022	019	025	039	037	044	041	039	011	034	027	021	030
1997	032	036	043	022	040	037	032	041	040	037	029	013	034
1998	024	042	026	027	031	034	035	056	029	024	022	031	032
1999	033	015	037	028	041	035	037	048	048	030	030	017	035
Med	023	029	030	031	035	037	044	049	039	038	023	018	034

Sursa: Arhiva INMH




Fig.17 - Variația anuală a valorilor fracției de insolație la Stâna de V

Figura 17 arată că la Stâna de Vale fracția de insolație variază între 0,18% în luna ianuarie și 0,49% în luna august, valoarea medie anuală fiind de 0,34%. Aceste valori ale fracției de insolație evidențiază că în sezonul rece, insolația este mai mică datorită predominării norilor stratiformi care acoperă cerul zile în șir și este mai mare în sezonul cald, când mișcările termoconvective ale maselor de aer generează nori cu dezvoltare verticală, mai ales după - amiaza, în condițiile unui regim anticlionic.

3.6.4. Variațiile de lungă durată ale duratei de strălucire a Soarelui

Tendința generală de evoluție a duratei de strălucire a Soarelui poate fi ilustrată prin metoda mediilor glisante, calcularea lor făcându-se pe intervale mari, de câte 10, 20, 30 de ani. În paralel se pot face și prelucrările pentru nebulozitate, graficul rezultat indicând tendința de scădere a duratei strălucirii Soarelui o dată cu creșterea nebulozității, așa cum se observă în figura 18 la București - Filaret.




Fig. 18 - Mediile glisante ale duratei de strălucire a Soarelui (a) și ale nebulozității (b) la București-Filaret (după Dumitrescu, Glăja, 1972).

3.7. Prelucrarea datelor privind precipitațiile atmosferice

Datele privind regimul și repartitia precipitațiilor atmosferice prezintă un deosebit interes teoretic și practic, mai ales în construcțiile hidrotehnice, în zona culturilor agricole, în turism etc., scop pentru care se calculează următorii parametri:

- cantitatea medie lunară, anotimpuală, semestrială și anuală;
- cea mai mică și cea mai mare cantitate lunară, anotimpuală și anuală;
- probabilitatea de producere și gradul de asigurare a diferitelor cantități de precipitații;
- abaterea cantităților de precipitații anuale față de media multianuală;
- frecvența zilelor cu diferite cantități de precipitații;
- cantitatea maximă în 24, 48 și 72 de ore;
- ploile torențiale;
- indicii pluviometrici;
- variațiile de lungă durată ale precipitațiilor atmosferice.

3.7.1. Cantitatea medie lunară, anotimpuală, semestrială și anuală

Cantitățile de precipitații exprimate prin sumele medii lunare, anuale și anotimpuale se calculează pentru o perioadă cât mai îndelungată, deoarece ele prezintă o mare variabilitate în timp. Cantitățile medii lunare și anotimpuale ne dau o imagine clară a distribuției precipitațiilor în cursul anului și servesc la caracterizarea regimului anual (Fărcaș, 1988). De asemenea, se calculează și cantitățile semestriale (din semestrele rece și cald ale anului), care se corelează foarte bine cu perioada de vegetație și cu sezoanele turistice.

Reprezentarea grafică se face cu ajutorul histogramelor, respectiv prin coloane ridicate de la nivelul de 0 mm până la înălțimea corespunzătoare cantității de apă căzută în luna respectivă (figura 19).

Graficul din figura 19 evidențiază caracteristicile regimului anual al precipitațiilor atmosferice la stația Stâna de Vale. Astfel, cele mai puține precipitații cad în intervalul ianuarie – martie, datorită predominării regimului anticiclonic care împiedică dezvoltarea convecției termice, luna cea mai secetoasă fiind februarie (84,3 mm). Începând din martie, precipitațiile cresc progresiv până în iunie, când se înregistrează principalul maxim pluviometric anual (203,2 mm). Ploile din această lună sunt determinate de frecvența mare a ciclonilor oceanici care se deplasează la periferia nordică a dorsalei Anticiclonului Azoric, aducând mase de aer reci și umede, favorabile formării precipitațiilor, precum și proceselor convective care instabilizează aerul prin convecția termică și

dinamică. Din iunie precipitațiile scad până în octombrie, când se înregistrează minimul secundar de 114,8 mm, datorită predominării regimului anticiclonic de la sfârșitul verii. În decembrie apare al doilea maxim secundar de 152,6 mm, determinat de ciclonii din Marea Mediterană care traversează Câmpia Panonică.


Tabelul 17 – Cantitatea medie lunară și anuală de precipitații la Stâna de Vale

Anii	I	II	III	IV	V	VI
1979	221,2	117,3	223,4	120,3	123,2	198,3
1980	102,8	77,5	124,5	190,8	219,6	365,3
1981	180,3	65,4	321,6	133,0	171,3	169,9
1982	236,8	44,9	56,8	170,1	105,5	273,1
1983	170,8	121,0	57,0	94,9	189,6	192,6
1984	144,7	69,0	74,9	59,3	296,8	223,6
1985	71,9	140,7	34,4	184,5	298,1	242,8
1986	161,0	63,4	105,2	133,7	129,6	213,4
1987	234,5	41,6	75,0	115,4	181,9	148,9
1988	68,0	134,7	375,1	140,4	79,0	151,0
1989	20,9	97,0	51,7	138,8	205,2	254,0
1990	103,1	70,9	49,3	150,7	56,7	177,3
1991	57,9	49,6	39,8	74,5	235,5	154,3
1992	69,3	67,0	49,3	135,7	60,0	151,1
1993	80,7	45,9	100,5	245,2	54,3	164,0
1994	92,6	51,8	118,9	22,9	139,7	145,9
1995	206,0	175,5	112,0	196,7	151,6	228,7
Med	130,7	84,3	115,8	147,3	158,7	203,2

Anii	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma an
1979	222,0	200,6	93,7	80,4	82,7	142,2	1823,3
1980	519,1	112,0	80,0	219,5	252,8	106,1	2370,0
1981	174,4	87,1	91,7	246,4	148,8	330,3	2120,2
1982	227,1	117,6	87,8	103,6	27,6	217,3	1668,2
1983	114,9	111,6	72,7	40,7	60,8	30,6	1257,2
1984	176,6	88,7	275,2	130,1	81,7	97,4	1718,0
1985	71,7	169,5	88,7	27,9	212,1	83,4	1625,7
1986	148,3	190,9	6,6	67,8	15,0	192,7	1427,6
1987	56,1	125,5	45,5	45,6	111,2	87,4	1266,6
1988	85,1	96,9	182,8	35,6	81,4	188,1	1618,1
1989	85,4	267,5	123,8	66,7	98,6	120,5	1530,1
1990	68,7	88,6	174,4	112,0	172,9	71,2	1295,8
1991	163,4	105,9	105,9	256,1	105,1	60,5	1408,5
1992	58,9	45,5	188,5	318,1	165,0	58,3	1366,7
1993	145,6	69,2	145,0	76,0	102,9	349,4	1578,7
1994	67,6	119,2	79,1	114,8	86,1	123,2	1361,8
1995	131,8	237,4	188,2	10,7	246,5	335,9	2221,0
Med.	147,9	131,4	119,4	114,8	120,7	152,6	1626,9

Sursa: Arhiva INMH

Din cele prezentate rezultă că la Stâna de Vale în timpul anului se produc două maxime și două minime pluviometrice. Maximul principal, caracteristic întregii țări, evidențiază caracterul continental al climatului, iar maximul secundar dovedește influența circulației ciclonice mediteraneene în regiunea studiată.



Cantitățile semestriale de precipitații se calculează însumând valorile înregistrate în intervalul 01.04 – 30.09 pentru semestrul cald și cele înregistrate în intervalul 01.10 – 31.03 pentru semestrul rece.

Reprezentarea lor se face pe același grafic, prin coloane suprapuse sau alăturate, care redau comparativ cantitățile căzute în cele două semestre și în decursul unui an (figura 20). De asemenea, valorile respective sunt folosite și pentru întocmirea hărților cu repartitia teritorială a precipitațiilor căzute în semestrul rece, în cel cald sau într-un an.




Fig. 20 - Cantitățile semestriale și anuale de precipitații la Stâna de Vale (1979-1995)

3.7.2. Cele mai mari și cele mai mici cantități lunare, anotimpuale și anuale

Alături de cantitățile medii, cantitățile extreme lunare, anotimpuale și anuale prezintă mare importanță, deoarece exprimă variabilitatea precipitațiilor în timp, în limitele maxime. Valorile respective se extrag din tabelele meteorologice (tabelul 17 în cazul de față), se introduc într-un alt tabel (tabelul 18) și apoi se reprezintă grafic sau se menționează doar textual.

Tabelul 18 – Cantitatea maximă și minimă lunară de precipitații la Stâna de Vale

Luna	I	II	III	IV	V	VI
Max.	236,8	175,5	375,1	245,2	298,1	365,3
Min.	20,9	41,6	34,4	59,3	54,3	145,9

Luna	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Max.	519,1	267,5	275,2	318,1	252,8	349,4
Min.	56,1	45,5	6,6	10,7	15,0	30,6




Fig. 21 – Cele mai mari și cele mai mici cantități medii lunare de precipitații la Stâna de Vale (1979-1995)

În situația în care coloanele corespunzătoare acestora sunt repartizate grafic alăturat sau suprapus, decalările dintre valorile extreme sunt clar evidențiate. Astfel, pentru Stâna de Vale (figura 21), coloanele corespunzătoare celor mai mari medii lunare de precipitații sunt decalate cu circa 150-450 mm față de cele care indică anii secetoși și sunt determinate de variabilitatea maselor de aer cu diferite grade de umiditate care se deplasează spre regiunea Munților Apuseni.

3.7.3. Probabilitatea de producere și gradul de asigurare a diferitelor cantități de precipitații

În practică se folosesc datele referitoare la probabilitatea și gradul de asigurare a producerii anumitor cantități lunare, anotimpuale și anuale de precipitații care pot fi exprimate pe intervale de valori, pe intervale de abateri față de normală (Kostin, Pokrovskaia, 1964; Belozero, Fărcaș, 1971).

Probabilitatea se calculează pe baza numărului de cazuri corespunzătoare fiecărui interval și se exprimă în procente. Asigurarea (probabilitatea totală) se obține prin însumarea frecvențelor în procente, plecând de la ultimul interval. În final, se obține asigurarea de 100% care corespunde intervalului cu cantitățile cele mai mici (tabelul 19).

Tabelul 19 – Probabilitatea de producere și gradul de asigurare a cantităților de precipitații la stația Stâna de Vale (1979-1993)

Intervalul	Frecvența		
	Nr.cazuri	Probabilitatea (%)	Asigurarea % (suma frecvențelor)
1251-1300	3	20	99,4
1301-1350	0	0	79,4
1351-1400	1	6,6	79,4
1401-1450	2	13,3	72,8
1451-1500	0	0	59,5
1501-1550	1	6,6	59,5
1551-1600	1	6,6	52,9
1601-1650	2	13,3	46,3
1651-1700	1	6,6	33,0
1701-1750	1	6,6	26,4
1751-1800	0	0	19,8
1801-1850	1	6,6	19,8
1851-1900	0	0	13,2
1901-1950	0	0	13,2
1951-2000	0	0	13,2
2001-2050	0	0	13,2
2051-2100	0	0	13,2
2101-2150	1	6,6	13,2
2151-2200	0	0	6,6
2201-2250	0	0	6,6
2251-2300	0	0	6,6
2301-2350	0	0	6,6
2351-2400	1	6,6	6,6
Total	15		100

Sursa: date prelucrate după Arhiva I.N.M.H.




Fig. 22 - Probabilitatea de producere și gradul de asigurare diferitelor cantități de precipitații la Stâna de Vale (1979-19)

Valorile obținute se transpun sub forma unor curbe normale pe un grafic care are trecute pe ordonată frecvențele, iar pe abscisă mijlocul corespunzător intervalelor. Acest grafic servește la determinarea valorilor corespunzătoare unor asigurări caracteristice (20%; 50%; 80%; 95%), precum și a valorilor corespunzătoare asigurărilor minime și maxime. În acest sens din figura 22 reiese că la Stâna de Vale curba probabilității este bimodală, cu un maxim principal de frecvență de 20% pentru intervalul 1251-1300 mm, cu o asigurare de 99,4% și cu un al doilea maxim pentru intervalele 1401-1450 mm și 1601-1650 mm, cu o asigurare de 72,8%, respectiv de 46,3%. Graficul evidențiază în plus că precipitațiile cu valori mai mari de 1650 mm au o probabilitate scăzută (sub 10%), iar gradul de asigurare scade progresiv cu creșterea valorilor anuale de precipitații.

De reținut că această metodă se poate aplica și celorlalte elemente și fenomene meteorologice, spre exemplu pentru determinarea probabilității și gradului de asigurare a diferitelor praguri termice calculate din 5 în 5 °C; a diferitelor intervale de viteze ale vântului (0-1; 2-5; 6-10; 10-15; >15 m/s); a zilelor cu umezeală relativă $\geq 80\%$ la ora 12 și $\leq 30\%$ la unul din termenele de observație; a numărului de zile cu grindină; a numărului de zile cu oraj; a numărului de zile cu sol acoperit cu zăpadă.

Probabilitatea se poate determina și cu ajutorul unor formule; de exemplu:

$p = (m/n+1) \cdot 100 (\%)$, folosită pentru temperaturile extreme, în care:

p = probabilitatea;

m = numărul de ordine din șirul de date, ordonate de la valoarea cea mai mică la valoarea cea mai mare;

n = numărul de ani luați în calcul.

De asemenea, pentru determinarea probabilității de producere a cantităților maxime de precipitații în 24 de ore, se utilizează și formula:

$$p = (m - 0,3/m + 0,4) \cdot 100 (\%)$$

3.7.4. Abaterea cantităților anuale de precipitații față de media multianuală

Pentru a evidenția variațiile neperiodice ale cantităților de precipitații lunare, anotimpuale și anuale, se calculează abaterile respectivelor cantități de precipitații față de media multianuală cuprinse între anumite limite și exprimate în procente (tabelul nr. 20). Ca în cazul temperaturii aerului, Hellman consideră limitele intervalelor de abateri ale sumelor anotimpuale și anuale reduse la jumătate față de cele lunare, deoarece oscilațiile lor sunt mai mici decât în cazul sumelor lunare (Fărcaș, 1988).

Tabelul 20 - Caracterul pluviometric al lunilor, anotimpurilor și anilor după criteriul Hellman

Abaterile medii lunare %	Abateri medii anotimpuale și anuale %	Calificativul
> 50,0	> 20,0	excesiv de ploios
30,1 ... 50,0	15,1 ... 20,0	foarte ploios
20,1 ... 30,0	10,1 ... 15,0	ploios
10,1 ... 20,0	5,1 ... 10,0	moderat ploios
-10,0 ... +10,0	-5,0 ... +5,0	normal
-20,0 ... -10,1	-10,0 ... -5,1	moderat secetos
-30,0 ... -20,1	-15,0 ... -10,1	secetos
-50,0 ... -30,1	-20,0 ... -15,1	foarte secetos
< -50,0	< -20,0	excesiv de secetos

Exemplificăm tot cu stația meteorologică Stâna de Vale unde în perioada 1979-1995, s-a înregistrat o *cantitate medie de precipitații* de 1626,9 mm, cea mai mare din țară pentru altitudinea de 1100 m. Față de această valoare medie multianuală, *cele mai mici și cele mai mari cantități medii de precipitații anuale* au oscilat între 1266,6 mm, în anul 1987 și 2370,0 mm, în anul 1980, deci au prezentat abateri cuprinse între -360,3 mm și +743,1 mm, motiv pentru care conform criteriului Hellmann (tabelul 20), anii 1980, 1981 și 1995 sunt considerați *excesivi de ploioși*, anul 1979, *ploios*, anii 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 și 1993 *normali*, anii 1986, 1991 și 1992, *secetoși*, iar ceilalți (1983, 1987, 1990 și 1994) sunt considerați *foarte secetoși* din punct de vedere pluviometric. În ansamblu se remarcă o dominare clară a abaterilor negative, care reprezintă 64,7% din numărul total de cazuri, față de cele pozitive, ce însumează doar 35,3% din cazuri (tabelul 21, figura 23).

Calcularea abaterilor în mm la stația meteorologică Stâna de Vale s-a făcut astfel: pentru anul 1979, când s-a înregistrat o cantitate medie de 1823,3 mm, față de media multianuală de 1626,9 mm, făcând diferența dintre cele două valori s-a obținut o abatere de +196,4 mm. Calcularea abaterilor în procente s-a făcut cu ajutorul regulei de trei simplă, respectiv s-a urmărit numărul de cazuri în care cantitatea medie anuală de precipitații a depășit sau a fost sub valoarea medie multianuală, cazurile respective fiind exprimate apoi în procente. Astfel, din totalul de 17 cazuri posibile care reprezintă 100%, în 6 cazuri cantitatea medie anuală de precipitații a fost peste media multianuală, deci abaterile pozitive s-au înregistrat în procent de 35,3%.

$$\begin{array}{ll} \text{Exemplu:} & 17 \text{ cazuri} \dots\dots\dots 100\% \\ & 6 \text{ cazuri} \dots\dots\dots x \end{array} \quad x = \frac{6 \cdot 100}{17} = 35,3\%$$

În celelalte 11 cazuri din cele 17 posibile care reprezintă 100%, cantitatea medie anuală de precipitații a fost sub cea medie multianuală, deci abaterile negative s-au înregistrat în procent de 64,7%.

$$\begin{array}{ll} \text{Exemplu:} & 17 \text{ cazuri} \dots\dots\dots 100\% \\ & 11 \text{ cazuri} \dots\dots\dots x \end{array} \quad x = \frac{11 \cdot 100}{17} = 64,7\%$$

Tabelul 21 – Abaterile cantităților de precipitații anuale față de media plurianuală la Stâna de Vale (1979-1995)

Anul	Media anuală (mm)	Media multianuală (mm)	Abaterile (mm)			
			+	%	-	%
1979	1823,3	1626,9	196,4	12,0		
1980	2370,0	1626,9	743,1	45,6		
1981	2120,2	1626,9	493,3	30,5		
1982	1668,2	1626,9	41,3	2,5		
1983	1257,2	1626,9			-369,7	-22,7
1984	1718,0	1626,9	91,1	5,6		
1985	1625,7	1626,9			-1,2	-0,07
1986	1427,6	1626,9			-199,3	-12,2
1987	1266,6	1626,9			-360,3	-22,1
1988	1618,1	1626,9			-8,8	-0,5
1989	1530,1	1626,9			-96,8	-5,9
1990	1295,8	1626,9			-331,1	-20,3
1991	1408,5	1626,9			-218,4	-13,4
1992	1366,7	1626,9			-260,2	-15,9
1993	1578,7	1626,9			-48,2	-2,9
1994	1361,8	1626,9			-265,1	-16,2
1995	2221,0	1626,9	594,1	36,5		
Abaterile (%)	+		35,3			
	-				64,7	

Sursa: date prelucrate după Arhiva I.N.M.H.

Reprezentarea grafică a abaterilor cantităților anuale de precipitații față de media plurianuală se face sub formă de coloane care indică valoarea abaterilor pozitive sau negative din fiecare an (în mm) față de media multianuală, numită și normală, considerată arbitrar zero relativ.




Fig. 23 - Abaterile pozitive și negative ale cantităților medii anuale precipitații față de media plurianuală la Stâna de Vale (1979-19)

Concluzia generală care se desprinde din această analiză este că la Stâna de Vale variațiile neperiodice ale precipitațiilor atmosferice, determinate de circulația diferitelor tipuri de mase de aer, nu sunt foarte pronunțate (6 ani sunt normali, 4 ani sunt ploioși și excesiv de ploioși, iar 7 ani sunt secetoși și foarte secetoși), datorită rolului moderator al muntelui (figura 23).

3.7.5. Frecvența zilelor cu diferite cantități de precipitații

Prin zi cu precipitații se înțelege situația în care cantitatea de precipitații căzută în 24 ore este de cel puțin 0,1 mm. Numărul de zile cu precipitații se extrage din tabelele lunare, iar prin însumarea valorilor din fiecare lună în parte se obțin mediile lunare și anuale (tabelul 22). Reprezentarea grafică a acestora arată că la Stâna de Vale, de exemplu cel mai mare număr de zile cu precipitații $\geq 0,1$ mm se înregistrează în luna iunie (21,3 zile), iar cele mai mic în octombrie (9,4 zile) (figura 24).

Tabelul 22 – Numărul de zile cu cantități de precipitații $\geq 0,1$ mm la Stâna de Vale (1981-1990)

Anul	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Sum
1981	18	15	19	13	16	19	15	13	16	16	23	26	209
1982	17	11	14	23	21	22	16	16	9	9	4	20	182
1983	25	21	13	19	19	23	13	15	9	5	12	14	188
1984	20	17	21	15	25	20	15	14	16	10	11	11	195
1985	20	22	12	20	23	25	17	12	10	11	25	16	213
1986	24	19	16	16	17	23	21	11	4	7	6	16	180
1987	25	13	23	12	22	15	8	15	9	9	19	20	190
1988	14	19	22	17	19	20	9	7	12	6	14	21	180
1989	5	15	13	16	19	27	15	18	15	12	15	15	185
1990	15	10	9	21	14	19	12	11	19	9	19	21	179
Med	18,3	16,2	16,2	17,2	19,5	21,3	14,1	13,2	11,9	9,4	14,8	18,0	190,1

Sursa: Arhiva I.N.M.H.

Interes deosebit îl are cunoașterea numărului de zile cu anumite cantități de precipitații: $\geq 0,1$; $\geq 0,5$; $\geq 1,0$; $\geq 2,0$; $\geq 5,0$; $\geq 10,0$; $\geq 20,0$; $\geq 30,0$; $\geq 60,0$; $\geq 90,0$; $\geq 120,0$ mm, valori care sunt foarte sugestive dacă se transpun pe un singur grafic (figura 24).




Fig. 24 - Frecvența zilelor cu diferite cantități de precipitații la Stâna de Vale (1990)

3.7.6. Cantitatea maximă de precipitații în 24 ore

O importantă caracteristică a regimului precipitațiilor atmosferice o constituie cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 de ore care interesează pentru lucrările de proiectare hidrotehnică, în scopul dimensionării conductelor și canalelor de drenare, la construirea drumurilor, terasamentelor de cale ferată și a aeroporturilor, în modelarea reliefului, pentru lucrările de îmbunătățiri funciare etc.

Pentru aceste scopuri se utilizează șiruri lungi de observații din care se extrag datele privind cantitățile maxime de precipitații căzute în 24 ore în fiecare lună, ce se exprimă în milimetri sau în procente față de media lunară multianuală (tabelul 23).

Tabelul 23 - Cantitățile maxime de precipitații în 24 ore la Stâna de Vale și raportul lor procentual față de media lunară multianuală (1979-1995)

Luna	Maxima în 24 ore	Anul	Media lunară	Raportul în % față de media lunară
I	75,5	1982	130,7	57,7
II	37,3	1979	84,3	44,2
III	96,5	1981	115,8	83,3
IV	70,9	1993	147,3	40,1
V	58,8	1985	158,7	37,1
VI	79,5	1984	203,2	39,1
VII	88,9	1980	147,9	60,1
VIII	62,5	1986	131,4	47,5
IX	86,7	1992	119,4	72,6
X	76,9	1992	114,8	66,9
XI	80,8	1995	120,7	66,9
XII	137,6	1995	152,6	90,2

Sursa: Arhiva INMH.




Fig. 25 - Cantitățile maxime de precipitații în 24 ore la Stâna de V

Cantitățile maxime de precipitații căzute în 24 ore, în unele cazuri, ajung sau chiar le depășesc cu mult pe cele medii înregistrate în luna respectivă și se reprezintă grafic sub formă de coloane. La Stâna de Vale în intervalul 1979-1995, cantitățile maxime de precipitații în 24 ore au depășit frecvent 50% din cantitățile medii lunare, dar nu au depășit niciodată media lunară multianuală (fig. 25), fapt ce atestă un climat temperat cu influențe oceanice, spre deosebire de alte regiuni ale țării în care cantitățile maxime în 24 ore depășesc cu mult media lunară, evidențiind un climat cu influențe continentale.

3.7.7. Ploile torențiale

Prin *ploi torențiale* se înțeleg ploile care dau cantități foarte mari de precipitații într-un interval scurt de timp, deci au intensități mari. Intensitatea ploi reprezintă raportul dintre cantitatea de apă, p , exprimată în mm și durata ploi, t , în minute, astfel:

$$i = \frac{p}{t} \text{ (mm/min)}$$

Intensitățile mari ale acestor ploi pot avea consecințe grave asupra eroziunii și spălării solului de substanțele nutritive, asupra modelării versanților prin procese accelerate de eroziune, care determină o gamă largă de procese de versant, distrug pajiștile și culturile, iar în regiunile joase și în localități produc inundații. Așadar, studiul ploilor torențiale prezintă mare însemnătate practică, datorită efectelor distructive ale acestora, motiv pentru care în construcțiile hidrotehnice, în evaluarea gradului de vulnerabilitate a terenurilor, în dimensionarea străzilor și a canalelor de scurgere a apelor etc., cunoașterea acestui parametru este absolut necesară.

Determinarea caracterului torențial al unei ploi se poate face pe baza pluviogramei, în funcție de durată și intensitate, conform criteriului Hellmann (tabelul 24).

Tabelul 24 - Ploile torențiale după criteriul Hellman

Durata (min)	Intensitatea (mm/min)
1-5	cel puțin 1
6-15	cel puțin 0,80
16-30	cel puțin 0,60
31-45	cel puțin 0,50
46-60	cel puțin 0,40
61-120	cel puțin 0,30
121-180	cel puțin 0,20
Peste 180	cel puțin 0,10

La Stâna de Vale, în perioada 1980-1999, *intensitatea medie* a ploilor torențiale a fost cuprinsă între 0,03 și 0,47 mm/min., cele mai mari intensități fiind înregistrate, în general, în timpul averselor de scurtă durată, așa cum s-a întâmplat spre exemplu în data de 17 iunie 1986, când în doar 53 minute au căzut 23,2 mm de precipitații, aversa având intensitatea medie de 0,44 mm/min. (tabelul 25). Tabelul menționat mai evidențiază că la Stâna de Vale intensitatea medie a ploilor torențiale este redusă (0,21 mm/min.), spre deosebire de regiunile cele mai aride din țară, cum este cazul Bărăganului, unde intensitatea medie a ploi produsă la Viziru în data de 27.05.1939 a fost de 6,63

mm/min. Aversa a avut durata de numai trei minute, timp în care s-au înregistrat 19,9 mm, adică 19,9 l/m² de precipitații (Bogdan, Niculescu, 1999). Situația se explică prin faptul că în Bărăgan, vara, solul se încinge foarte puternic și frecvența aerului umed tropical instabil este mai mare decât la Stâna de Vale, unde influențele oceanice și muntele își exercită rolul moderator și asupra ploilor torențiale.

Tabelul 25 – Ploile torențiale cu cea mai mare intensitate medie de la Stâna de Vale (1980-1999)

Anul	Data	Durata		Cantitatea de precipitații (mm)	Intensitatea medie (mm/min)
		ore	minute		
1980	29.07	6	39	12,2	0,03
1981	19-20.07	5	19	15,1	0,05
1982	23.07	2	50	23,7	0,14
1983	02.07	3	33	21,3	0,11
1984	17-18.09	4	15	20,2	0,08
1985	20.08	1	33	43,6	0,47
1986	17.06		53	23,2	0,44
1987	10.06	2		16,5	0,14
1989	20.08	1	20	21,2	0,27
1990	14.08		25	9,7	0,39
1990	25.05		36	14,0	0,39
1991	26.07	1	7	23,5	0,35
1992	15.07	1	51	18,0	0,16
1993	06.07	1	57	18,4	0,16
1994	25.05	1	20	22,1	0,28
1995	15.07	4	8	51,8	0,21
1996	16.05	2		15,5	0,13
1997	29.08	3	4	24,4	0,13
1998	20.08	3	12	29,9	0,16
1999	01.09	1	2	8,8	0,14

Sursa: Arhiva INMH

3.7.8. Indicii pluviometrici

În studiile agroclimatice, biogeografice etc. se utilizează frecvent o serie de *indici pluviometrici* care evidențiază gradul de favorabilitate a ansamblului climatic pentru dezvoltarea, structurarea și repartiția culturilor agricole și a vegetației naturale. Aceștia sunt:

- indicele hidrotermic;
- indicele de ariditate "de Martonne";
- indicele K;
- indicele de ploaie Lang;
- indicele Köppen;

- indicele d'Emberger;
 - indicele Bagnouls-Gaussen;
 - indicele Bagnouls-Legriss;
 - indicele Gaussen;
 - indicele Musset-Gaussen;
 - indicele Angot;
 - anomalia standardizată de precipitații (ASP)
- (Belozerov, Fărcaș, 1971; Dumitrescu, Glăja, 1972; Bogdan, 1980; Teaci, 1980; Pătroescu, 1987; Fărcaș, 1988; Voiculescu, 2001 etc.).

Indicele hidrotermic se calculează după formula;

$$I = \frac{p \cdot t}{1000}, \text{ în care}$$

p = cantitatea anuală de precipitații;

t = temperatura medie anuală.

Pentru Stâna de Vale acest indice are valoarea de 6,35.

Indicele de ariditate "de Martonne" se calculează după următoarea formulă:

- *pentru valori anuale:* $I_a = \frac{P}{T+10}$, unde:

P = cantitatea medie anuală de precipitații;

T = temperatura medie anuală;

10 = coeficient care se adaugă pentru a nu obține valori negative.

- *pentru valori lunare:* $I_a = \frac{12p}{t+10}$, unde:

p = cantitatea medie lunară de precipitații x 12 luni, pentru a putea fi comparabile lunile între ele;

t = temperatura medie lunară;

10 = același coeficient.

Acest indice evidențiază:

- caracteristicile termo - pluviometrice ale regiunii;
- caracteristicile covorului vegetal (dacă are valori ≤ 5 indică o vegetație deșertică; dacă are valoarea 10 indică vegetația de stepă; când indicele ≥ 30 arată o vegetație forestieră; dacă este ≥ 40 evidențiază pădurile, excepție fac altitudinile mari unde temperatura medie anuală este redusă);

- caracteristicile rețelei hidrografice (dacă este autohtonă, ca în Bărăgan sau alohtonă) (Bogdan, 1980).

Spre exemplu, pentru Stâna de Vale indicele de ariditate "de Martonne" indică următoarele valori lunare și anuale (tabelul 26).

Tabelul 26 - Valorile lunare și anuale ale indicelui de ariditate "de Martonne" la Stâna de Vale

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
356,5	198,4	157,9	138,1	104,1	113,4	76,8	69,8	76,2	92,5	149,3	281,7	117,9

Sursa: date prelucrate după Arhiva INMH

Indicele *K* sau bilanțul convențional al umidității exprimă gradul de favorabilitate climatică pentru vegetația forestieră și se calculează ca raport între cantitatea de precipitații din perioada cu temperaturi mai mari de 10°C și suma temperaturilor din aceeași perioadă. La altitudini mari, Vârful Omu spre exemplu, indicele nu își găsește expresia, datorită inexistenței perioadelor cu temperaturi medii mai mari de 10°C, dar la celelalte stații valoarea lui scade altitudinal, de la 7,1 la stația Sinaia, la 2,8 la stația Alexandria, marcând astfel trecerea de la domeniul pădurilor de foioase la cel de silvostepă (Voiculescu, 2001).

Indicele *Lang* sau factorul pluvial exprimă gradul de umiditate atmosferică și variația sa sezonieră sau anuală. Se calculează conform formulei:

$$I = \frac{p}{t}, \text{ în care:}$$

p = cantitatea anuală sau media multianuală de precipitații;

t = temperatura medie anuală sau multianuală.

Valorile indicelui *Lang* cresc o dată cu creșterea altitudinii, dar numai până la nivelul de condensare situat la circa 1800 m, după care nu își mai găsește expresia. Spre exemplu, la Stâna de Vale (1100 m) are valoarea 417,2.

Indicele *Gausson* evidențiază numărul de zile ploioase dintr-o perioadă pe baza unui coeficient al stării higrometrice:

- coeficientul 0,9 pentru 40-60% zile ploioase;
- coeficientul 0,8 pentru 60-80% zile ploioase;
- coeficientul 0,7 pentru 80-90% zile ploioase;
- coeficientul 0,6 pentru mai mult de 90% zile ploioase;
- coeficientul 0,5 pentru zilele noroase și cețoase.

Indicele Gaus sau indicele de continentalism, exprimă preponderența tipului de influență climatică și se calculează după formula:

$$I = \frac{p}{Alt}, \text{ unde:}$$

p = cantitatea anuală sau media multianuală de precipitații;
 Alt = altitudinea stației meteorologice.

Valorile acestui indice scad o dată cu creșterea altitudinii, după cum urmează: 0,53 în arealul stației Vârful Omu, 0,91 în arealul stației Sinaia și ajunge la 11,7 în arealul stației Alexandria (Voiculescu, 2001). La Stâna de Vale are valoarea de 1,5.

Indicele Köppen se calculează pe baza următoarei relații:

$$I = \frac{p}{T+7}, \text{ unde:}$$

p = cantitatea anuală de precipitații;
 T = temperatura medie anuală;
 7 = constantă.

La Stâna de Vale indicele Köppen are valoarea de 149,3.

Indicele d'Emberger se utilizează mai ales pentru arealele cu influențe mediteraneene și se calculează după formula:

$$I = \frac{50p}{(M+n)(M-n)}, \text{ unde:}$$

p = cantitatea anuală de precipitații;
 n = numărul zilelor cu ploaie;
 M = temperatura maximă;
 m = temperatura minimă.

Indicele Bagnouls-Gaussen este un parametru sezonier al lunilor în care suma precipitațiilor, exprimate în mm, nu atinge dublul mediei termice și indică gradul de uscăciune al lunilor respective.

Indicele Bagnouls-Legris se calculează după formula:

$$I = K [N-n - (b + \frac{r}{2})], \text{ unde:}$$

N = numărul zilelor dintr-o lună
 n = numărul zilelor cu ploaie;

b = numărul zilelor cu ceață;

r = numărul zilelor cu rouă;

K = coeficient a cărui valoare variază între 0,6 și 1, conform higrometriei aerului.

Indicele Musset-Gaussen se obține prin gruparea celor patru anotimpuri în ordinea descrescândă a cantităților de precipitații și se exprimă printr-o formulă dată de inițialele anotimpurilor. Pentru Stâna de Vale, indicele Musset-Gaussen este dat de formula V.P.T.I. (tabelul 27).

Tabelul 27 - Indicele Musset-Gaussen determinat pentru stația Stâna de Vale

Anotimpul	Cantitatea de precipitații (mm)	Indicele
Primăvara	415,8	V.P.T.I.
Vara	484,6	
Toamna	357,6	
Iarna	350,0	

Sursa: date prelucrate după Arhiva INMH

Indicele Angot evidențiază nuanța climatică a fiecărei luni din an, în sensul că valorile subunitare redau lunile secetoase, iar valorile supraunitare lunile ploioase. Acest coeficient se obține pe baza formulei:

$$K = \frac{q \cdot 365}{Q \cdot n}, \text{ unde:}$$

K = indicele pluviometric Angot;

q = cantitatea medie lunară de precipitații;

Q = cantitatea medie anuală de precipitații;

n = numărul de zile dintr-o lună;

365 = numărul de zile dintr-un an.

În cazul stației Stâna de Vale valorile indicelui pluviometric Angot sunt supraunitare în lunile aprilie, mai, iunie, iulie și decembrie, iar în celelalte luni sunt subunitare, dar aproape de unitate, excepție: luna februarie (tabelul 28).

Tabelul nr. 28 - Valorile indicelui pluviometric Angot la Stâna de Vale

Lu na	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
K	0,94	0,65	0,85	1,09	1,18	1,55	1,13	0,91	0,92	0,89	0,86	1,04

Sursa: date prelucrate după Arhiva INMH

Anomalia standardizată de precipitații (ASP) evidențiază caracterul pluviometric al unei perioade (an, lună etc.) și se calculează după formula:

$$ASP = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$$

în care: x_i = cantitatea lunară sau anuală de precipitații dintr-un anumit an;

$\bar{x}$ = media multianuală a cantităților lunare sau anuale de precipitații;

σ = abaterea medie pătratică a șirului de valori;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

N = numărul de ani luați în calcul.

Perioadele în care ASP are valori sub -1 sunt considerate deficitare sub aspect pluviometric, respectiv *secetoase* ($ASP = -1 \dots -1,5$); *foarte secetoase* ($ASP = -1,5 \dots -2,0$); *excesiv de secetoase* ($ASP = -2,0 \dots -2,5$); *excepțional de secetoase* ($ASP < -2,5$); iar cele în care ASP are valori mai mari de 1 , sunt considerate excedentare sub aspect pluviometric, respectiv *ploioase* ($ASP = 1 \dots 1,5$); *foarte ploioase* ($ASP = 1,5 \dots 2$); *excesiv de ploioase* ($ASP = 2 \dots 2,5$); *excepțional de ploioase* ($ASP > 2,5$).

Exemplificând tot cu Stâna de Vale (tabelul 29), constatăm că la această stație în majoritatea anilor anomalia standardizată de precipitații este cuprins între -1 și 1 , fapt ce indică normalitatea din punct de vedere pluviometric. Din șirul de 20 de ani analizați, doar anii 1980 (excesiv de ploios), 1981 (ploios), 1983, 1987, 1990 (secetoși) și 1995 (foarte ploios) ies din normalitate, situație datorată rolului moderator al muntelui.

Tabelul 29 - Anomalia standardizată de precipitații și caracterul pluviometric al anilor la stația meteorologică Stâna de Vale (1979-1998)

Anul	Media anuală	Media multianuală	Abaterea medie pătratică	ASP	Caracteristica anului
1979	1823,3	1650,9	315,3	0,5	Normal
1980	2370,0	1650,9	315,3	2,3	Excesiv de ploios
1981	2120,2	1650,9	315,3	1,5	Ploios
1982	1668,2	1650,9	315,3	0,1	Normal
1983	1257,2	1650,9	315,3	-1,2	Secetos
1984	1718,0	1650,9	315,3	0,2	Normal
1985	1625,7	1650,9	315,3	-0,1	Normal
1986	1427,6	1650,9	315,3	-0,7	Normal
1987	1266,6	1650,9	315,3	-1,2	Secetos
1988	1618,1	1650,9	315,3	-0,1	Normal
1989	1529,1	1650,9	315,3	-0,4	Normal
1990	1295,8	1650,9	315,3	-1,1	Secetos
1991	1408,5	1650,9	315,3	-0,8	Normal
1992	1364,7	1650,9	315,3	-0,9	Normal
1993	1578,7	1650,9	315,3	-0,2	Normal
1994	1361,8	1650,9	315,3	-0,9	Normal
1995	2221,0	1650,9	315,3	1,8	Foarte ploios
1996	1701,5	1650,9	315,3	0,2	Normal
1997	1836,6	1650,9	315,3	0,6	Normal
1998	1825,3	1650,9	315,3	0,6	Normal

Sursa: date prelucrate după Arhiva INMH

Pe lângă indicii amintiți, în studiile agroclimatice, biogeografice etc. se utilizează o serie de indici care *stabilesc valorile de precipitații din anumite perioade* a căror pondere din cantitatea anuală este *caracteristică*. Acești indici sunt următorii:

- *suma precipitațiilor din perioada în care temperatura depășește 10°C*, exprimă cantitatea totală de precipitații din perioada de vegetație, când temperatura depășește 5°C, pentru vegetația ierboasă și 10°C pentru cea forestieră.

- *suma precipitațiilor din perioada rece a anului* (noiembrie-martie) evidențiază cantitatea totală de apă provenită din precipitațiile solide și lichide, acumulată în orizontul biologic activ și care va fi folosită în sezonul cald de către structurile vegetale. La Stâna de Vale acest indice are valoarea de 718,9 mm.

- *suma precipitațiilor din perioada caldă a anului* (aprilie-octombrie) exprimă cantitatea de precipitații care cade în sezonul cald al anului (907,9 mm la Stâna de Vale), utilizată de plante în perioada în care se înregistrează cele mai mari valori termice.

3.7.8. *Variațiile de lungă durată ale precipitațiilor atmosferice*

Pentru cercetarea variațiilor de lungă durată ale precipitațiilor atmosferice se utilizează metoda mediilor glisante, care are rolul de a atenua variațiile din perioadele relativ scurte și de a reliefa eventualele modificări de lungă durată a lor (vezi cap. 3.3.8). Maria Iliescu (1996), prelucrând valorile cronologice ale cantităților de precipitații atmosferice de la stațiile cu șir foarte lung de observații din România, sub forma mediilor glisante pe intervale de câte 10 ani (figura 26), arată că în ultimele decenii a avut loc o scădere a cantităților de precipitații, dar care nu iese din limitele variabilității naturale. Astfel, intervalul secetos actual este comparabil cu cel din a doua jumătate a secolului al XIX-lea sau cu intervalele secetoase de la începutul și de la mijlocul secolului al XX-lea; autoarea apreciază că este probabil ca în România, valorile medii decenale să se apropie de "normală" și chiar să o depășească.

Variațiile de lungă durată se pot evidenția și cu ajutorul izopletelor, care au la bază tot mediile glisante. Metoda a fost folosită la noi, atât pentru determinarea variațiilor de lungă durată ale precipitațiilor atmosferice în sudul României, de către Stoenescu, Schiopescu (1963, 1964); de către Chiriac și colab. (1966), pentru precipitațiile din Moldova; de către Dincă și colab. (1969, 1970), pentru precipitațiile din bazinul Transilvaniei și din Moldova; de către Bogdan (1980), pentru a evidenția evoluția în timp a perioadelor ploioase și secetoase în Câmpia Bărăganului, cât și pentru a analiza variațiile de lungă durată ale altor elemente climatice, precum umezeala relativă (Stoenescu și colab., 1967) etc.




Figura 26 – Graficul mediilor glisante ale cantităților de precipitații, pe intervale de câte 10 ani, la câteva stații din România (după Iliescu, 1996).

3.8. Prelucrarea datelor privind presiunea atmosferică

Cunoașterea regimului și a repartiției presiunii atmosferice prezintă o deosebită importanță, atât teoretică, deoarece permite explicarea genezei circulației generale și locale a atmosferei, a unor procese precum evaporația, evapotranspirația etc., cât și practică, întrucât are o largă aplicabilitate în prevederea vremii, în bioclimatologie etc.

Presiunea atmosferică se măsoară în milimetri coloană de mercur (mm) sau în milibari (mb).

Întrucât în tabelele meteorologice s-a folosit mai întâi milibarul, în cazul șirurilor lungi de observații care cuprind ambele tipuri de unități (mb sau mm), trebuie făcută transformarea lor în același tip de unitate de măsură, după cum urmează:

$$1 \text{ mb} = 100 \text{ dyn/cm}^2 = 0,75 \text{ mm Hg};$$

$$1 \text{ mm Hg} = 1333,0 \text{ dyn/cm}^2 = 1,33 \text{ mb}.$$

În sistemul internațional de unități s-a stabilit ca unitate fundamentală pentru presiune *pascalul* (Pa). Relația dintre presiunea atmosferică exprimată în mb și pascali este:

$$1 \text{ mb} = 10^3 \text{ dyn/cm}^2 = 10^3 \text{ dyn/10}^{-4} \text{ m}^2 = 10^7 \text{ dyn/m}^2 = 100 \text{ N/m}^2 = 100 \text{ Pa} = 1 \text{ hPa, deci}$$

$$1 \text{ mb} = 1 \text{ hPa} \quad (\text{Pop, 1998}).$$

Prelucrarea datelor presiunii atmosferice se aseamănă foarte mult cu cea a datelor temperaturii aerului, respectiv, se folosesc aceiași parametri și aceeași metodică.

3.9. Prelucrarea datelor eoliene

Vântul este o mărime vectorială caracterizată prin direcție și viteză, fapt pentru care în studiile climatologice se calculează următorii parametri:

- frecvența (%) și viteza (m/s) medie și maximă lunară și anuală a vântului pe cele opt direcții cardinale;
- viteza medie și maximă (m/s) indiferent de direcție;
- frecvența vitezei vântului pe diferite intervale de viteză (0-1; 2-5; 6-10; 11-15; 16-20; 21-24; 25-28; 29-34; 35-40; >40 m/s).

Parametrii menționați pot fi calculați pe intervale diurne, lunare, anotimpuale, anuale și prezintă o mare importanță teoretică și practică. Astfel, cunoscând frecvența vântului pe direcții se pot aprecia caracteristicile și direcția de deplasare a maselor de aer care advectionează o anumită regiune. În activitatea practică, datele eoliene interesează în numeroase domenii: prevederea vremii, activitatea aeroportuară, amplasarea construcțiilor industriale și urbane, lucrările agrotehnice, energetice etc., motiv pentru care nici un studiu climatic nu poate face abstracție de ele.

3.9.1. Frecvența și viteza medie și maximă, lunară și anuală a vântului pe direcții cardinale

Acești parametri pot fi reprezentați pe un singur grafic, numit *roza vânturilor* care cuprinde cele opt direcții cardinale pe care se transpun datele referitoare la frecvența și viteza medie sau maximă, lunară sau anuală a vântului (Atlas climatologic al R.S.R., 1966). În acest scop, pe baza datelor din tabelele meteorologice în care frecvența este exprimată în număr de cazuri, folosind regula de trei simplă, se calculează frecvența vântului în procente.

Valorile obținute se centralizează într-un tabel alături de cele privind viteza vântului, exprimată în m/s și calmul atmosferic (situația în care nu bate vântul), exprimat în procente (tabelul 30).

În final, datele se reprezintă grafic prin linii care unesc punctele cu anumite valori ale frecvenței și vitezei vântului, marcate pe cele opt direcții cardinale. Calmul se reprezintă printr-un cerc cu raza corespunzătoare valorii acestuia sau printr-un cerc cu raza arbitrară în interiorul căreia se înscrie valoarea calmului (figura 27). În acest caz, transpunerea frecvenței vântului pentru fiecare direcție începe de la linia cercului care redă calmul.

Analizând frecvența și viteza medie anuală a vântului la Stâna de Vale (figura 27), se constată că acesta bate, de obicei, din sector vestic (8,2%), cu viteze medii anuale reduse, sub 3 m/s. În general, predomină calmul care are o frecvență foarte mare, 72,9%, datorită poziției stației în cadrul depresiunii omonime, fapt ce îi conferă stațiunii un climat de adăpost.

Tabelul 30 – Frecvența (%) și viteza medie anuală a vântului pe direcții (m/s) la Stâna de Vale

	N	NE	E	SE	S	SV	V	NV
Frecvența (%)	1,1	1,3	2,8	5,2	2,4	2,0	8,2	3,9
Viteza(m/s)	1,3	1,6	2,4	2,6	2,2	2,0	2,2	2,2
Calmul (%)1/100	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73




Fig. 27 - Roza anuală a vântului la Stâna de V.

3.9.2. Viteza medie a vântului, indiferent de direcție

Prezintă aceeași utilitate practică și se calculează pe baza valorilor medii lunare și anuale specifice celor opt direcții, însumând valorile înregistrate pe acestea în fiecare lună și în decursul unui an, rezultatele obținute fiind apoi împărțite la opt, conform tabelului nr. 31. Reprezentarea grafică se face simplu, sub forma unor coloane corespunzătoare celor 12 luni din an și valorii medii anuale (figura 28).

Tabelul 31 – Calcularea vitezei medii lunare și anuale a vântului, indiferent de direcție la stația meteorologică Grivița (1961-1970)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
N	4,6	8,2	6,0	4,2	3,3	3,1	2,9	2,8	3,0	2,9	4,3	4,8	4,2
NE	6,0	6,7	5,9	4,8	4,6	3,2	3,2	2,6	3,4	3,5	4,7	6,0	4,6
E	1,1	2,5	2,4	3,1	2,8	2,3	2,0	2,2	2,3	2,3	2,4	1,5	2,2
SE	1,7	2,6	2,8	3,8	3,7	2,9	2,2	2,4	2,3	2,1	2,5	2,2	2,6
S	1,5	1,9	1,8	2,6	2,2	2,2	1,6	1,9	2,1	2,0	1,4	1,9	1,9
SV	2,8	3,0	2,7	2,4	2,5	2,4	2,7	1,7	1,7	1,9	2,3	2,5	2,4
V	2,8	2,6	2,8	3,5	2,6	2,3	2,8	3,3	1,9	2,1	2,5	2,4	2,6
NV	1,9	1,9	1,9	2,7	2,4	2,4	2,1	2,2	1,4	1,6	2,3	1,6	2,0
Med	2,8	3,7	3,3	3,4	3,0	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,8	2,9	2,8

Sursa: Bogdan., 1980




Fig. 28 - Viteza medie lunară și anuală a vântului, indiferent de direcție, la Grivița în perioada 1961-1970 (valori prelucrate după Bogdan, 1980)

Figura 28, evidențiază că la Grivița, stație situată în Câmpia Bărăganului, viteza vântului depășește 2 m/s în toate lunile anului, cea mai mică fiind la sfârșitul verii și începutul toamnei (lunile august – octombrie), când, datorită predominării regimului anticiclonic, se înregistrează 2,3 – 2,4 m/s. Cea mai mare viteză a vântului, 3,3 – 3,7 m/s, se produce la sfârșitul iernii și începutul primăverii, ca urmare a accentuării contrastelor termo-barice dintre uscat și mare, respectiv dintre dorsala Anticiclonului Est-European și Minima Mediteraneeană.

3.9.3. Frecvența vântului pe intervale de viteză

Tot în scopuri practice se calculează frecvența vântului pe anumite intervale de viteză (0-1; 2-5; 6-10; 11-15; 16-20; 21-24; 25-28; 29-34; 35-40; >40 m/s), utilizând valorile medii zilnice pentru fiecare lună și an, exprimate în număr de cazuri și procente. Acestea se extrag din tabelele meteorologice TM₁, pentru fiecare lună și an, pe o anumită perioadă; de exemplu: 40 de ani, după care se face media lor lunară și anuală.

Pentru a transforma numărul total de cazuri din fiecare lună și an în procente, se ține seama de numărul total de observații din fiecare lună și din fiecare an, conform exemplului:

- pentru ianuarie : 31 zile x 4 observații x 40 ani = 124 observații x 40 ani = 4960 observații = 100%.
- pentru februarie : 28 zile x 4 observații x 40 ani = 112 observații x 40 ani = 4480 observații = 100%, ș.a.m.d.
- pentru an: 365 zile x 4 observații x 40 ani = 1460 observații x 40 ani = 58400 observații = 100%.

În final, se aplică regula de trei simplă pentru fiecare interval, obținându-se mai multe valori procentuale care se introduc într-un tabel, conform modelului prezentat mai jos (tabelul 32).

Tabelul 32 - Frecvența vântului pe diferite intervale de viteză (%) la Grivița (1961-1970)

m/s	I	II	III	IV	V	VI
0-1	34,2	32,5	29,4	28,1	31,6	43,3
2-5	43,8	40,3	46,2	49,3	50,3	46,1
6-10	12,0	14,4	15,5	17,5	15,2	9,3
11-15	4,5	7,9	4,5	3,6	2,3	1,3
>16	5,5	4,9	4,4	1,3	5,6	-
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

m/s	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
0-1	44,4	53,2	53,4	54,6	41,9	36,8	40,3
2-5	44,1	37,7	36,5	33,4	43,6	41,3	42,8
6-10	10,5	8,0	8,4	11,5	9,5	12,9	12,0
11-15	0,8	0,9	1,3	0,5	3,3	5,4	3,0
>16	0,2	0,2	0,4	-	1,7	3,6	1,9
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sursa: Bogdan, 1980.

De asemenea, pentru a le reprezenta sub forma unui grafic de frecvență (figurile 29 și 30), trebuie însumate toate procentele din toate intervalele de viteză ale vântului specifice unei luni sau unui an care trebuie să dea 100% (tabelul 32).




Fig. 29 - Frecvența lunară a vânturilor cu diferite viteze la stația Grivița (după Bogdan, 1980): 1, 0 – 1 m/s; 2, 2 – 5 m/s; 3, 6 – 10 m/s; 4, peste 11 m/s



Fig. 30 - Frecvența anuală a vânturilor cu diferite viteze la stația Grivița (după Bogdan, 1980)

Din figurile 29 și 30, rezultă că la stația Grivița, în decursul unui an, cea mai mare frecvență o au vânturile slabe, sub 1 m/s, care predomină în lunile august – octombrie ca urmare a instalării regimului anticiclonic de la sfârșitul verii și începutul toamnei, determinat de extinderea spre est a dorsalei Anticiclonului Azoric. La polul opus se află vânturile cu viteze mari, de peste 11 m/s care apar mai ales în lunile de iarnă, urmare a extinderii spre vest a dorsalei Anticiclonului Est-European și a apropierii ei de Minima Mediteraneană, la contactul cărora gradientii barici mari determină vânturi puternice.

3.10. Prelucrarea datelor privind principalele fenomene meteorologice

Fenomenele meteorologice analizate în studiile climatice sunt cele care au efecte dăunătoare asupra activității economice: grindina, ploile torențiale, stratul de zăpadă, lapovița, ceața, pâcla, bruma, înghețul, poleiul, chiciura, viscolul, suspensiile de praf, suspensiile de nisip, orajele, vânturile tari (viteza vântului ≥ 14 m/s), vijeliile (viteza vântului ≥ 16 m/s).

Prelucrarea datelor se face separat pentru fiecare fenomen meteorologic și constă în analiza principalilor parametri care îl definesc:

- numărul mediu lunar și anual de zile cu fenomen;
- numărul maxim lunar și anual de zile cu fenomen;
- probabilitatea de producere și gradul de asigurare a numărului de zile cu fenomen;
- intervalul mediu și maxim lunar și anual favorabil producerii fenomenului;
- intervalul diurn sau nocturn favorabil producerii fenomenului;
- durata medie și maximă a fenomenului;
- data medie și extremă de apariție a fenomenului;
- intervalul de risc pentru fenomenul studiat.

Numărul și tipul parametrilor calculați diferă de la un fenomen la altul și în funcție de scopul studiului. Astfel, pentru stratul de zăpadă se calculează mai mulți parametri, mai ales dacă se are în vedere un studiu practic:

- data medie de producere a primului și ultimului strat de zăpadă;
- durata medie posibilă a stratului de zăpadă;
- probabilitatea de producere a primului și ultimului strat de zăpadă;
- data extremă de apariție a primului și ultimului strat de zăpadă;
- durata maximă posibilă a stratului de zăpadă;
- grosimea medie și maximă decadică a stratului de zăpadă;
- numărul mediu și maxim lunar și suma anuală de zile cu sol acoperit cu zăpadă;
- probabilitatea de producere și gradul de asigurare a numărului de zile cu sol acoperit cu zăpadă;
- intervalul de risc pentru stratul de zăpadă.

3.10.1. Data medie de producere a primului și ultimului strat de zăpadă

Data medie de apariție a primului și ultimului strat de zăpadă încadrează epoca (intervalul) cu zăpadă a unei regiuni. Pentru a determina data medie de producere a unui fenomen meteorologic, în cazul nostru a primului strat de zăpadă depus la Stâna de Vale, se înscriu într-un tabel datele de producere ale primului strat de zăpadă corespunzătoare fiecărui an din șirul luat în calcul pentru stația amintită. Pentru fiecare dată în care s-a produs primul strat de zăpadă dintr-un an, se trece codul zilei respective, utilizând tabelul 33.

Tabelul 33 – Cifra de cod corespunzătoare fiecărei zile din an

Z/L	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	BIS
1	32	60	91	121	152	182	213	244	274	305	335	52	
2	33	61	92	122	153	183	214	245	275	306	336	56	
3	34	62	93	123	154	184	215	246	276	307	337	60	
4	35	63	94	124	155	185	216	247	277	308	338	64	
5	36	64	95	125	156	186	217	248	278	309	339	68	
6	37	65	96	126	157	187	218	249	279	310	340	72	
7	38	66	97	127	158	188	219	250	280	311	341	76	
8	39	67	98	128	159	189	220	251	281	312	342	80	
9	40	68	99	129	160	190	221	252	282	313	343	84	
10	41	69	100	130	161	191	222	253	283	314	344	88	
11	42	70	101	131	162	192	223	254	284	315	345	92	
12	43	71	102	132	163	193	224	255	285	316	346	96	
13	44	72	103	133	164	194	225	256	286	317	347	00	
14	45	73	104	134	165	195	226	257	287	318	348	04	
15	46	74	105	135	166	196	227	258	288	319	349	08	
16	47	75	106	136	167	197	228	259	289	320	350	12	
17	48	76	107	137	168	198	229	260	290	321	351	16	
18	49	77	108	138	169	199	230	261	291	322	352		
19	50	78	109	139	170	200	231	262	292	323	353		
20	51	79	110	140	171	201	232	263	293	324	354		
21	52	80	111	141	172	202	233	264	294	325	355		
22	53	81	112	142	173	203	234	265	295	326	356		
23	54	82	113	143	174	204	235	266	296	327	357		
24	55	83	114	144	175	205	236	267	297	328	358		
25	56	84	115	145	176	206	237	268	298	329	359		
26	57	85	116	146	177	207	238	269	299	330	360		
27	58	86	117	147	178	208	239	270	300	331	361		
28	59	87	118	148	179	209	240	271	301	332	362		
29	60	88	119	149	180	210	241	272	302	333	363		
30		89	120	150	181	211	242	273	303	334	364		
31		90		151		212	243		304		365		
Z/L	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

Data medie de producere a primului strat de zăpadă la Stâna de Vale se obține însumând toate cifrele de cod din perioada analizată, respectiv 1979-2000, valoarea obținută fiind apoi împărțită la numărul de ani luați în calcul (tabelul 34).

Rezultatul acestui calcul, 302, reprezintă cifra de cod a datei medii, adică 29.X.

Similar se calculează și data medie a ultimului strat de zăpadă care la Stâna de Vale, se produce la 07.V. Așadar, intervalul mediu anual posibil cu zăpadă la Stâna de Vale este cuprins între 29.X și 07.V.

Tabelul 34 – Data medie de producere a primului strat de zăpadă la Stâna de Vale

Anul	Data producerii primului strat de zăpadă	Codul zilei
1979	06.11	310
1980	02.11	307
1981	07.11	311
1982	12.12	346
1983	12.11	316
1984	16.11	321
1985	15.10	288
1986	06.11	310
1987	01.11	305
1988	01.11	306
1989	04.10	277
1990	06.11	310
1991	23.10	296
1992	25.10	299
1993	14.11	318
1994	07.10	280
1995	02.08	214
1996	22.10	296
1997	16.10	289
1998	01.11	305
1999	15.10	288
2000	16.12	351

Sursa: date prelucrate după Arhiva INMH

3.10.2. Durata medie posibilă a stratului de zăpadă

Este indicată de datele medii de producere a primului și ultimului strat de zăpadă, respectiv 29.X și 07.V. Între aceste date, la Stâna de Vale, este posibilă apariția stratului de zăpadă care însumează în medie 190 zile.

3.10.3. Probabilitatea de producere a primului și ultimului strat de zăpadă

Pentru determinarea probabilității de producere se pleacă de la tabelul 34, căruia i se mai adaugă o coloană corespunzătoare abaterii față de data medie, parametru necesar stabilirii abaterii standard, pe baza

căreia se calculează mai târziu probabilitatea producerii primului și ultimului strat de zăpadă.

Exemplificăm tot cu stația Stâna de Vale, pentru care extindem tabelul cu încă o coloană corespunzătoare abaterii față de data medie, în cadrul căreia se includ alte două coloane. Prima corespunde abaterii față de data medie ($d=x_i-m$), calculată ca diferență dintre codul zilei corespunzător termenului din șir (x_i) și data medie multianuală de producere a primului strat de zăpadă (m), iar în a doua se notează valorile pătratice ale abaterii față de medie (d^2) (tabelul 35).

Tabelul 35 – Data medie de producere a primului strat de zăpadă și abaterea față de data medie la Stâna de Vale

Anul	Data producerii primului strat de zapada	Codul zilei	Abaterea față de data medie	
			$d=x_i-m$	d^2
1979	06.11	310	8	64
1980	02.11	307	4	16
1981	07.11	311	9	81
1982	12.12	346	44	1936
1983	12.11	316	14	196
1984	16.11	321	18	324
1985	15.10	288	-14	196
1986	06.11	310	8	64
1987	01.11	305	3	9
1988	01.11	306	3	9
1989	04.10	277	-25	625
1990	06.11	310	8	64
1991	23.10	296	-6	36
1992	25.10	299	-4	16
1993	14.11	318	16	256
1994	07.10	280	-22	484
1995	02.08	214	-88	7744
1996	22.10	296	-7	49
1997	16.10	289	-13	169
1998	01.11	305	3	9
1999	15.10	288	-14	196
2000	16.12	351	48	2304

Sursa: date prelucrate după Arhiva INMH

Pe baza acestor valori se calculează apoi abaterea standard (σ), cu ajutorul formulei:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}}, \text{ în care:}$$

σ = abaterea medie standard;

Σd^2 = suma tuturor valorilor pătratice ale abaterii față de medie;

n = numărul de ani luați în calcul.

Pentru Stâna de Vale, abaterea medie pătratică are valoarea:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{n}} = \sqrt{\frac{14847}{22}} = 25,98.$$

În final, pentru determinarea probabilității de producere a primului strat de zăpadă se întocmește un nou tabel (tabelul 36), astfel:

- în prima coloană a tabelului se înscriu *pragurile de probabilitate* (a) de la 1 până la 99%.

- în a doua coloană se înscriu *valorile variabilei normale* (b) (distribuția Gauss normal logaritmă), calculate pentru pragurile de probabilitate respective.

- în a treia coloană se calculează *abaterea față de medie* (în zile) (c), pe baza formulei:

$$c = \sigma \cdot b.$$

De exemplu, pentru probabilitatea de 60%, obținem:

$$c = \sigma \cdot b = 25,98 \cdot 0,25 = 6;$$

pentru probabilitatea de 40%, găsim:

$$c = \sigma \cdot b = 25,98 \cdot (-0,25) = -6 \text{ s.a.m.d.}$$

- în a patra coloană se calculează *data probabilă de producere a primului strat de zăpadă* (d) față de medie, adunând la data medie numărul de zile corespunzătoare abaterii față de medie pentru probabilitatea dorită, conform relației:

$$d = m + c.$$

Spre exemplu, pentru probabilitatea de 60%, se adună la cifra de cod a datei medii de producere a primului strat de zăpadă numărul de zile corespunzător:

$$d = m + c = 302 + 6 = 308 = 04.XI;$$

pentru probabilitatea de 40%, procedând la fel, obținem:

$$d = m + c = 302 + (-6) = 296 = 23.X \text{ s.a.m.d.}$$

Tabelul 36 – Probabilitatea de producere a primului strat de zăpadă la Stâna de Vale

Probabilitatea (%) (a)	Valorile variabilei normale (b)	Abaterea față de medie (în zile) (c)	Data probabilă a apariției primului strat de zăpadă (d)
1	-2,33	-61	29.VIII
5	-1,64	-43	16.IX
10	-1,28	-33	26.IX
20	-0,84	-22	07.X
30	-0,52	-14	15.X
40	-0,25	-6	23.X
50	0	0	29.X
60	0,25	6	04.XI
70	0,52	14	12.XI
80	0,84	22	19.XI
90	1,28	33	1.XII
95	1,64	43	11.XII
99	2,33	61	29.XII

Sursa: date prelucrate după Arhiva INMH

Tabelul 36 arată că la stația Stâna de Vale, valorile situate deasupra celei care reprezintă data medie de producere a primului strat de zăpadă (29.X), indică cele mai timpurii date de producere a primului strat de zăpadă, cu probabilități mai mici de producere, iar cele de sub data medie evidențiază cele mai târzii date de producere ale primului strat de zăpadă, care au, evident, probabilități de producere mai mari.

De reținut că această metodă poate fi aplicată și altor fenomene meteorologice, respectiv pentru *determinarea probabilității de producere și a gradului de asigurare a primului și ultimului îngheț, a primei și ultimei brume, a primului și ultimului strat de chiciură.*

3.10.4. Datele extreme de apariție a primului și ultimului strat de zăpadă

Cel mai timpuriu și cel mai târziu strat de zăpadă sunt consecința unor situații accidentale de vreme și nu se pot menține pe sol, fiind topite imediat sub acțiunea razelor solare sau a advecțiilor de aer cald. Aceste date interesează mai ales în studiile climatice cu caracter de risc, deoarece obligă vegetația să-și scurteze ciclul anual de viață activă, ele fiind cu atât mai periculoase cu cât sunt mai decalate față de data medie.

Determinarea lor se face prin extragerea datelor corespunzătoare dintr-un anumit număr de ani. Spre exemplu, la Stâna de Vale, cel mai timpuriu strat de zăpadă s-a depus la data de 02.VIII.1995, iar cel mai târziu la 29.V.1991 (tabelul 37).

Tabelul 37 – Datele extreme de apariție ale primului și ultimului strat de zăpadă la Stâna de Vale

Data extremă a	
primului	ultimului
strat de zăpadă	
06.11.1979	19.04.1979
02.11.1980	13.05.1980
07.11.1981	03.05.1981
12.12.1982	18.05.1982
12.11.1983	21.04.1983
16.11.1984	05.05.1984
15.10.1985	03.05.1985
06.11.1986	04.05.1986
01.11.1987	16.05.1987
01.11.1988	11.05.1988
04.10.1989	14.05.1989
06.11.1990	30.04.1990
23.10.1991	29.05.1991
25.10.1992	25.04.1992
14.11.1993	04.05.1993
07.10.1994	26.04.1994
02.08.1995	14.05.1995
22.10.1996	03.05.1996
16.10.1997	15.05.1997
01.11.1998	29.04.1998
15.10.1999	11.05.1999
16.12.2000	15.05.2000

Sursa: date prelucrate după Arhiva INMH

3.10.5. Durata maximă posibilă a stratului de zăpadă

Se obține ca diferență între data de producere a celui mai timpuriu și a celui mai târziu strat de zăpadă și reprezintă intervalul anual maxim posibil cu solul acoperit cu strat de zăpadă. Urmărind valorile înscrise în tabelul 37, se constată că la Stâna de Vale aceasta însumează 299 zile.

3.10.6. Grosimea medie și maximă decadală a stratului de zăpadă

Grosimea medie și maximă decadală a stratului de zăpadă se determină pentru fiecare decadă în parte din lunile în care s-a produs și se reprezintă pe același grafic sub formă de coloane colorate diferit. Pentru calcularea grosimii medii decadice a stratului de zăpadă se împarte suma datelor zilnice la numărul zilelor cu strat de zăpadă, sens în care se utilizează șiruri lungi de observații.

După cum se știe, distribuția stratului de zăpadă este neuniformă, motiv pentru care se calculează valorile medii și se extrag valorile extreme decadale ale grosimii stratului de zăpadă. Reprezentarea grafică a acestor valori permite aprecierea intervalelor decadale în care se produc cele mai mari grosimi medii ale stratului de zăpadă și grosimile maxime absolute ale acestuia (fig. 31).




Fig. 31 - Grosimea medie și maximă decadală a stratului de zăpadă;
Stâna de Vale

Graficul din figura 31, ilustrează grosimile medii și maxime ale stratului de zăpadă la Stâna de Vale, în perioada 1979-2000. Din acest grafic rezultă că cele mai mari grosimi maxime ale stratului de zăpadă se produc în a treia decadă a lunii ianuarie, când acesta a atins 301 cm, iar cele mai mari grosimi medii ale stratului de zăpadă, se înregistrează în ultima decadă a lunii februarie, 86,1 cm, ca urmare a acumulării în timp a zăpezii.

3.10.7. Numărul de zile cu sol acoperit cu zăpadă

Numărul mediu și maxim lunar și durata medie anuală de zile cu sol acoperit cu zăpadă completează analiza climatologică a acestui fenomen. Numărul maxim lunar se determină cu ajutorul datelor lunare de observații, calculând diferența dintre numărul de zile cu sol acoperit cu strat de zăpadă și numărul total de zile din luna respectivă.

Numărul mediu lunar se obține însumând valorile lunii respective din șirul de ani luați în calcul, rezultatul obținut fiind apoi împărțit la numărul de ani.

Anual, interesează sumele valorilor medii și maxime lunare care se obțin, adunând valorile respective pentru fiecare lună din an (tabelul 38).

Din figura 32 rezultă că la Stâna de Vale, cele mai multe zile cu sol acoperit cu zăpadă, atât ca valoare medie, cât și ca valoare maximă, se înregistrează în luna ianuarie, iar anual se produc 153,2, respectiv 184 zile cu sol acoperit cu zăpadă. Aceste valori mari se datorează poziției stației care este amplasată într-o depresiune situată la 1100 m altitudine, în calea maselor de aer vestice care aduc precipitații bogate în timpul iernii.

Tabelul 38 - Numărul mediu (*m*) și maxim (*M*) lunar și durata anuală (în zile) cu sol acoperit cu zăpadă la Stâna de Vale

Lu na	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
m	30,9	28,0	29,5	20,7	2,5	0	0	0	0	1,2	13,7	26,6	153,2
M	31	29	31	30	15	0	0	0	1	10	29	31	184

Sursa: Arhiva INMH




Fig. 32 - Numărul mediu și maxim lunar și suma anuală de zile cu sol acoperit cu zăpadă la Stâna de Vale

3.10.8. Intervalul de risc pentru stratul de zăpadă

În unele studii cu caracter practic se determină și intervalul de risc, care, pentru stratul de zăpadă, este dat de perioada din an în care influența lui este negativă și poate produce pagube. Această situație se întâlnește *toamna*, când primele ninsori determină apariția stratului de zăpadă, care, asociat cu răcirii intense, înghețuri sau viscole poate afecta negativ activitățile din agricultură, transporturi, peisajul în general, dar și *primăvara* când, în urma topirii bruște a stratului de zăpadă acumulat în timpul iernii sau a ninsorilor abundente, determină inundații, înghețarea culturilor surprinse la începutul perioadei de vegetație, accelerarea proceselor de versant, reducerea perioadei favorabile activităților turistice de iarnă.

Intervalul riscului de toamnă este cuprins între data celui mai timpuriu strat de zăpadă și data medie a primului strat de zăpadă de la începutul sezonului rece, iar *intervalul riscului de primăvară* este plasat între data medie a ultimului strat de zăpadă și data celui mai timpuriu strat de zăpadă de la sfârșitul sezonului rece (Bogdan, Niculescu, 1999).

În cazul Stănei de Vale, durata intervalului de risc pentru stratul de zăpadă este redusă, fiind cuprinsă între 88 zile toamna și 22 zile primăvara, ca urmare a rolului moderator al muntelui.

3.11. Întocmirea diagramelor climatice

În studiile cu caracter biogeografic, agroclimatic etc., se utilizează frecvent o serie de diagrame climatice simple și complexe (curbe de variație, diagrame, climograme de diferite tipuri etc.), a căror întocmire presupune utilizarea valorilor medii lunare, anuale sau multianuale de temperatură și precipitații, dar și pe cele ale evapotranspirației potențiale (ETP) și ale evapotranspirației reale (ETR), care se obțin din tabelele meteorologice.

3.11.1. Curba de variație

Este un grafic simplu realizat pe baza valorilor medii lunare multianuale de temperatură și evidențiază variația acesteia în decursul unui an, iar prin trasarea unor praguri termice pot fi reliefate fenofazele caracteristice plantelor și durata sezonului de vegetație.

Întocmirea graficului este simplă: pe axa orizontală se notează lunile, iar pe cea verticală valorile de temperatură. Mersul lunar al temperaturii aerului se marchează printr-o curbă care intersectează dreapta ce indică pragul termic de 0°C , în două puncte caracteristice, situate pe panta ascendentă, respectiv descendentă a curbei. Intervalul în zile, cuprins între cele două puncte în care curba indică valori pozitive de temperatură, reprezintă durata sezonului de vegetație. Spre exemplu, la Stâna de Vale (fig. nr. 33), sezonul de vegetație are o durată de 238 zile, cuprinsă între 23.03, care reprezintă începutul sezonului de vegetație, și 16.11, dată la care acesta se încheie.




Fig. 33 - Curba de variație a temperaturii aerului la Stâna de V

Pe lângă pragul termic de 0°C , pot fi trasate și alte praguri termice, punctele de intersecție ale acestora cu graficul, marcând fazele de dezvoltare caracteristice ale vegetației denumite și *fenofaze*.

La nivelul României, ca urmare a variabilității parametrilor climatici, au fost individualizate, din punct de vedere ecologic, șase sezoane majore în care o biocenoză își modifică fizionomia, numărul de indivizi ce populează teritoriul, biomasa și structura lanțului trofic (Tischer, 1955 citat de Voiculescu, 2001).

Aceste sezoane sunt:

- prevernal: 01.03 - 01.05;
- vernal: 01.05 - 15.06;
- estival: 15.06 - 15.08;
- serotinal: 15.08 - 15.09;
- autumnal: 15.09 - 01.11;
- hibernal: 01.11 - 01.03.

Principalele fenofaze sunt: germinarea, umflarea și deschiderea mugurilor vegetativi, îmbobocirea, înflorirea, fructificarea, coacerea fructelor și a semințelor, căderea fructelor, îngălbenirea frunzelor și căderea lor. Amploarea manifestării fiecărei faze variază de la o specie la alta, de la o asociație vegetală la alta, în funcție de latitudinea și altitudinea arealului în care acesta se situează, precum și în funcție de particularitățile locale ale biotopului.

Totalitatea observațiilor fenologice de la începutul sezonului de vegetație și până la încheierea sa, dispuse cronologic, constituie calendarul naturii, care cuprinde date fenologice asupra plantelor, completate cu observații asupra fenomenelor meteorologice caracteristice biotopului (Voiculescu, 2001).

3.11.2. Climograma Walter - Lieth

Se mai numește *diagrama în scară dublă*, *diagrama Gaussen* sau *diagrama ombrotermică* și presupune reprezentarea grafică a mediilor lunare multianuale de temperatură și de precipitații, în scopul evidențierii într-un anumit areal a intervalelor cu exces sau deficit de umiditate. Astfel, dacă în decursul unui an curba temperaturii se află sub curba precipitațiilor, graficul indică un interval cu exces de umiditate. Dacă în același interval de timp, curba temperaturii se află peste cea a precipitațiilor, graficul scoate în evidență un interval cu deficit de umiditate; dacă cele două curbe, în decursul unui an, se intersectează de mai multe ori, indică mai multe intervale cu exces și deficit de umiditate.

Întocmirea graficului presupune înscrierea valorilor de temperatură și de precipitații pe axa verticală, în timp ce pe cea orizontală se marchează lunile anului. Scările la care se reprezintă cele două elemente climatice trebuie să fie de 1:2 sau 1:3. Spre exemplu, dacă valorile de temperatură se marchează pe scară din 5 în 5°C, lor trebuie să le corespundă pe scara precipitațiilor din dreapta 10 mm, în cazul raportului 1:2 și 15 mm, în cazul raportului 1:3 (figura 34). Aceste raporturi evidențiază, într-un anumit areal, existența unor perioade de secetă, în cazul raportului 1:3. La stația Vârful Omu, situată la altitudini mari, precipitațiile foarte neuniforme și variabile în timp sunt foarte bogate, înregistrându-se trei vârfuri în lunile februarie, iunie și octombrie. Temperaturile lunare sunt scăzute, depășind 5°C doar în lunile iulie și august, motiv pentru care această stație se caracterizează printr-un exces de umiditate caracteristic întregului an.




Fig. 34 – Climograma Walter – Lieth a stației Vârful Omu (după Voiculescu, 2001)

3.11.3. Climograma Péguy

Se întocmește pe baza valorilor medii lunare, anuale sau multianuale de temperatură și precipitații care se notează pe axa verticală, respectiv pe axa orizontală. Pentru realizarea grafică se utilizează următoarele scări:

- 1 mm = 0,5°C pentru temperatură;
- 1 mm = 5,0 mm pentru valori ale precipitațiilor mai mici de 20 mm;

- 1 mm = 10,0 mm pentru valori ale precipitațiilor mai mari de 100,0 mm;

- 1 mm = 20,0 mm pentru valori ale precipitațiilor mai mari de 1000,0 mm.

Graficul va avea forma unei linii închise pe punctul de plecare (lunile decembrie-ianuarie). Pe acest grafic, în punctele de intersecție ale valorilor de temperatură cu cele de precipitații, se notează lunile anului (figura 35).

În funcție de mărimea variațiilor celor doi parametri utilizați în reprezentarea grafică, climatograma se poate prezenta în patru forme, care caracterizează anumite climate, fără a avea însă valoare absolută:

- *extinsă pe verticală*, caracteristică zonei intertropicale cu sezon umed, în care variația temperaturii este foarte mică, iar variația precipitațiilor este puternică.

- *extinsă pe orizontală*, în care variația temperaturii este puternică, iar a precipitațiilor slabă și caracterizează climatul temperat continental al țărmurilor estice.

- *circulară*, caracterizează climatul temperat-oceanic, în care variațiile de temperatură și precipitații sunt slabe.

- *oblică*, în care variațiile de temperatură și precipitații sunt puternice și caracterizează climatul temperat-continental și mediteraneean.

Exemplificăm cu climatograma stației Vârful Omu (figura 35), care este extinsă pe verticală datorită cantităților mari de precipitații căzute într-un an și amplitudinilor termice relativ reduse. Din același grafic rezultă că în această regiune perioada de vegetație este redusă la numai patru luni (iunie, iulie, august, septembrie), datorită climatului aspru cu temperaturi scăzute și precipitații bogate.




Fig. 35 – Climatograma Péguy a stației Vf. Omu (după Voiculescu, 2001).

3.11.4. Diagrama bilanțului hidric lunar

Se elaborează în scopul evidențierii intervalelor cu exces sau deficit de evapotranspirație potențială sau reală. În acest sens se utilizează valorile medii lunare, anuale sau multianuale de temperatură, precipitații, evapotranspirație reală (ETR) și evapotranspirație potențială (ETP) care se reprezintă grafic în scară dublă, la fel ca în cazul climogramei Walter - Lieth. Astfel, pe scara orizontală se trec lunile anului, iar pe cea verticală se înscriu valorile de temperatură, precipitații, evapotranspirație potențială și evapotranspirație reală.*)

Spre exemplu, la stația Vârful Omu, datorită excesului de umiditate și temperaturilor scăzute, evapotranspirația potențială și evapotranspirația reală se manifestă doar în intervalul iunie-septembrie, ambele având aceleași valori cantitative care se situează sub graficul precipitațiilor, atât în cazul raportului 1 : 3 (figura 36), cât și în cazul raportului 1 : 2 (figura 37).




Fig. 36 – Diagrama bilanțului hidric lunar la stația Vârful Omu în raportul 1/3 (după Voiculescu, 2001)

*) Evapotranspirația potențială este o noțiune cu caracter teoretic și se referă la cantitatea maximă de apă care se poate pierde prin evapotranspirație într-o anumită regiune climatică, în condițiile în care solul ar fi alimentat continuu cu apă. Evapotranspirația reală reprezintă cantitatea de apă pierdută prin evapotranspirație în anumite condiții meteorologice, de pe o anumită suprafață în care aportul de apă are o anumită valoare cantitativă.




Fig. 37 – Diagrama bilanțului hidric lunar la stația Vârful Omu în raportul 1/2 (după Voiculescu, 2001)

Diagramele climatice prezentate au o mare importanță în studiul climatelor, deoarece servesc la alcătuirea unor clasificări moderne a climatelor, bazate pe criteriul analizei complexe a elementelor, criteriu care stă la baza cercetărilor de climatologie aplicată. Ele au fost folosite pentru prima dată de *G. Taylor* (1930) în Australia, de *W. Köppen* (1931) în Germania și de *H. Grisolle* (1932) în Franța. Climogramele au fost perfecționate mai târziu de *H. Gaussen* (1954), de *Emm. de Martonne* (1955), de *H. Walter* și *H. Lieth* (1960), de *Ch. Péguy* (1961), de *H. Grisolle* (1962) etc. În România au fost prezentate, utilizate și perfecționate de către *V. Belozarov*, *I. Fărcaș* (1971); *Elena Dumitrescu*, *Maria Glăja* (1972); *Elena Erhan* (1979, 1999); *Octavia Bogdan* (1980, 1981, 1983); *Elena Teodoreanu* (1980); *I. Marin* (1986); *I. Fărcaș* (1988); *Octavia Bogdan*, *Elena Niculescu* (1999); *M. Voiculescu* (2001) etc.

3.12. Întocmirea hărților climatice

Hărțile climatice reprezintă sinteze ale datelor climatice și dau o imagine expresivă și reală a repartiției în spațiu a valorilor elementelor climatice. Ele sunt mai elocvente decât tabelele care le completează în mod util și prezintă avantajul că ușurează utilizarea valorilor de către specialiștii din diferite domenii de activitate (Dumitrescu, Glăja, 1972).

Întocmirea hărților climatice se bazează pe datele sigure existente, provenite de la stațiile meteorologice cu șiruri lungi și omogene de observații, situate în condiții reprezentative.

Precizia hărților climatice depinde de calitatea datelor, de densitatea rețelei de stații meteorologice, de cunoașterea influenței exercitate de factorii fizico-geografici generali și locali asupra elementelor climatice, de metoda folosită, de scara utilizată etc.

Alegerea metodei de cartografiere depinde de scopul urmărit, precum și de caracteristicile de variabilitate ale elementului sau ale fenomenului climatic de reprezentat, în funcție de care se utilizează următoarele metode: *metoda izoliniilor*, *metoda fondului calitativ*, *metoda arealelor*, *metoda punctelor și liniilor în mișcare*, *metoda semnelor*, *metoda cartogramei*, *metoda cartodiagramei* (Fărcaș, 1988).

3.12.1. Metoda izoliniilor

A fost introdusă în climatologie de Al. von Humboldt care, la începutul sec. al XIX-lea, a construit primele hărți cu izoterme și izobare.

Izoliniile sunt curbe care unesc punctele cu aceeași valoare a elementului considerat și se numesc *izoterme* (pentru temperatura aerului), *izobare* (pentru presiunea aerului), *izohiete* (pentru cantitatea de precipitații), *izonefe* (pentru nebulozitate), *izohelii* (pentru durata strălucirii Soarelui), *izogone* și *izotahe* (pentru direcția și viteza vântului), *izofote* (pentru intensitatea luminii), *izokeraune* (pentru frecvența orajelor), *izobronțe* (pentru frecvența tunetelor), *izocrone* (pentru durata fenomenelor) etc.

Aceste izolinii redau valorile reale măsurate în puncte cu altitudini concrete sau cu valori reduse la același nivel (nivelul mării sau un nivel superior), dar există și izolinii care reprezintă *abaterile în timp și spațiu ale unor valori particulare față de valorile medii, ale valorilor dintr-un interval anterior față de valorile medii, ale valorilor dintr-un interval anterior față de valorile curente* (spre exemplu: *izaloterme*, *izalobare*),

ori ale valorilor reale ale punctelor față de valorile standard de la un anumit nivel.

Diferențele dintre valorile reale (măsurate) și cele standard (calculate) se numesc *anomalii*. Acestea pot fi pozitive, dacă valoarea reală este mai mare decât cea calculată și negative, în situația inversă, iar liniile care unesc punctele cu aceeași anomalie se numesc *izanomale* (Fărcaș, 1988).

Trasarea izoliniilor se bazează pe caracterul gradat al variației elementelor climatice, fapt ce permite aplicarea metodei interpolării care presupune stabilirea unor valori intermediare între două sau mai multe puncte apropiate. Spre exemplu, pentru realizarea unei *hărți cu izoterme*, pe harta topografică, se înscriu în prima fază, valorile temperaturilor medii lunare sau anuale, după care, în funcție de curbele de nivel, ținând cont de influența altitudinii, a formelor de relief, a expoziției versanților, a tipului de vegetație, de apropierea sau depărtarea de marile bazine acvatice, de caracterul circulației atmosferice, se trasează izotermele la intervale de 1°C în așa fel, încât să permită determinarea directă sau indirectă a valorilor elementului climatic reprezentat, în orice punct de pe hartă (figura 38).

De remarcat că dintre factorii menționați, cea mai mare influență asupra valorilor temperaturii aerului o are *altitudinea*, motiv pentru care trasarea izotermelor este destul de dificilă, mai ales în regiunile montane cu relief accidentat, în care temperatura variază mult cu altitudinea, chiar pentru puncte apropiate ca distanță. În situațiile în care lipsesc stațiile meteorologice sau au o densitate prea redusă, se impune *calcularea gradientilor termici verticali*, adică stabilirea valorilor cu care variază temperatura pe verticală la fiecare 100 m diferență de nivel.

Trasarea izoliniilor se bazează pe datele numerice măsurate sau calculate, dar acestea nu vor fi trasate corect decât după o cunoaștere detaliată a caracteristicilor climatice și a tuturor factorilor care pot influența valorile temperaturii aerului (altitudine, forma de relief, tipul de sol sau de vegetație etc.).

Această metodă poate fi utilizată în cazul temperaturii aerului, pentru a reprezenta repartitia temperaturilor medii lunare și anuale, a mediilor maximelor și minimelor anuale și lunare, a sumelor de temperatură, a datelor medii de trecere a temperaturilor zilnice prin anumite valori, a abaterilor mediilor din fiecare an față de media multianuală a punctului respectiv. Similar pot fi cartografiate valorile medii și pentru celelalte elemente climatice (Dumitrescu, Glăja, 1972).




Fig. 38 - Harta repartiției temperaturii anuale a aerului în Culoarul Rucăr-Bran (după Teodoreanu, 1980)

3.12.2. Metoda fondului calitativ

Se folosește pentru evidențierea caracteristicilor calitative ale tipurilor de climate și presupune delimitarea și ierarhizarea tipurilor și subtipurilor climatice în funcție de acțiunea combinată a factorilor zonalii (circulația generală a atmosferei, distribuția latitudinală a radiației solare) și a celor azonali (prezența suprafețelor acvatice, orografia, înclinarea și expoziția versanților, vegetația) (Fărcaș, 1988). De factorii zonalii se ține cont la hărțile alcătuite pentru suprafețe mari (suprafața Globului, suprafața unui continent etc.), iar cei azonali se utilizează mai ales în vederea realizării hărților la scară mare (hărțile topoclimatice) (figura 39).




Fig. 39 – Harta topoclimatică a Câmpiei Crișurilor (după Măhăra, 1977): I. Topoclimate complexe: Topoclimatul Câmpiei glacisurilor; 2 Topoclimatul Câmpiei aluviale; II Topoclimate elementare: 3. Topoclimatul luncilor; 4. Topoclimatul zonelor lacustro-mlăștinoase; 5. Topoclimatul câmpurilor interfluviale (a – Topoclimatul câmpurilor cultivate; b – Topoclimatul de pășune și fânețe); 6. Topoclimatul de pădure; 7. Topoclimatul urban; 8. Limita dintre cele două topoclimate complexe; 9. Limita de est a câmpiei.

De asemenea, trebuie să se țină cont și de suprapunerea a două sau mai multe tipuri climatice peste o anumită suprafață. Spre exemplu, suprapunerea topoclimatului forestier peste versanții cu diferite grade de însorire, suprapunerea unităților climatice zonale peste cele cauzate de factorii locali etc.

Ca tehnică de lucru, metoda fondului calitativ folosește culorile sau hașurile, respectiv culorile calde (roz, portocaliu) și hașurile simple se utilizează pentru climatele calde, însorite, iar culorile reci (verde, albastru) și hașurile dense pentru climatele reci, umbrite. Trasarea liniilor se face pe baza indicatorilor calitativi și cantitativi, ultimii fiind redați în legendă sau pe hartă, prin simboluri (figura 39).

3.12.3. Metoda arealelor

În climatologie această metodă se utilizează la reprezentarea răspândirii pe suprafață a fenomenelor și proceselor cu arii discontinue (masele de aer, fenomenele orajoase, ceața, înghețul, bruma etc.), suprafețele respective fiind delimitate prin linii curbe sau prin contururi imprecise, dacă fenomenele în cauză au o răspândire difuză. Areele respective se hașurează sau se colorează pentru evidențierea calității fenomenelor (figura 40).




Fig. 40 – Răspândirea ceții în partea internă și externă a arcului carpatic (hașurat) (după Fărcaș, 1988).

Această metodă poate fi utilizată și pentru realizarea hărților de regionare climatică. În acest sens exemplificăm cu harta regionării climatice și topoclimatice a României (Geografia României, 1983), harta regionării riscurilor climatice din România, hărțile de vulnerabilitate a teritoriilor României față de diferite riscuri climatice (figura 41) (Bogdan, Niculescu, 1999).




Fig. 41 - Harta vulnerabilității teritoriilor României față de îngheț și brumă (după Bogdan, Niculescu, 1999): 1 - foarte mică; 2 - mică; 3 - intermediară; 4 - mare; 5 - combinată.

3.12.4. Metoda punctelor

Se folosește pentru reprezentarea elementelor și fenomenelor climatice discontinue în timp și spațiu, cum este cazul temperaturilor maxime și minime absolute, a cantităților maxime și minime de precipitații etc. (Fărcaș, 1988).

Redarea valorilor se face prin cifre înscrise în dreptul punctului de stație corespunzător (figura 42).



Fig. 42 – Harta temperaturilor maxime înregistrate în luna februarie 1995.
Valorile încercuite reprezintă temperaturi maxime absolute în °C
(după Stăncescu, Popa, 1997).

3.12.5. Metoda liniilor în mișcare

Se folosește pentru redarea dinamicii în timp și spațiu a fenomenelor climatice, cum este cazul traiectoriilor maselor de aer, vântului dominant la sol și în atmosferă etc. (Fărcaș, 1988).

Redarea acestor fenomene se face prin săgeți, direcția și întinderea mișcării sunt indicate de orientarea și lungimea vectorului, iar intensitatea fenomenului poate fi sugerată prin grosimea săgeții (figura 43).




Fig. 43. Direcția de deplasare a unui anticiclone vestic (după Bălescu, 1962)

3.12.6. Metoda cartogramei

Se utilizează în scopul prezentării repartiției cantității de radiație și a insolației la suprafața solului, a umezelii din sol, în funcție de orientarea și înclinarea versanților. Redarea se face prin areale de forme neregulate, prin hașuri sau culori gradate după intensitatea fenomenelor (Fărcaș, 1988).




Fig. 44 – Harta pantelor (a) și a expoziției versanților (b) în bazinul văii Negrileasa (după Fărcaș, 1988).

În acest scop, mai întâi se alcătuiesc hărțile înclinării și a expoziției versanților (figura 44), după care se transpun datele elementului analizat, înscriind prin cifre valorile corespunzătoare fiecărui areal cu înclinare și expoziție dată (figura 45).

3.12.7. Metoda cartodiagramei

Se utilizează pentru reprezentarea intensității unor elemente climatice care au răspândire continuă, dar a căror valori sunt puternic influențate de condițiile locale, sau pentru ilustrarea pe hartă a dinamicii în timp a unor elemente climatice. Astfel, această metodă se aplică în scopul reprezentării regimului anual al precipitațiilor atmosferice, al tensiunii vaporilor de apă prin histograme, a regimului anual al temperaturii aerului prin grafice, pentru reprezentarea direcției și vitezei vântului prin roze, precum și pentru evidențierea simultană a două sau mai multe elemente climatice, dintre care unul este reprezentat prin izolinii, iar celălalt prin diagrame (figura 46).

Redarea pe hartă a acestor elemente climatice se face prin diagrame construite la scară și plasate în apropierea punctelor de observație.

Metoda cartodiagramei este importantă pentru climatologie, deoarece permite redarea simultană, atât a repartiției geografice, cât și a regimului anual al unor elemente climatice (Dumitrescu, Glăja, 1972.)





Fig. 45 – Harta cantității de radiație în bazinul văii Negrițasa (după Fărcaș, 1988)




Fig. 46 – Mersul anual al umezelii relative medii în bazinul hidrografic al Crișurilor (după Măhăra și colab, 2002)

4. PRELUCRAREA DATELOR METEOROLOGICE ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI STUDIU BIOCLIMATIC

4.1. Indicii de temperatură

În bioclimatologie și în climatologia turistică se utilizează frecvent *indicele de confort termic*, stabilit pe baza relației dintre temperatura aerului, umezeală și vânt.

Organismul uman își menține temperatura corpului constantă în procesele metabolismului, chiar în limitele largi ale condițiilor exterioare, prin pierdere sau acumulare de căldură în relația cu mediul. Există însă o zonă îngustă în care un organism sănătos, îmbrăcat ușor, în repaus, nu pierde și nu primește căldură, numită *zonă de neutralitate sau confort termic*, cuprinsă între $16,8^{\circ}$ și $20,6^{\circ}$ TEE (temperatura echivalent efectivă).

Temperatura echivalent efectivă este o valoare rezultată din calcul care redă temperatura efectiv resimțită de organismul uman, în anumite condiții de încălzire a aerului, de încărcare cu vapori de apă și curenți de aer. Astfel, se poate obține o echivalență a acestei temperaturi efective la diferite valori ale parametrilor climatici menționați. De exemplu, o temperatură efectiv resimțită de 20° TEE se realizează la o temperatură a aerului de 24°C , la o umezeală de 37 % și 0 m/s, dar și la 24°C , 56% și 1m/s; la 24°C , 100% și 2,5m/s; la 22°C , 58%, 0 m/s etc. Pentru determinarea temperaturii efective se utilizează formula:

$$\text{TEE} = 0,4 (t_d + t_w) + 4,8, \text{ unde}$$

TEE = temperatura echivalent – efectivă;

t_d = temperatura termometrului uscat;

t_w = temperatura termometrului umezit la o viteză a vântului $< 0,1$ m/s.

La valori mai mici de $16,8^{\circ}$ TEE se constată inconfort prin răcire, iar la peste $20,6^{\circ}$ TEE, inconfort prin încălzire.

În raportul temperatură-umezeală, în general la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, dacă umezeala relativă este mare, confortul este mai scăzut.

În raportul temperatură-vânt se observă că la temperaturi scăzute vântul scade confortul termic, deoarece amplifică senzația de frig. La temperaturi ridicate, vântul coboară temperatura efectivă și favorizează confortul termic, pentru că elimină senzația de supraîncălzire. Dacă viteza vântului depășește însă $3,5$ m/s, organismul

uman resimte inconfort, chiar dacă temperatura este cuprinsă între limitele de confort (Teodoreanu și colab., 1984; Teodoreanu, 2002).

Tabelul 39 - Relațiile stabilite între temperatură, umezeală și vânt pentru ca organismul să aibă o senzație de 20° TEE

Temperatura (°C)		Umezeala (%)	Viteza vântului (m/s)
t.uscat	t.umed		
22,0	16,5	58	0
23,0	14,7	40	0
23,0	17,5	60	0,5
24,0	13,2	37	0
24,0	18,0	56	1,0
24,0	24,0	100	2,5
25,0	16,0	38	1,0
25,0	18,1	51	1,5
25,0	20,0	63	2,0
25,0	23,2	84	3,0

Sursa: Teodoreanu și colab., 1984.

Așadar, confortul termic nu depinde doar de temperatură, ci și de umezeala aerului și de viteza vântului. În acest sens, în tabelul 39 sunt redată câteva din relațiile posibile între temperatură, umezeală și vânt, pentru ca organismul să aibă o senzație de confort termic (temperatură efectiv resimțită de 20° TEE).

Teodoreanu și colab. (1984), au analizat pentru teritoriul României raportul temperatură, umezeală, vânt în luna iulie (ora 13) în perioada 1966-1975 și au calculat *numărul de zile cu confort termic*, precum și *numărul de zile cu inconfort prin răcire, încălzire sau vânt*. Pe baza valorilor obținute, autorii au întocmit hărți care prezintă repartitia acestor parametri la nivelul țării noastre, așa cum se poate observa în exemplul din figura 47.

Din hărțile respective rezultă că la Stâna de Vale parametrii menționați au următoarele valori: 10 zile/lună cu confort termic, 20 zile cu inconfort termic prin răcire, 0 zile cu inconfort termic prin încălzire, peste 15 zile/lună cu confort prin adăpost de vânt, 0 zile cu inconfort prin încălzire în condiții de adăpost față de vânt și 20 zile/lună cu inconfort prin răcire în condiții de adăpost față de vânt.



Fig. 47 – Numărul de zile cu confort termic în România
(după Teodoreanu și colab., 1984).

4.2. Indicii de umezeală

După cum se știe, căile respiratorii, despărțite doar de o membrană foarte subțire și permeabilă de alveolele pulmonare, au rolul de a pune în contact sângele cu aerul. Oxigenarea sângelui se face conform legilor osmozei, respectiv dinspre mediul în care concentrația gazului în chestiune este mai puternică spre cel în care aceasta este mai mică, proporțional cu diferența presiunilor parțiale și până când între cele două se realizează un echilibru.

Dintre gazele care pătrund din aer în sânge și reciproc, în studiile de specialitate interesează oxigenul, a cărui concentrație scade o dată cu altitudinea și vaporii de apă care suferă mari variații spațio-temporale.

Specialiștii au demonstrat că fluxul osmotic își schimbă sensul în prezența unei tensiuni a vaporilor de apă de 31,3 hPa. Astfel, dacă tensiunea vaporilor de apă inspirați (U) depășește 31,3 hPa, fluxul osmotic este orientat dinspre aer spre sânge și tinde să-l dilueze. Dacă tensiunea vaporilor de apă inspirați este mai mică de 31,3 hPa, fluxul osmotic este îndreptat dinspre sânge spre aer, antrenează evaporarea, iar sângele se deshidratează. Besancenot (1990) arată că lucrurile sunt mai simple decât par, deoarece funcționarea normală a plămânilor cere o anumită evaporare, numită *transpirație pulmonară*, evaluată între 19,7 și 23,8 hPa. Astfel, se apreciază că presiunea optimă este sub 31,3 hPa, admitând că valorile de 7,5 și 11,6 hPa delimitează tipul higrometric echilibrat care nu solicită din partea organismului nici un efort regulator. Sub 7,5 hPa, riscul de deshidratare a plamei este mai mare și devine îngrijorător la 4,0 hPa. Din contră, la valori mai mari de 11,6 hPa, organismul luptă împotriva diluării sângelui prin excesul vaporilor de apă, fapt ce duce la oboseală evidentă, atmosfera devenind asupritoare la valori mai mari de 25 hPa și dăunătoare sănătății dincolo de 31,3 hPa.

Sintetizând, autorul menționat arată că există patru intervale considerate perfect confortabile:

$$\begin{aligned} 18 &\leq T_x \leq 31^{\circ}\text{C} \\ 350 &\leq K \leq 700 \text{ W/m}^2 \\ 15 &\leq TH1 \leq 20^{\circ}\text{C} \\ 7,5 &\leq U \leq 11,6 \text{ hPa, unde:} \end{aligned}$$

T_x = temperatura maximă în $^{\circ}\text{C}$;

K = puterea de răcire a vântului exprimată conform formulei lui Siple și Passel (1945) :

$$K = (12,12 + 11,6 \sqrt{v} - 1,16v)(33 - T_x),$$

v = viteza vântului în m/s determinată la ora maximei termice;

THI = indicele termo-higrometric exprimat în $^{\circ}\text{C}$, conform formulei lui Thom (1959):

$$\text{THI} = T_x - [(0,55 - 0,0055U)(T_x - 14,5)];$$

U = tensiunea vaporilor de apă inspirați.

Limitele de favorabilitate a activităților turistice sunt însă mai largi:

$$16 \text{ sau } 18 \leq T_x \leq 33^{\circ}\text{C}$$

$$58 \leq K \leq 750 \text{ W/m}^2$$

$$15 \leq \text{THI} \leq 26,5^{\circ}\text{C sau } 28,5^{\circ}\text{C}$$

$$4,0 \leq U \leq 25, 26,5 \text{ sau } 31,3 \text{ hPa.}$$

Așadar, limitele de adaptabilitate ale unui turist sănătos sunt mult mai largi atât la nivelul cutanat, cât și la cel pulmonar. Depășirea acestor limite determină pierderea echilibrului organismului, astfel încât între țesuturile vii și energiile mediului înconjurător au loc perturbații mai mult sau mai puțin grave care se traduc prin stări patologice:

- *infarctul miocardic* (datorat variațiilor mari ale puterii de răcire, K sau de dezlănțuirea vânturilor puternice cu caracter catabatic).

- *accidentele vasculare cerebrale* (asociate, vara, unor zile călduroase și umede când indicele THI are o valoare mai ridicată sau unor zile vântoase în care tensiunea vaporilor de apă este foarte ridicată).

- *deshidratarea puternică* (afectează mai ales copiii mici; un exemplu frecvent citat în literatura de specialitate este cel al stațiunii marocane El Ksiba, situată la 1100 m altitudine, unde 16% din sugarii aduși în perioada iulie-august au avut probleme de deshidratare, fapt ce a necesitat transferarea lor la Casablanca, unde umezeala atlantică mult mai puternică le-a restabilit sănătatea).

- *căldura excesivă* datorită căreia indicele THI depășește valoarea de 29°C , fapt ce reprezintă o amenințare serioasă la adresa sănătății umane.

În concluzie, turiștii și persoanele cu probleme de sănătate trebuie să se protejeze atât de frig, cât și de căldură, de uscăciunea extremă și de umiditatea excesivă.

4.3. Indicii de temperatură - umezeală

În literatura de specialitate există numeroase referiri la diferiți indici care utilizează valorile de temperatură și umezeală. Dintre acestea îl prezentăm doar pe cel recomandat de către I.N.M.H. și calculat de către birourile meteorologice din cadrul centrelor meteorologice regionale. Acesta se referă la gradul de confort resimțit de organismul uman în încăperile închise și se exprimă prin relația:

$$I.T.U. = (T \cdot 1,8 + 32) - (0,55 - 0,0055U)[(T \cdot 1,8 + 32) - 58],$$

unde: I.T.U. = indicele de temperatură - umezeală;

T = temperatura aerului;

U = umezeala relativă a aerului.

Formula poate fi folosită de publicul larg, pe baza informațiilor din buletinele meteorologice locale și indică o anumită valoare în funcție de care se apreciază gradul de confort, astfel:

$I.T.U. \leq 65$ - stare de confort;

$66 \leq I.T.U. \leq 79$ - stare de alertă;

$I.T.U. \geq 80$ - stare de inconfort.

Spre exemplu, la Nușfalău, în data de 16 iulie 2002, s-a înregistrat o temperatură de $32,5^{\circ}\text{C}$ și o umezeală relativă de 52%, deci valoarea indicelui de temperatură - umezeală a fost de 81,9 unități. Această valoare ridicată indică o stare de inconfort cu caracter de risc mai ales pentru persoanele meteosensibile și poate fi atenuată prin ventilarea aerului sau dotând spațiile respective cu instalații de climatizare.

4.4. Indicii de presiune

Variațiile diurne și anuale ale presiunii atmosferice sunt diferite în funcție de altitudine și latitudine.

Variația diurnă a presiunii atmosferice este maximă în lunile de iarnă, când valorile depășesc 4,0 mb, în timp ce vara, această variație este de aproximativ 2,0 mb. Din acest punct de vedere, organismul uman este supus unor stimuli mai mari în perioada rece a anului, față de cea caldă, situație argumentată și de faptul că, în general, la latitudini temperate maximele și minimele barometrice se produc în perioada rece a anului.

Variația anuală a presiunii este maximă în regiunile deschise circulației atmosferice, mai ales la altitudini mari și este minimă în regiunile adăpostite. O dată cu creșterea altitudinii, presiunea aerului și implicit a oxigenului scade, ceea ce provoacă tulburări în funcționarea organismului ("rău de munte", dureri de cap, greață, astenie musculară etc.), datorate nu atât scăderii presiunii atmosferice, cât scăderii presiunii parțiale a oxigenului. Rarefierea aerului duce la scăderea cantității de oxigen din aerul de respirat, antrenând, ca răspuns al organismului, creșterea numărului de hematii din sânge, motiv pentru care climatul montan este indicat în tratarea anemiilor.

Scăderea presiunii cu mai mult de 15% din valoarea ei la nivelul mării, constituie limita de suportabilitate a organismului, ceea ce înseamnă o valoare de 114 mm, respectiv 152 mb, care se atinge în condiții normale (concentrația oxigenului 21%) la circa 2700 m. Așadar, din acest punct de vedere, în condițiile de relief ale României nu există restricții, dar la altitudini mai mari, concentrația redusă a oxigenului creează probleme respiratorii, cardiovasculare, sanguine etc. Desigur, pe glob se cunosc așezări permanente la peste 4000 - 5000 m, cum este cazul satului Cero de Pasco din Bolivia, situat la 5120 m, unde presiunea este foarte scăzută, dar organisme locale au suferit o serie de modificări de adaptare la condițiile dificile climatului de mare altitudine (creșterea numărului de globule roșii până la 7-8 milioane/mm³) (Stăncescu, Ballif, 1976; Teodoreanu și colab., 1984).

4.5. Indicii de stres bioclimatic

4.5.1. Indicele de stres bioclimatic cutanat

Se referă la senzațiile de căldură și de frig pe care le resimte organismul în procesul termoreglării și depind de temperatura aerului și de viteza curenților de aer, conform formulei lui Siple și Passel (1945):

$$K = (12,12 + 11,6\sqrt{v} - 1,16v)(33 - T_x), \text{ unde:}$$

K = puterea de răcire, exprimată în kcal/m²/h;

v = viteza vântului în m/s, determinată la ora maximei termice;

T_x = temperatura aerului în adăpostul meteorologic, mai mică sau egală cu 33°C.

Dacă puterea de răcire are valori cuprinse între 0 și 299 (tabelul 40), produce un stres bioclimatic prin încălzire și corespunde indicilor de inconfort de -2 și -1, care au caracter *hipotonic*. Stresul bioclimatic prin încălzire se realizează vara, când temperaturile ridicate favorizează declanșarea termolizei, deci a mecanismelor prin care organismul uman reduce posibilitățile de supraîncălzire (de exemplu, transpirația).

Dacă puterea de răcire are valori de peste 599, apare un stres prin răcire și corespunde indicilor de +1, +2, +3, +4 care au caracter *hipertonice* (tabelul 40) și se realizează iarna, când se solicită termogeneza (de exemplu, frisonul).

Când valorile puterii de răcire sunt cuprinse între 300 și 599, indicele corespunzător are valoarea 0 și evidențiază caracterul *relaxant* al perioadei respective (tabelul 40), adică o stare de confort, o nesolicitare funcțională a organismului.

Tabelul 40 - Indicii de stres bioclimatic cutanat

K	Indice	Tip de stres
0-149	(-2) hipotonic	stres prin declanșarea termolizei vara
150-299	(-1) hipotonic	stres prin declanșarea termolizei vara
300-599	(0) relaxant	nu solicită termoreglarea
600-899	(+1) hipertonice	stres prin declanșarea termogenezei iarna
900-1199	(+2) hipertonice	stres prin declanșarea termogenezei iarna
1200-1499	(+3) hipertonice	stres prin declanșarea termogenezei iarna
> 1500	(+4) hipertonice	stres prin declanșarea termogenezei iarna

Sursa: Besancenot, 1974, citat de Teodoreanu, 2002.

Valorile stresului bioclimatic cutanat, calculate pentru Stâna de Vale de către Măhăra (1994, 1996), indică la ora 1, șase luni hipertonic

și șase luni hipotonice, în timp ce la ora 13, cinci luni au caracter hipertonic, șase sunt relaxante și una (august) este hipotonică (figura 48).




Fig. 48. Stresul bioclimatic cutanat la Stâna de Vale (după Măhăra, 1994)

Intensitatea stresului bioclimatic cutanat este evidențiată de *stresul cutanat anual* (S.C.A.), care reprezintă suma pătratelor lunare ale indicelui stresului cutanat nocturn (N) și ale celui diurn (D), conform formulei:

$$S.C.A. = \sum_{i=1}^{12} (N^2 + D^2).$$

La Stâna de Vale acest indice are o valoare mică, 12, față de 140 cât este maxima în România, fapt ce scoate în evidență caracterul puțin stresant al acestei stațiuni balneoclimaterice.

4.5.2. Indicele de stres bioclimatic pulmonar

Se bazează pe schimburile respiratorii, respectiv pe absorbția de oxigen și eliminarea de dioxid de carbon.

În acest sens la valorile mari ale tensiunii vaporilor, teoretic, se poate determina un stres pulmonar prin acțiunea vaporilor de apă asupra mucoaselor căilor respiratorii.

După scara elaborată de J.P.Nicolas, la valori ale tensiunii vaporilor cuprinse între 7,5 și 11,6 mb se distinge un indice echilibrat, relaxant, nestresant. Când aerul este sărac în vapori de apă (7,5 mb), se consideră un indice de inconfort deshidratant (mai ales iarna), iar stresul se realizează prin tendința de deshidratare a mucoaselor. La valori mai mari de 11,7 mb, indicele de inconfort este hidratant (mai ales vara), respectiv stresul este determinat de tendința de hidratare a mucoaselor (tabelul 41).

Tabelul 41 - Indicii de stres bioclimatic pulmonar

Tensiunea vaporilor de apă	Indice	Tip de stres
0 – 4,0	(+2)	deshidratant, iarna
4,1 – 7,4	(+1)	deshidratant, iarna
7,5 – 11,6	(0)	echilibrat
11,7 – 15,9	(-1)	hidratant, vara
16,0 – 21,1	(-2)	hidratant, vara
21,2 – 26,5	(-3)	hidratant, vara
26,6 – 31,2	(-4)	hidratant, vara

Sursa: Besancenot, 1974, citat de Teodoreanu, 2002.

De reținut că stresul prin deshidratare este mai stimulent și mai ușor de suportat de organism decât stresul prin hidratare, care este emolient.

Analizând datele tensiunii vaporilor de la Stâna de Vale, Măhăra (1994, 1996) a determinat un număr de șase luni deshidratante la ora 1 și cinci la ora 13, cinci luni echilibrate la ora 1 și patru la ora 13 și doar una, respectiv trei luni hidratante (figura 49).




Fig. 49 - Stresul bioclimatic pulmonar la Stâna de Vale (după Măhăra, 1994)

Stresul pulmonar anual (S.P.A.) indică intensitatea stresului bioclimatic pulmonar și se calculează însumând pătratele stresului mediu lunar nocturn (N) și ale celui diurn (D) cu ajutorul formulei:

$$S.P.A. = \sum_{1}^{12} (N^2 + D^2).$$

La Stâna de Vale acest indice are valoarea de 24, față de 34, cât se înregistrează pe cele mai înalte culmi ale Apusenilor (Măhăra, 1994, 1996).

4.5.3. Indicele de stres bioclimatic total

Se calculează prin însumarea stresului cutanat cu cel pulmonar:

$$S.T.A. = S.C.A. + S.P.A.$$

și evidențiază solicitarea globală a climatului asupra organismului uman, atacat simultan la nivelul pielii și al plămânilor.

La Stâna de Vale, deși altitudinea este mare (1102 m), stresul bioclimatic total este scăzut (36), față de Oradea (43) sau Vlădeasa Vârf (113), datorită predominării calmului atmosferic și a numărului mare de zile cu stres cutanat relaxant din sezonul cald (Măhăra, 1994, 1996).

5. PRELUCRAREA DATELOR METEOROLOGICE ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI STUDIU CLIMATO-TURISTIC

5.1. Indicii climato-turistici

În domeniul climatologiei turistice s-au elaborat destul de mulți indici, dintre care menționăm pentru început pe cel al lui J.P. Marchand (1986), care estimează potențialul climato-turistic al Irlandei pe baza diferenței dintre precipitațiile atmosferice (p) și evapotranspirația potențială (ETP). Astfel, dacă există o probabilitate de 0,50% ca diferența dintre p și ETP să fie negativă, înseamnă că va fi un sezon frumos, așa cum reiese din figura 50, unde se evidențiază că la Rosslare, în sud, acesta durează de la 21 aprilie până la 5 septembrie, iar la Claremorris, în nord, este mult mai scurt, 1 iunie – 1 iulie.

Formula prezentată are însă două limite:

- solicită un volum mare de date pentru calcularea evapotranspirației de care beneficiază un număr restrâns de stații.
- nu ia în considerare și alte elemente climatice precum vântul și temperatura, care influențează mult gradul de favorabilitate turistică, deci are aplicabilitate restrânsă.




Fig. 50 . Probabilitatea producerii unei diferențe negative între cantitatea de precipitații și evapotranspirația potențială la două stațiuni irlandeze (după Marchand, 1986).

Un alt indice destul de frecvent utilizat este *indicele climato-turistic*, stabilit de R. Clausse și A. Guérout, sub forma următoarei relații:

$$I = (S + T - 5D) : 5, \text{ unde}$$

S = durata de strălucire a Soarelui (ore);

T = temperatura medie lunară ($^{\circ}\text{C}$);

D = durata precipitațiilor din timpul zilei între orele 7 și 19 (ore).

Acest indice permite evidențierea duratei optime a sezonului turistic și a curelor în aer liber, în perioada caldă a anului. În România a fost aplicat de către Fărcaș, Bențe, Trifa (1968, 1970), pentru luna iulie, datele obținute fiind apoi comparate cu cele din Franța; de către Teodoreanu și colab. (1984), pentru luna ianuarie, valorile obținute fiind însă mai puțin semnificative; de către Dragotă, Rătoiu, Săraru (1999) pentru sezonul cald al anului, pe traseul Băișoara - Vlădeasa - Stâna de Vale - Oradea.

Alături de acești indici mai sunt și alții: *indicii elementari*, *indicele climato-maritim*, *indicele planetar*, *indicii combinați*, *indicele biomedical*, mai mult sau mai puțin simpli, care combină diferite elemente climatice și au multe puncte comune, diferențiindu-se doar prin numărul și tipul parametrilor luați în considerare.

5.1.1. Indicii elementari

Unul dintre cei mai simpli indici elementari este *indicele climatic balnear* (ICB) al lui L. Burnet (1963), care încearcă să evalueze calitatea turistică în sezonul estival prin formula:

$$\text{ICB} = \frac{N}{T}, \text{ unde}$$

N = numărul de zile ploioase din cele patru luni caracteristice ale sezonului estival;

T = temperatura medie a aerului în perioada respectivă.

Dacă valoarea indicelui este mai mică de 3, regiunea respectivă are un potențial turistic ridicat, dacă este între 3 și 8, potențialul este satisfăcător, iar dacă depășește valoarea 8, se consideră că potențialul turistic al acelei regiuni este redus.

Și această formulă prezintă dezavantaje:

- valoarea indicată este un număr arbitrar fără o semnificație absolută, respectiv nu se poate concluziona că într-o regiune activitățile turistice sunt, spre exemplu, de cinci ori mai favorabile decât în alta, ci doar că există condiții mai favorabile.

- nu ia în considerare alte elemente climatice (insolația, vântul etc.), astfel încât aplicată altor regiuni decât celor din zona mediteraneeană, există posibilitatea să dea rezultate eronate.

Un pas înainte l-au reprezentat noile formule elaborate de R. Clausse și A. Guérout (1955), R. M. Poulter (1962), G. H. Hughes (1967), N. E. Davis (1968), A. A. Flocas (1975) care utilizează valorile duratei de strălucire a Soarelui, ale temperaturii aerului și ale precipitațiilor atmosferice.

Astfel, R. M. Poulter (1962), a determinat calitatea sezonului estival cu ajutorul relației:

$$IS = 18T + 0,167I - 0,2P + 320, \text{ unde:}$$

IS = indicele sezonier;

T = temperatura medie din sezonul estival;

I = durata de strălucire a Soarelui însumată în perioada respectivă;

P = suma cantităților de precipitații în sezonul estival;

320 = constantă.

G. H. Hughes (1967), N. E. Davis (1968), A. A. Flocas (1975) au elaborat alte variante:

$$I_h = T_x + 0,045I - 0,2Pr,$$

$$I_d = 18T_x + 0,217I - 0,276P + 320, \text{ respectiv}$$

$$I_s = 18T + 0,106I - 0,303P + 320, \text{ în care:}$$

T_x = media temperaturilor maxime înregistrate în sezonul estival;

I = durata însumată a strălucirii Soarelui în perioada respectivă;

P = cantitatea totală de precipitații înregistrată în sezonul estival;

Pr = numărul de zile cu ploaie.




Fig. 51 - Potențialul climato-turistic al Marii Britanii (după Davis, 1968).

Indiferent de detaliile utilizate în formulele prezentate, acestea oferă o idee mai clară a variației în timp și spațiu a potențialului climato-turistic. Astfel, aplicând formula lui N. E. Davis la suprafața Marii Britanii s-au constatat următoarele (figura 51):

- cel mai mare potențial climato-turistic al acestei țări se află pe litoral.
- potențialul climato-turistic optim se află pe litoralul sud-estic.
- cel mai redus potențial climato-turistic se află în nord-estul Scoției și în insulele mărginașe.
- potențialul climato-turistic scade o dată cu creșterea altitudinii.

În Grecia, la Atena, A. A. Flocas (1975) a constatat că vara condițiile climato-turistice variază de la un an la altul, indicele variind între 314 și 403 (figura 52).




Fig. 52 - Variabilitatea potențialului climato-turistic în anotimpul de vară la Atena (după Flocas, 1975).

Autorul a constatat că cea mai nefavorabilă vară a fost în 1901, când s-au înregistrat 134,6 mm de precipitații și temperatura a fost cu $1,8^{\circ}\text{C}$ mai mică decât cea normală. Vara cea mai favorabilă a fost în 1954, când în cele trei luni caracteristice a plouat doar 5 mm, temperatura a fost cu 10°C mai mare decât normala, iar durata de strălucire a Soarelui a depășit 1200 ore.

5.1.2. Indicele climato-marin

A fost propus de I. Sarraimea (1980):

$\text{ICM} = (T + T_e + I) - (N + N_v + N_k + N_g + N_n)$, unde:

T = temperatura medie a aerului;

T_e = temperatura medie a apei marine;

I = durata medie a strălucirii Soarelui obținută prin împărțirea numărului total de ore cu soare la numărul de zile;

N = numărul de zile cu ploaie;

N_v = numărul de zile cu vânt puternic ($v > 16 \text{ m/s}$);

N_k = numărul zilelor cu ceață;

N_g = numărul zilelor cu ger;

N_n = numărul zilelor cu zăpadă.

Aplicat pentru litoralul francez (figura 53), acest indice a evidențiat un potențial climato-turistic mai mare pe fațada mediteraneană (40-54 puncte în sezonul estival) decât pe cea atlantică (20-30,5 puncte și chiar 9 puncte la Brest).




Fig. 53 - Caracteristicile indicelui climato-marin în șase stațiuni de pe litoralul francez (după Saramea, 1980)

Un rezultat negativ împiedică orice activitate turistică, în timp ce unul pozitiv în timpul iernii, favorizează activitățile turistice. Sezonul favorabil activităților balneare este indicat de o valoare mai mare de 20 a indicelui care se întâlnește timp de trei luni în Marea Măneei, 4-5 luni pe litoralul atlantic și 7-8 luni pe Coasta de Azur.

Acest indice nu poate fi utilizat decât la nivelul Franței și împrejurimilor ei, motiv pentru care alți cercetători, precum polonezul

Mierczkowski, și-au propus elaborarea unui indice care să permită o analiză mai extinsă, chiar la scară planetară.

5.1.3. Indicele planetar

În anii 1983 și 1985, geograful polonez Z. Mierczkowski a propus un indice climato-turistic (ICT), sub forma unei sume ponderate a celor cinci indici elementari:

$$ICT = 8C_{id} + C_{ia} + 4R + 4S + 2W, \text{ unde:}$$

C_{id} = indicele de confort obținut cu ajutorul unui grafic realizat pe baza valorilor maxime de temperatură și a celor minime ale umezelii relative (figura 54); spre exemplu la o temperatură de 28°C și o umiditate relativă de 30%, indicele de confort are valoarea 5;

C_{ia} = indicele de confort mediu obținut prin asocierea valorilor temperaturilor medii cu cele ale umidității relative medii;

R = indice pluviometric dedus din tabelul 41;

S = indice de insolație dedus din tabelul 42;

W = indicele anemometric dedus din tabelul 43, unde mișcarea aerului poate fi de trei tipuri, în funcție de contextul termic:

Tabelul 41 – Indicele pluviometric, R , în formula lui Z. Mierczkowski

R	Cantitatea medie lunară de precipitații (mm)
5,0	≤ 14,9
4,5	15,0 – 29,9
4,0	30,0 – 44,9
3,5	50,0 – 59,9
3,0	60,0 – 74,9
2,5	75,0 – 89,9
2,0	90,0 – 104,9
1,5	105,0 – 119,9
1,0	120,0 – 134,9
0,5	135,0 – 149,9
0	150,0 – 209,9
-1	210,0 – 269,9
-2	270,0 – 329,9

Sursa : Mierczkowski, citat de Besancenot, 1990.

- *tipul normal*, când temperatura maximă este sub 24°C (optimumul turistic este atunci când nu se înregistrează vânt).

- *tipul alizeu*, când temperatura maximă este cuprinsă între 24 și 33°C (vântul poate să bată puțin).

- *tipul torid*, când temperatura maximă depășește 33°C (situație în care vântul este considerat defavorabil).




Fig. 54 - Diagrama temperatură-umiditate care permite evaluarea indicelui de confort Cld (după Mierczkowski, citat de Besancenot, 1990).

Tabelul 42 - Indicele de insolație, S , în formula lui Mierczkowski

S	Durata de strălucire a Soarelui în decurs de o zi (ore)
5,0	7,10
4,5	9-10
4,0	8-9
3,5	7-8
3,0	6-7
2,5	5-6
2,0	4-5
1,5	3-4
1,0	2-3
0,5	1-2
0	≤ 1

Sursa : Mierczkowski, citat de Besancenot, 1990.

Tabelul 43 - Indicele anemometric, W, în formula lui Z. Mierczkowski

Viteza vântului (m/s)	Tipul normal	Tipul alizeu	Tipul torid
<0,8	5,0	2,0	2,0
0,8-1,5	4,5	2,5	1,5
1,6-2,5	4,0	3,0	1,0
2,6-3,3	3,5	4,0	0,5
3,4-5,4	3,0	5,0	0
5,5-6,7	2,5	4,0	0
6,8-7,9	2,0	3,0	0
8,0-10,7	1,0	2,0	0
> 10,7	0	0	0

Sursa: Mierczkowski, citat de Besancenot, 1990.

Conform formulei lui Mierczkowski fiecare indice elementar, când indică cele mai bune condiții pentru activitatea turistică, are valoarea 5, deci ICT are o valoare teoretică maximă de 100:

$$(8 \times 5) + (2 \times 5) + (4 \times 5) + (4 \times 5) + (2 \times 5) = 100,$$

motiv pentru care lunile în care valoarea lui ICT atinge sau depășește 80, sunt considerate excelente pentru activitatea turistică. Cele în care valorile lui ICT sunt cuprinse între 60 și 79, sunt considerate bune sau foarte bune; lunile cu valori cuprinse între 40 și 59, sunt considerate acceptabile; cele cu valori mai mici de 40 ale lui ICT sunt defavorabile activităților turistice, iar dacă valoarea lui ICT este sub 10, activitățile turistice sunt imposibile.

În studiul său, autorul menționat a prelucrat datele de la 453 de stațiuni repartizate în diferite puncte pe suprafața globului și în final a alcătuit hărți cu gradul de favorabilitate al activităților turistice în diferite regiuni ale Terrei (figura 55).

Și această formulă are anumite limite evidențiate de faptul că în luna ianuarie, la latitudinea orașului Peking, există condiții acceptabile desfășurării activităților turistice, iar în sud-vestul Franței sunt defavorabile, motiv pentru care trebuie folosită cu multă atenție mai ales atunci când se au în vedere suprafețe foarte mari.




Fig. 55 - Gradul de favorabilitate al activităților turistice în luna ianuarie pe suprafața globului (după Mierczkowski, citat de Besancenot, 1990).

5.1.4. Indicele biomedical

Indicele biometeorologic agresiv (IBA) sau indicele biomedical elaborat de medici J. Rivolier, R. Campons, P. Lémée, R. Wolfromm (1967) este mai degrabă utilizabil în medicină, decât în climatologia turistică, deoarece alegerea parametrilor și a coeficienților care îl compun este inspirată direct din compoziții climatice ai afecțiunilor bronhopulmonare:

$IBA = \psi_1 + \theta + V + \psi_2 + \psi_3 - 2I$, unde:

ψ_1 = umiditatea relativă mai mare de 50% + cantitatea de precipitații (mm) + durata precipitațiilor (ore), totul împărțit la 5;

θ = numărul de grade Celsius sub 12 sau sub 25°C;

V = viteza medie a vântului (m/s);

ψ_2 = constantă cu valoarea 5 pentru fiecare variație bruscă a presiunii atmosferice care depășește 2hPa/oră;

ψ_3 = constantă cu valoarea 5 pentru orice fenomen meteoerologic deosebit, precum ceața, furtuna, vijelia;

I = durata de strălucire a Soarelui (S).

Un rezultat negativ indicat de această formulă trebuie interpretat ca semnul unei zile favorabile, puțin nocivă pentru sănătate, iar un rezultat pozitiv, indică o reală agresivitate biometeorologică.

În urma acestei succinte prezentări a indicilor utilizați în climatologia turistică, putem concluziona că folosirea lor în vederea caracterizării potențialului turistic al climei prezintă aspecte pozitive, deoarece permite simplificarea calculelor, pune accent pe interdependența diferitelor elemente ale climei și dă rezultate ușor de înțeles și de interpretat. Pe de altă parte însă, aceste sinteze numerice utilizează unități de măsură care nu corespund Sistemului Internațional (deci din punct de vedere matematic nu pot intra în combinație), duc la pierderea de informații, iar rezultatul furnizat este de multe ori abstract. Menționăm în acest sens exemplul dat de Besancenot (1990), care, presupunând o vară în care cade fără întrerupere o ploaie măruntă (100 mm/lună), Soarele este permanent acoperit de nori, iar temperatura se menține în permanență la 23,5°C, a ajuns la concluzia că vara respectivă este defavorabilă activităților turistice, dacă se utilizează formula lui R.M. Poulter (1962), indice de 683 și favorabilă turismului, dacă se utilizează formula lui Mierczkowski (1985), conform căreia valoarea indicelui depășește 50. În acest context, în ultimele decenii, tot mai mulți cercetători și-au concentrat eforturile pentru a elabora noi metode de analiză a potențialului turistic al climei, ajungându-se astfel la metoda tipurilor de vreme care presupune eforturi mai mari, dar dă rezultate mai bune.

5.2. Tipurile de timp

5.2.1. Metoda Feodorov-Ciubukov

Elaborată de E.E. Feodorov în 1925 și perfecționată de L.A. Ciubukov în anul 1949, Baibakova și colab. în 1964 etc. metoda presupune împărțirea timpului în *trei grupe principale*, în funcție de temperatura aerului:

- *grupa timpului cald* specifică zilelor cu temperaturi pozitive (temperatura minimă $\geq 0^{\circ}\text{C}$); cuprinde clasele I-VII și XVI.
- *grupa timpului de tranziție* caracterizează zilele cu temperaturi maxime pozitive și temperaturi minime negative; cuprinde clasele VIII și IX.
- *grupa timpului rece* specifică zilelor cu temperaturi negative (temperatura maximă $\leq 0^{\circ}\text{C}$); cuprinde clasele X-XV (tabelul 44).

Tabelul 44 - Clasificarea tipurilor de vreme după metoda Feodorov-Ciubukov

Nr.clasei	Tipul de vreme
Timp cald	
I	Timp însorit, foarte călduros și foarte uscat
IIa	Timp însorit, călduros și uscat
IIb	Timp însorit, călduros și uscat cu vânt ziua (2m/s)
III	Timp însorit cu umezeală moderată și ridicată
Va	Timp însorit cu umezeală moderată și ridicată dar noros noaptea
Vb	Timp însorit cu umezeală moderată și ridicată dar noros noaptea și cu precipitații
IVa	Timp noros ziua și senin noaptea
IVb	Timp noros ziua cu precipitații și senin noaptea
VI	Timp închis, fără precipitații
VII	Timp închis și ploios
XVI	Timp foarte cald și foarte umed
Timp de tranziție	
VIII	Timp cu îngheț nocturn, noros ziua
IX	Timp cu îngheț nocturn, senin ziua
Timp rece	
X	Timp răcoros
XI	Timp rece
XII	Timp geros
XIII	Timp foarte geros
XIV	Timp excesiv de geros
XV	Timp excepțional de geros

Sursa: Belozеров, Fărcaș, 1971.

Delimitarea claselor se face în funcție de temperatura aerului, de nebulozitate și de umezeala aerului, pentru grupa timpului cald și după temperatura aerului, în cazul grupelor timpului rece și de tranziție.

Clasele de timp se împart în *tipuri de timp* după criteriul nebulozității și al vântului, pentru grupa timpului rece și după criteriul vântului și al cantităților de precipitații, pentru grupa timpului cald.

Stabilirea claselor și tipurilor de timp pentru fiecare zi în parte se face cu ajutorul unor tabele în care sunt înscrise, într-o anumită ordine, datele meteorologice de la stații sau pe baza unei diagrame (figura 56).

După ce au fost stabilite tipurile și clasele de timp pe o perioadă multianuală, se calculează frecvența acestora, apoi se reprezintă grafic sub forma unor diagrame complexe care indică structura climatică a tipurilor de timp (figura 57). Construirea acestor grafice se face notând lunile pe axa orizontală și frecvența claselor de timp (vreme) pe cea verticală. Liniile orizontale care separă clasele împart graficele în benzi, iar lățimea benzilor indică durata claselor de timp. În partea inferioară a graficului se notează mersul anual al elementelor meteorologice luate separat (Belozеров, Fărcaș, 1971).

Grupe de timp	Timp de tranziție		TIMP RECE							
CLASELE	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV		
Denumirea claselor de timp	Timp cu îngheț nocturn noros ziua	Timp cu îngheț senin ziua	Timp răcoros	Timp rece	Timp geros	Timp foarte geros	Timp excesiv de geros	Timp exceptional de geros		
	S n	S n	S n	S n	S n	S n	S n	S n		
temperatura minimă	—	—	NEGATIVA							
temperatura maximă	+	+	POZITIVA							
temperatura medie diurnă	+	+	0,0 - 2,4	-2,5 - 12,4	-12,5 - 22,4	-22,5 - 32,4	-32,5 - 42,4	-42,5 - 42,4		
Fără vânt (ziua V < 4 m/s noaptea V < 1 m/s)										
Cu vânt (ziua V > 4 m/s noaptea V > 1 m/s)										

Nebulozitatea inferioară (în zecimi)		Umezeală relativă %	Temperatura medie diurnă									
			35,7...42,4	32,5...37,4	27,5...32,4	22,5...27,4	17,5...22,4	12,5...17,4	7,5...12,4	2,5...7,4	0,0...2,4	
Scnin	Ziua	< 6	0-20									
		21-40										
	Noaptea	< 6	41-60									
		61-70										
		71-80										
Noros - ziua	Ziua	6-10	0-20									
		21-40										
	Noaptea	< 6	41-60									
		61-80										
		81-100										
Noros - noaptea	Ziua	< 6	0-20									
		21-40										
	Noaptea	< 6	41-60									
		61-70										
		71-80										
Acoperit	Ziua	6-10	0-20									
		21-40										
	Noaptea	< 6	41-60									
		61-80										
		81-100										

LEGENDA





Fig. 56 – Diagrama pentru stabilirea claselor și tipurilor de timp conform metodei Feodorov – Ciubukov (după Belozеров, Fărcaș, 1971)




Fig. 57 – Structura climatică a tipurilor de timp la stația Predeal (după Belozеров, Fărcaș, 1971):

1 – durata medie a stratului de zăpadă; 2 – data primului și ultimului îngheț și durata intervalului fără îngheț; 3 – data medie a trecerii pragurilor termice de 0°, 5°, 10° și 15°C și durata medie a intervalelor corespunzătoare; 4 – extremele absolute; 5 – precipitațiile (hașuri) și temperaturile medii lunare (curba); cifrele romane reprezintă clasele de timp.

Fiecare clasă indică anumite caracteristici ale vremii, în funcție de care se poate stabili măsura în care un anumit tip de vreme este favorabil sau nu activităților turistice. Astfel, clasele I, II, III caracterizează o vreme stabilă, anticlonică, în care mersul elementelor meteorologice este normal. Ziua, intensitatea mare a luminozității activează procesele de excitație din scoarță, crește excitabilitatea generală a sistemului nervos central și se mărește

intensitatea schimbului de gaze (Solonin, Voronin, Ovciarova, citați de Teodoreanu, 2002). La *clasa V* vremea este ușor instabilă noaptea. Aceste clase de vreme se recomandă tuturor activităților turistice și climatoterapeutice de vară (băi de lumină, băi de soare, băi hidrice etc.), excepție face *clasa I* care la amiază poate provoca turiștilor predispuși la o transpirație ridicată, deshidratarea și demineralizarea organismului.

Clasa de vreme IV, cu nori ziua, cu sau fără precipitații, apare la trecerea fronturilor în timpul zilei și în perioadele de încălzire a maselor de aer, soldate cu formarea norilor Cumulus. Prezintă un grad mai mare de favorabilitate climatoterapeutică și turistică până la amiază, când fluxul radiațiilor solare este ecranat de nori, dar intensitatea radiației difuze este bogată în radiații ultraviolete și suficientă pentru helioterapie. După - amiaza există posibilitatea apariției ploilor torențiale generate de norii Cumulus congestus.

Clasele de vreme VI și VII au origine frontală, deci indică variații bruște ale elementelor meteorologice care provoacă turiștilor suferinzi reacții meteopatologice și le agravează bolile cronice.

Clasa XVI apare mai ales în regiunile tropicale calde și umede. Se caracterizează prin umezeală și temperaturi ridicate care induc turiștilor o senzație de zăpușeală amețitoare.

Clasele VIII și IX se înregistrează când temperatura minimă scade sub 0°C , dar temperatura maximă este pozitivă. Prima apare în condiții de front atmosferic, iar a doua în condiții de anticlon, adică de stabilitate atmosferică, deci este mai favorabilă activităților turistice, la fel ca și *clasele X și XI*, geroase, cu soare care permit practicarea sporturilor, a plimbărilor, a băilor de aer pe verande speciale sau solarii.

Clasele XII și XIII indică un ger pronunțat care reduce posibilitatea efectuării activităților turistice, mai ales în condiții de vânt.

Clasele de vreme XIV și XV sunt mai frecvente iarna, în condiții de climat rece, excesiv – continental, solicită îmbrăcăminte adecvată, un anumit regim termic al locuințelor etc. (Baibakova și colab., 1964, citați de Teodoreanu, 2002).

Metoda Feodorov - Ciubukov, prezentată în literatura noastră de specialitate de către Belozzerov și Fărcaș (1971), Teodoreanu (2002) etc. și utilizată de Elena Teodoreanu și colab. (1984), a fost considerată incompletă, pentru că nu dă o corelație cantitativă sau calitativă cu manifestările meteorologice și pentru că se limitează la un interval de numai 24 de ore, care nu corespunde cu durata reală a fazelor și tipurilor de vreme în succesiunea lor. De asemenea, prezintă și alte neajunsuri: este greoaie, necesită un volum mare de calcule, iar rezultatele obținute au un caracter relativ.

5.2.2. Metoda meteorologilor brazilieni

Are în vedere o analiză ritmică și calitativă, fondată pe evoluția în zile succesive a opt elemente climatice: umiditatea relativă, durata de strălucire a Soarelui, temperatura aerului, cantitatea de precipitații, fenomenele meteorologice (furtună, ceață), nebulozitatea la orele 12, 18 și 24, direcția și viteza vântului la aceleași ore și tipul de circulație atmosferică.

Figura 58 evidențiază caracteristicile meteorologice ale lunii ianuarie din anul 1973 la Rio de Janeiro. Spre exemplu, ziua de 17 ianuarie este total defavorabilă activităților turistice, deoarece înregistrează o cantitate de precipitații de 150 mm, o durată de strălucire a Soarelui aproape nulă și cea mai redusă temperatură din luna respectivă.

Așadar, meteorologii brazilieni prezintă foarte amănunțit fenomenele observate (figura 58), dar pentru a explica potențialul climato-turistic al unei regiuni nu pot fi utilizate în stare brută, știut fiind că orice studiu de acest gen presupune identificarea prealabilă a mai multor tipuri de zile caracteristice, în care combinarea elementelor climatice indică dacă respectivul tip de vreme se pretează sau nu activităților turistice.

Reprezentantul de seamă al acestei școli, E. B. Barbière, a realizat în acest sens, o clasificare a elementelor climatice în patru clase:

- clasa A – evidențiază condiții ideale pentru activitățile turistice.
- clasa B – arată că există condiții bune pentru desfășurarea activităților turistice.
- clasa C – indică o vreme schimbătoare care nu permite desfășurarea în siguranță a activităților în aer liber.
- clasa D – grupează condițiile total nefavorabile activităților turistice (tabelul 45).

Tabelul 45 - Clasificarea principalelor elemente climatice în funcție de gradul de favorabilitate al acestora pentru desfășurarea activităților turistice

Elementul climatic	Clasa A "ideală"	Clasa B "bună"	Clasa C "acceptabilă"	Clasa D "defavorabilă"
Temperatura (°C)	≥ 28	25-28	22-25	< 22
Durata de strălucire a Soarelui (ore)	≥ 9	6-9	3-6	< 3
Nebulozitatea (1/10)	≤ 4	4-6	6-8	> 8
Umezeala relativă (%)	≥ 75	75-80	80-85	> 85
Cantitatea de precipitații (mm)	≤ 1	1,1-2,5	2,5-10	> 10
Vântul (m/s)	≤ 3	3-5	5,7	> 7

Sursa: Barbière, 1981, cu modificări făcute de Besancenot, 1990.






Fig. 58 – Legenda descriptivă a tipurilor de timp după meteorologii brazilieni (A) și tipurile de timp (B) din ianuarie 1973 (după Barbière, 1981).

Aceste condiții climatice pot fi reprezentate grafic sub forma unui calendar climato – turistic anual (figura 59). Astfel, la Rio de Janeiro, luna ianuarie se caracterizează în medie prin 6 zile optime, 11 zile bune, 11 zile acceptabile (4 din cauza ploii și 7 din cauza însolației sau nebulozității) și 3



Legenda: 1. Condiții favorabile (A+B); 2. Condiții acceptabile (C); 3. Condiții defavorabile (D).

Fig. 59 - Calendarul climato-turistic anual la două stații din regiunea Rio de Janeiro (după Barbière, 1981).

zile urâte, datorită precipitațiilor excesive.

Punând aceste date în legătură cu principalele tipuri de circulație atmosferică, s-a constatat că la Rio de Janeiro, pe parcursul trimestrului estival (ianuarie-martie), circulația tropical atlantică însoțită de vânt nul sau slab din sud, are o probabilitate de 78% de a genera un timp ideal desfășurării activităților turistice. În schimb, o masă de aer polar atlantic ce se deplasează din sud, sud-est sau nord-vest determină un timp nefavorabil în 50% din cazuri și reduce posibilitatea apariției zilelor ideale la 3%. Metoda, după cum se poate observa, este foarte complexă și presupune mari eforturi în utilizare, motiv pentru care în ultimii ani cercetătorii au căutat să găsească o altă, mai simplă și mai convingătoare.

5.2.3. Metoda meteorologilor canadieni

O serie de cercetători canadieni în frunte cu R. B. Crowe, G. A. McKay, W. M. Baker (1977), A. D. Gates (1975), J. M. Masterton, R.B. Crowe, W. M. Baker (1976) etc. au realizat o clasificare a vremii în șapte tipuri de zile, șase dintre acestea fiind considerate favorabile pentru *plimbări turistice, activități sedentare* (plimbare, picnic, pescuit), *activități care cer un efort fizic mai susținut* (vânătoare, sport), *activități de plajă* (jocul cu mingea, bronzat, scăldat), *schii* și *un tip defavorabil* oricăror activități turistice.

Aceste caracteristici sunt grupate în tabelul nr. 46, conform căruia o zi este propice activității turistice, când condițiile meteorologice au fost favorabile timp de cel puțin 5 ore din cele 8 ale perioadei numită *de recreație maximă*, stabilită între orele 10 și 18.

De precizat că humidex este un indice termo-higrometric determinat pe baza formulei:

$$\text{Humidex} = T + 0,555 U - 5,555, \text{ unde:}$$

T = temperatura aerului ($^{\circ}\text{C}$);

U = tensiunea vaporilor (hPa).

Tabelul 46 - Condițiile climatice în care o anumită zi este favorabilă desfășurării activităților turistice conform clasificării specialiștilor canadieni

Tipul de activitate	Humidex ($^{\circ}\text{C}$)	Vizibilitatea (km)	Starea cerului	Viteza vântului	Cantit.de precip. (mm)	Gros.str de zăp. (mm)
Plimbare turistică	-24,4 → 31,7	> 4,8	*	< 11	0	*
Activitate sedentară	> 12,2	> 1,6	Neacoperit	< 8,9	0	*
Activ.fizică intensă (jocuri)	12,8-31,7	> 3,2	Neacoperit	< 8,9	0	*
Activ. de plajă	> 17,8	> 1,6	Neacoperit	< 6,7	0	*
Schi	> -14,4	> 0,8	*	< 6,7	≈ 0	> 25,4
Snowbord	> -21,1	> 0,8	*	< 6,7	≈ 0	> 25,4

* - Criteriu lipsit de importanță

Sursa: Gates, 1975, cu modificări de J.P. Besancenot, 1990

Rezultatele obținute pot fi reprezentate sub formă de calendare ce indică procentajul timpului în care condițiile meteorologice sunt favorabile diferitelor activități turistice. Menționăm în acest sens, situația determinată de A. D. Gates (1975) pentru Halifax (Canada) (fig. 60), unde frecvența zilelor favorabile schi-ului se ridică la 20% în prima decadă a lunii decembrie, depășește 50% la sfârșitul lui februarie și ajunge din nou la 20% la 1 aprilie. Pentru snowboard este nevoie de temperaturi mai scăzute, astfel încât acesta beneficiază de perspective mai bune în perioada ianuarie-februarie. Plimbările în aer liber ating maximumul de favorabilitate în lunile iulie-august, iar activitățile de plajă pot fi efectuate de la mijlocul lunii iunie




Fig. 60 - Frecvența anuală a zilelor favorabile diferitelor activități turistice la Halifax (după Gates, 1975, citat de Besancenot, 1990).

până la cel al lunii septembrie.

Această metodă prezintă anumite limite determinate de utilizarea unor elemente ambigue sau discutabile cum este cazul cerului neacoperit, a limitelor de timp prea cald și prea umed până la care se consideră că se pot efectua activitățile fizice sau plaja, a faptului că nu întotdeauna o ploaie care durează trei ore consecutive sau în intervalul dintre orele 10 și 18 împiedică desfășurarea activităților de plajă. În vederea înlăturării acestor neajunsuri, alți cercetători în frunte cu J. P. Besancenot, au elaborat o altă clasificare a tipurilor de vreme care înlătură abordarea mecanicistă și utilizează o analiză climato-turistică mai concretă, mai apropiată de adevăr.

5.2.4. Metoda Besancenot - Mounier - Lavenne

J. P. Besancenot, J. Mounier, F. de Lavenne (1978) au realizat o clasificare ce permite evidențierea combinațiilor zilnice ale principalelor elemente climatice care influențează activitatea turistică.

Metoda este intermediară, între cea a tipurilor de vreme și cea a indicilor, de la care preia caracterul sintetic și se remarcă prin simplitate, prin faptul că nu presupune mari eforturi în utilizare, iar valorile obținute sunt reale, măsurabile când este vorba de numărul de zile favorabile sau nu activităților în aer liber. Astfel, pentru *latitudinile temperate, în anotimpul de vară*, autorii disting nouă tipuri de vreme (tabelul 47). Primele șapte se pretează activităților turistice, fie perfect (tipul 1), fie cu unele rezerve determinate de un relativ timp urât (tipurile 4 și 5), de un anumit grad de disconfort (tipurile 2, 3, 6, 7), iar ultimele două 8 și 8 bis constituie situațiile de vreme care nu permit desfășurarea activităților în aer liber.

Departajarea tipurilor de vreme s-a făcut în funcție de cinci parametri climatici: durata de strălucire a Soarelui (I), în ore; durata precipitațiilor între orele 6 și 18 (D), în ore; temperatura maximă a aerului (Tx), în °C; viteza vântului la amiază (V), în m/s; tensiunea vaporilor la amiază (U), în hPa. În cazul în care la unele stații există lacune în efectuarea observațiilor meteorologice, anumite elemente pot fi înlocuite cu altele. Astfel, lipsa observațiilor asupra duratei de strălucire a Soarelui, poate fi suplinită de datele referitoare la gradul de acoperire a cerului cu nori la amiază, exprimat în optimi de cer acoperit, (Nb), iar cantitatea de precipitații căzută în timpul zilei (P), poate suplini lipsa datelor privind durata precipitațiilor, în cazurile în care nu s-au notat orele de început și sfârșit ale episoadelor ploioase.

Aceste date pot fi transpuse pe o diagramă climatică etajată, cu diferite tipuri de vreme caracteristice fiecărei decade, de la cele mai favorabile (la bază) până la cele care împiedică desfășurarea activităților turistice (la vârf). Spre exemplu la stația Corfu (figura 61), în *sezonul cald*, domină timpul însorit foarte frumos (tipul 1), cu o frecvență medie de 49,9%, urmat de timpul cald și apăsător (tipul 6), de timpul nefavorabil (tipul 8), cu 10,6% și de timpul frumos cu cer parțial acoperit (tipul 4), cu 9,5%.

Acest criteriu poate fi utilizat numai pentru *latitudinile temperate* în vederea caracterizării potențialului climato-turistic din sezonul cald. Pentru alte sezoane și alte latitudini se impune utilizarea altor criterii de apreciere specifice.

Tabelul 47 - Tipurile de vreme caracteristice zonei temperate în anotimpul de vară

Tipul 1: timp foarte frumos însorit $I \geq 9h$ sau $Nb \leq 2/8$ $D = 0h$ sau $P = 0mm$ $25 \leq T_x < 33^\circ C$ $V < 8 m/s$ $4 < U < 25 hPa$ 	Tipul 6: timp cald și apăsător $I \geq 9h$ sau $Nb \leq 2/8$ $D = 0h$ sau $P = 0 mm$ $T_x \geq 18^\circ C$ $V < 12 m/s$ $25 \leq U < 31,3hPa$ sau $I \geq 9h$ sau $Nb \leq 2/8$ $D = 0h$ sau $P = 0mm$ $T_x \geq 33^\circ C$ $V < 12 m/s$ $U < 31,3 hPa$ 
Tipul 2: timp frumos însorit $I \geq 9h$ sau $Nb \leq 2/8$ $D = 0h$ sau $P = 0mm$ $18 \leq T_x < 25^\circ C$ $V < 8 m/s$ $4 < U < 25 hPa$ 	Tipul 7: timp frumos cu vânt puternic $I \geq 9h$ sau $Nb \leq 2/8$ $D = 0h$ sau $P = 0mm$ $18 \leq T_x < 33^\circ C$ $8 \leq V < 12 m/s$ $4 < U < 25 hPa$ 
Tipul 3: timp răcoros însorit $I \geq 9h$ sau $Nb \leq 2/8$ $D = 0h$ sau $P = 0mm$ $16 \leq T_x < 18^\circ C$ $V < 8 m/s$ $4 < U < 25 hPa$ 	Tipul 8: timp defavorabil Toate celelalte tipuri de timp cu excepția tipului 8 bis 
Tipul 4: timp frumos cu cer parțial acoperit $3 \leq I < 9$ sau $2 < Nb \leq 6/8$ $D = 0h$ sau $P = 0mm$ $18 \leq T_x < 33^\circ C$ $V < 8 m/s$ $4 < U < 25 hPa$ 	Tipul 8 bis: timp umed, ploios $I < 3h$ sau $Nb \geq 6/8$ $D > 3h$ sau $P > 5mm$ 
Tipul 5: timp frumos cu scurte episoade ploioase $I \geq 3h$ sau $Nb \leq 6/8$ $0,1 \leq D < 1h$ sau $0,1 \leq P < 1mm$ $18 \leq T_x < 33^\circ C$ $V < 8 m/s$ $4 < U < 25 hPa$ 	

Sursa: Besancenot, 1990.

Astfel, pentru zona temperată, în vederea evidențierii potențialului climatologic în sezonul de iarnă, se utilizează criteriul prezentat în tabelul 48. În figura 62 este prezentată diagrama stațiunii Split pentru anotimpul de iarnă.

Tabelul 48 -Tipurile de vreme caracteristice zonei temperate în anotimpul de iarnă

Tipul 1: timp subestival $I \geq 6h$ sau $Nb \leq 4/8$ $D = 0h$ sau $P = 0 \text{ mm}$ $T_x \geq 16^\circ C$ $K \geq 58 \text{ W/m}^2$ $V < 6 \text{ m/s}$ $THI \leq 26,5^\circ C$ $U > 4 \text{ hPa}$ 	Tipul 5: timp plăcut cu scurte episoade pluviale $0,1 \leq D \leq 1$ sau $0,1 \leq P \leq 1 \text{ mm}$ $T_x \geq 10^\circ C$ $V < 6 \text{ m/s}$ $U > 4 \text{ hPa}$ 
Tipul 2: timp plăcut, însorit $I \geq 6h$ sau $Nb \leq 4/8$ $D = 0h$ sau $P = 0 \text{ mm}$ $10 \leq T_x \leq 16^\circ C$ $V < 6 \text{ m/s}$ $U > 4 \text{ hPa}$ 	Tipul 6: timp dezagreabil periculos la nivel pulmonar $I \geq 6h$ sau $Nb \leq 4/8$ $D = 0h$ sau $P = 0 \text{ mm}$ $T_x \geq 10^\circ C$ $V < 6 \text{ m/s}$ $U \leq 4 \text{ hPa}$ 
Tipul 3: timp rece cu cer însorit $I \geq 6h$ sau $Nb \leq 4/8$ $D = 0h$ sau $P = 0 \text{ mm}$ $4 \leq T_x \leq 10^\circ C$ $V < 6 \text{ m/s}$ $U > 4 \text{ hPa}$ $K = 974 \text{ W/m}^2$ 	Tipul 7: timp plăcut cu vânt puternic $I \geq 6h$ sau $Nb \leq 4/8$ $D = 0h$ sau $P = 0 \text{ mm}$ $T_x \geq 10^\circ C$ $6 \leq V \leq 10 \text{ m/s}$ $U > 4 \text{ hPa}$ 
Tipul 4: timp plăcut cu cer acoperit $I < 6h$ sau $Nb > 4/8$ $D = 0h$ sau $P = 0 \text{ mm}$ $T_x \geq 10^\circ C$ $V < 6 \text{ m/s}$ $U > 4 \text{ hPa}$ 	Tipul 8: timp defavorabil Toate celelalte tipuri de timp cu excepția tipului 8 bis 
	Tipul 8 bis: timp umed, ploios $I < 3h$ sau $Nb \geq 6/8$ $D > 3h$ sau $P > 5 \text{ mm}$ 

Sursa: Besancenot, 1990.

I = durata insolației (ore); Nb = nebulozitatea la ora 12 (optimi de cer acoperit); D = durata precipitațiilor între orele 6 și 18 ale zilei (ore); P = cantitatea de precipitații căzută între orele 6 și 18 ale zilei (mm); T_x = temperatura maximă ($^\circ C$); K = puterea de răcire a aerului la ora 12 (W/m^2); THI = indicele termo-higrometric la ora 12 ($^\circ C$); V = viteza vântului la ora 12 (m/s); U = tensiunea vaporilor de apă la ora 12 (hPa).




Fig. 61 - Diagrama climato-turistică a stației Corfu în anotimpul de vară (după Besancenot, 1990)




Fig. 62 - Diagrama climato-turistică a stației Split în anotimpul de iarnă (după Besancenot, 1990)

Anotimpurile de tranziție, toamna și primăvara, pot fi analizate utilizând criteriul pentru vară, dacă se are în vedere turismul balnear sau criteriul pentru iarnă, când se urmărește evidențierea perioadelor favorabile activităților specifice perioadei reci a anului. De asemenea, în funcție de scopul urmărit, cele două criterii pot fi utilizate simultan, rezultatele obținute fiind apoi comparate (figura 63).




Fig. 63 - Diagrama climato-turistică a stației Lorient în perioadele de tranziție, utilizând criteriul de vară (stânga) și pe cel de iarnă (dreapta) (după Besancenot, 1990)

Pentru *zona rece* se utilizează criteriul ilustrat de tabelul nr. 49 și aplicat pentru stația Murmansk (figura 64).

Tabelul 49 – Tipurile de vreme caracteristice zonei reci

Tipul 1: timp polar foarte frumos $I \geq 6$ h sau $Nb \leq 4/8$ Absența ceții $D = 0$ h sau $P = 0$ mm $10 \leq T_x \leq 16^\circ\text{C}$ $V < 8$ m/s $U > 4$ hPa	Tipul 4: timp polar frumos cu scurte episoade pluviale sau nivale Aceleași caracteristici ca și la tipul 1, 2 sau 3, excepție: $0 < D < 1$ sau $0 < P < 1$ mm
Tipul 2: timp polar frumos Aceleași caracteristici ca și la tipul 1, excepție: $0 \leq T_x \leq 10^\circ\text{C}$	Tipul 5: timp polar frumos cu vânt puternic Aceleași caracteristici ca și la tipul 1, 2, 3 sau 4, excepție: $8 < V < 12$ m/s $K < 1,115$ W/m²
Tipul 3: timp polar frumos cu cer parțiala coperit Aceleași caracteristici ca și la tipul 1 sau tipul 2, excepție: $1,5 \leq I < 6$ sau $4 \leq Nb < 7/8$	Tipul 6: timp defavorabil Toate celelalte tipuri de timp

Sursa: Besancenot, 1990.




Fig. 64 - Diagrama climato-turistică a stației Murmansk (după Besancenot, 1990)




Fig. 65 - Diagrama climato-turistică a stației Las Palmas (după Besancenot, 1990)

Pentru zona caldă se utilizează criteriul prezentat în tabelul 50 și aplicat pentru stația Las Palmas din Insulele Canare (figura 65).

Tabelul 50 - Tipurile de vreme caracteristice zonei calde

Agrement și confort	<i>Tipul 1: timp foarte frumos confortabil</i> $I > 7$ sau $Nb < 3/8$ $D = 0$ h sau $P = 0$ mm $22 \leq T_x \leq 31^\circ C$ $2 \leq V \leq 8$ m/s $58 \leq K \leq 525$ W/m² $THI \leq 26,5^\circ C$ $U \leq 26,5$ hPa 
Dezagrement relativ	<i>Tipul 2: timp confortabil dar cu cer parțiala acoperit</i> Aceleași caracteristici ca și la tipul 1, excepție: $3 < I \leq 7$ h sau $3 \leq Nb < 6/8$ 
	<i>Tipul 3: timp confortabil dar cu scurte episoade pluviale</i> Aceleași caracteristici ca și la tipul 1 sau 2, excepție: $0 < D < 1,5$ h sau $0 < P < 2$ mm 
	<i>Tipul 4: timp frumos cu vânt puternic</i> Aceleași caracteristici ca și la tipul 1 sau 2, excepție: $8 < V < 12$ m/s 
Inconfort relativ	<i>Tipul 5: timp frumos și răcoros</i> Aceleași caracteristici ca și la tipul 1 sau 2, excepție: $T_x < 22^\circ C$ și/sau $K > 525$ W/m² 
	<i>Tipul 6: timp frumos cald și apăsător</i> Aceleași caracteristici ca și la tipul 1 sau 2, excepție: $31 < T_x < 33^\circ C$ și/sau $0 < K < 58$ W/m² și/sau $26,5 < THI < 28,5^\circ C$ și/sau $26,5 < U < 31,3$ hPa 
Inconfort și/sau dezagrement absolut	<i>Tipul 7: timp urât, defavorabil turismului</i> Toate celelalte tipuri de vreme 
Insecuritate	Risc ciclonic ▲ important > 4 ciclonii sau Δ redus 0,5 – 4 depresiuni tropicale în 25 ani 

Sursa: Besancenot, 1990

6. MIC DICȚIONAR DE TERMENI CLIMATICI

A

Abatere: mărimea cu care valoarea unui element meteorologic (temperatură, precipitații etc.) diferă față de valoarea medie; aceasta poate fi pozitivă, dacă este mai mare decât valoarea medie și negativă, dacă este mai mică decât media.

Aclimatizare: procesul de adaptare a plantelor, a animalelor și a oamenilor la condiții climatice noi.

Agroclimatologie: ramură a climatologiei care studiază influența climei asupra producției agricole.

Amplasarea stației meteorologice: poziționarea stației meteorologice într-o anumită regiune (câmpie, deal, munte), în așa fel încât să reflecte caracteristicile climatului respectiv, iar valorile elementelor meteorologice măsurate să nu fie influențate de topografia locului, de vegetația, de apele sau de clădirile învecinate.

Amplitudine climatică: diferența dintre valorile maximă și minimă înregistrate de un element meteorologic în evoluțiile sale periodice. A. poate fi: a. *anuală medie* (diferența între cea mai mare și cea mai mică medie lunară din cursul unui an); a. *anuală absolută* (diferența între valoarea cea mai mare și cea mai mică din cursul unui an), a. *diurnă* (diferența între cea mai ridicată și cea mai scăzută valoare din cursul unei zile) etc.

Anomalie climatică: diferența între valoarea unui element climatic dintr-un anumit loc și valoarea medie a acelui element pe un cerc latitudinal care intersectează acel loc; abaterea față de normală.

Anotimp climatic: parte a anului formată din câteva luni și caracterizată printr-o oarecare omogenitate a condițiilor climatice; după valorile termice caracteristice se disting: a. *cald*, a. *rece*, a. *de tranziție*, iar după cele pluviometrice: a. *plouos*, a. *secetos* etc.

Asigurarea (frecvența cumulată): valoare, exprimată în procente, rezultată din însumarea frecvențelor relative sau a probabilităților.

Atlas climatic: lucrare compusă din hărți care reprezintă în special caracteristicile lunare și anuale ale principalelor elemente climatice dintr-o anumită zonă, analizată pe o perioadă suficient de lungă.

B

Bioclimatologie: ramură a climatologiei care studiază influența condițiilor climatice asupra organismelor vii; poate fi: *b. umană* (influența condițiilor climatice asupra omului); *b. animală* (influența condițiilor climatice asupra animalelor); *b. vegetală* (influența condițiilor climatice asupra vegetației).

C

Calamitate: v. Dezastru.

Cantitate de precipitații: grosimea, exprimată în mm, a stratului de apă provenit din precipitații de orice fel care se acumulează pe suprafața orizontală, considerând că nu s-ar scurge, nu s-ar infiltra și nu s-ar evapora; se determină cantitatea medie, cea mai mică sau cea mai mare dintr-o zi, o lună, un anotimp, un semestru, un an etc.

Catastrofă climatică: v. Dezastru.

Ciclu Brukner: oscilații cu perioade de circa 35 ani ale principalelor elemente climatice.

Cicluri climatice: ritmuri periodice de evoluție ale elementelor climatice cu serii lungi de date.

Clasificare climatică: împărțirea climatelor Pământului într-un sistem global de regiuni învecinate, fiecare definită printr-o relativă omogenitate a elementelor climatice (de exemplu Köppen, Thorntwaite etc.).

Clasificarea climatelor: identificarea și gruparea tipurilor de climat, după caracteristicile lor comune, cu scopul facilitării descrierii și cartografierii zonelor și regiunilor climatice. După criteriile care stau la baza elaborării lor, c. pot fi: *empirice* (bazate pe caracteristicile principale, observabile ale climei, cum sunt temperatura, precipitațiile etc.); *genetice* (având la bază cauzele care determină condițiile climatice specifice dintr-o regiune sau alta, cum sunt deplasările maselor de aer, efectele oceanelor și continentelor, ale barierelor montane etc.) și *aplicate, tehnice sau funcționale* (bazate pe una sau mai multe caracteristici ale climei și punând în evidență relațiile dintre acestea și diferite fenomene naturale sau aspecte ale activității antropice). Printre c. cele mai importante, folosite și astăzi se numără cele elaborate de G.

W. Köpen, Emm. de Martonne, C. W. Thornthwaite, L. S. Berg, B. P. Alisov, H. Critchfield, W. Böer etc.

Climat: raport asupra mediilor și sumelor lunare ale elementelor climatice de la o stație de uscat; poate fi: *c. calmant* sau *de crușare* (climat cu efecte binefăcătoare asupra organismului omenesc, indiferent de afecțiunile acestuia; în România este propriu regiunilor deluroase), *c. cuaternar* (climatul unei perioade geologice caracterizat prin răcirea accentuată pe o perioadă de circa un milion de ani), *c. SHIP* (Raport asupra mediilor și sumelor lunare de la o stație de pe ocean), *c. TEMP* (raport asupra mediilor aerologice lunare de la o stație de uscat), *c. TEMP SHIP* (raport asupra mediilor aerologice lunare de la o stație de pe ocean).

Climatografie: descriere numerică prin hărți, tabele, diagrame, sau texte asupra componentelor climei unei regiuni.

Climă (climat): regimul multianual al vremii care ia naștere în urma interacțiunii dintre factorii radiativi, circulația generală a atmosferei și complexul condițiilor fizico-geografice, sub influența tot mai accentuată a activității societății omenești. *C.* reprezintă unul dintre componenții mediului geografic și se caracterizează printr-o relativă stabilitate. Frecvent se utilizează expresiile: *c. solară*, *c. de radiație* sau *c. matematică* (clima pe care ar avea-o Pământul dacă suprafața lui ar fi uniformă și omogenă, iar radiația solară ar fi singurul factor climatogen); *c. artificială* (creată prin acțiune antropică în spații închise); *c. condiționată* (*c.* artificială obținută prin ventilație sau răcire); *c. ecuatorială*; *c. subecuatorială*; *c. tropicală*; *c. subtropicală*; *c. temperată* sau *mezotermă*; *c. subpolară*; *c. polară* (zone climatice în a căror individualizare latitudinea joacă un rol important); *c. continentală* și *c. oceanică* sau *marină* (tipuri climatice în a căror formare suprafața activă joacă rolul hotărâtor); *c. de munte*, *c. de dealuri*, și *c. de câmpie* (etaje climatice în a căror individualizare altitudinea are rolul determinant); *c. locală* (condițiile climatice ale unor teritorii nu prea întinse, cu însușiri relativ omogene) etc.

Climatologie: știința care se ocupă cu studiul genezei climatelor și răspândirii acestora pe suprafața Pământului. Printre principalele ei ramuri se numără: *c. dinamică sau sinoptică* (ramură a climatologiei, care studiază rolul proceselor circulației generale a atmosferei asupra climei); *c. generală sau genetică* (studiază acțiunea factorilor climatogenetici în cadrul procesului de geneză a climatelor, diferențierea, repartiția geografică și variația în timp a climatului); *c. bilanșului caloric* (studiază schimburile radiativ-calorice ce au loc la

suprafața terestră și în atmosferă, sursa energetică a proceselor climatice); *climatografia* (studiază condițiile climatice ale diferitelor regiuni de pe suprafața terestră); *topoclimatologia* (cercetează regimurile climatice dezvoltate sub influența condițiilor locale de relief, vegetație, sol, hidrografie etc., pe un fond general macroclimatic); *microclimatologia* (studiază rolul particularităților suprafeței terestre active, respectiv relief, vegetație etc. în geneza microclimatului, utilizând datele de observații microclimatice de stație și expediționare, în stratul de aer de la suprafața terestră cu grosimea de 2m); *paleoclimatologia* (cercetează climatele trecutului geologic, preistoric și istoric, schimbările lor și cauzele care le-au determinat); *bioclimatologia* (cercetează influența condițiilor climatice asupra oamenilor, plantelor și animalelor); *agrocimatology* (cercetează influența condițiilor climatice asupra culturilor agricole); *c. aeronautică* (cercetează influența condițiilor climatice asupra traficului aerian); *c. medicală* (studiază rolul factorilor și elementelor climatice în declanșarea anumitor boli); *c. silvică* (cercetează influența condițiilor climatice asupra vegetației forestiere) *c. turistică* (ramură a climatologiei aplicate care studiază influența climei asupra activităților turistice).

Climax: stare finală a succesiunii vegetației dintr-o anumită regiune la care se ajunge prin realizarea unui echilibru între comunitatea vegetală și climat, în condiții naturale. În starea de c. vegetația atinge optimul dezvoltării sale și depinde în primul rând de climat, celelalte elemente ale mediului având valoare secundară. *Disclimax:* climax perturbat de om. *Policlimax:* mai multe variante de c. impuse de variațiile solului în cadrul aceluiași c. *Paraclimax:* c. la care apare o stare de stabilitate relativă după intervenția umană.

Climograma: diagramă climatică întocmită pe baza valorilor medii lunare, anuale sau multianuale de temperatură și precipitații, care în funcție de valorile reliefate și de aspectul său (circular, oblic, extins pe verticală, extins pe orizontală) indică, la modul general, un anumit tip de climat, gradul de uscăciune al unui climat, al unei perioade etc.

Compensare: operațiunea de a aduce rezultatele unor măsurători cât mai aproape de valorile reale.

Confort termic: relația stabilită între temperatură, umezeală și vânt pentru ca un organism sănătos, îmbrăcat ușor, în repaus să nu piardă și să nu primească căldură.

Continentalism: totalitatea însușirilor climatice determinate de influența suprafeței uscatului asupra proceselor atmosferice.

Control climatic: 1. complex de factori climatici care determină, într-un mod relativ permanent, caracteristicile generale ale climei într-o anumită zonă a Pământului; 2. sistemul pentru modificarea sau controlul artificial al climei dintr-o regiune.

Controlul datelor: verificarea datelor de observații meteorologice cu ajutorul celor de la o altă stație învecinată utilizând metode speciale, care se bazează pe principiul conform căruia, procesele atmosferice care afectează o anumită regiune, imprimă elementelor meteorologice măsurate la stațiile din spațiul respectiv o evoluție concordantă, ilustrată de reprezentările grafice ale acestora.

Crionivală, zonă~: zonă climatică ce corespunde înghețului veșnic.

Criosfera: suprafața imaginară de la exteriorul Pământului deasupra căreia temperaturile scăzute creează condiții pentru formarea gheței pe orice pantă capabilă de a reține zăpada; la ecuator c. se ridică la cca 5000 m, în zonele temperate la cca 3000 m, iar la cercurile polare coboară la aproximativ zero m.

Curbă de variație: grafic simplu realizat pe baza valorilor medii lunare multianuale de temperatură. Indică variația acesteia în decursul unui an, iar prin trasarea unor praguri termice pot fi evidențiate fenofazele caracteristice plantelor și durata sezonului de vegetație.

D

Data extremă: cel mai târziu sau cel mai timpuriu moment din an în care se poate produce un anumit fenomen meteorologic sau climatic; se obține prin extragere din tabelele meteorologice sau prin calcul.

Data medie: momentul din an în care se produce în medie un fenomen meteorologic sau climatic.

Data climatică: orice înregistrare a evenimentelor meteorologice.

Date climatologice: totalitatea informațiilor directe (instrumentale), indirecte (inelele copacilor), istorice (arhive, informații orale) etc. care constituie cea mai importantă sursă pentru teoria și situațiile climatice.

Dendroclimatologie: disciplină care se ocupă cu determinarea caracteristicilor climatice ale trecutului istoric pe baza schimbărilor înregistrate de grosimea inelelor anuale ale arborilor.

Densitatea stațiilor meteorologice: numărul stațiilor meteorologice amplasate într-o anumită regiune.

Dezastru climatic: eveniment tragic de mari proporții soldat cu mari pagube materiale și umane.

Diagramă: reprezentare grafică ce înfățișează în mod sistematic și variat un obiect, un fenomen, o corelație între două sau mai multe mărimi sau curba trasată de un aparat cu înregistrare grafică; diagramele sunt folosite în toate disciplinele geografice.

Diagramă climatică: grafic întocmit pe baza valorilor de temperatură, precipitații, evapotranspirație potențială, evapotranspirație reală cu ajutorul căruia se poate caracteriza la nivel general, climatul unei regiuni, fenofazele caracteristice plantelor, durata sezonului de vegetație, intervalele cu exces sau deficit de umiditate; se utilizează mai des: d. *Walter – Lieth*; d. *Ch. Péguy*; d. *bilanșului hidric lunar* etc.

Discontinuitate climatică: o modificare destul de abruptă și permanentă a valorilor elementelor climatice, de-a lungul perioadei de înregistrare.

Durata: intervalul de timp în care s-a produs un fenomen climatic; poate fi: minimă, medie, maximă.

Durata strălucirii Soarelui: intervalul de timp, exprimat în ore și zecimi de oră, în care Soarele strălucește pe cer (*durata efectivă*) sau cel cuprins între răsărit și apus, în care Soarele poate străluci (*durata astronomică posibilă*); se poate exprima și ca raport în procente între durata efectivă și durata astronomică posibilă sau între durata efectivă și durata geografică (durata posibilă din punct de vedere geografic, topografic) (*durata relativă*).

E

Efect de seră: proces de încălzire a aerului datorită absorbției de către dioxidul de carbon, vaporii de apă și ozonul din atmosferă a anumitor radiații solare.

Element climatic: oricare dintre proprietățile sau condițiile atmosferice care caracterizează clima unei regiuni.

Etaj climatic: benzi altitudinale cu caracteristici climatice relativ omogene; poate fi: de litoral, de câmpie, de deal-podîș, de munte (*subalpin și alpin*).

Evaporație: Trecerea apei din stare lichidă ori solidă, în stare gazoasă, prin desprinderea de pe suprafața apei sau a gheții a moleculelor de apă cu mobilitate mai mare. Intensitatea evaporației se află în raport direct proporțional cu temperatura și viteza vântului și invers proporțional cu presiunea atmosferică. Întrucât o parte din vapori se întorc în faza lichidă ori solidă, evaporația reprezintă, de fapt, diferența dintre cantitatea moleculelor care se desprind și a celor care se întorc pe suprafața de evaporare: se deosebesc: *e. efectivă* (cantitatea de apă evaporată de pe o suprafață oarecare într-un anumit interval de timp) și *e. potențială* (cantitatea de apă care s-ar putea evapora în condițiile atmosferice ale unui loc oarecare, într-un anumit interval de timp, dacă rezerva de apă ar fi nelimitată). În hidrologie se deosebesc: *e. la suprafața apei*; *e. la suprafața solului liber sau acoperit de vegetație (evapotranspirație)*; *e. la suprafața zăpezii sau a gheții*; *e. globală* (totalitatea pierderilor de apă de pe teritoriu, însumând evaporația de la suprafața apei, de la suprafața solului, transpirația plantelor, evaporația apei reținută pe plante, evaporația de la suprafața zăpezii sau gheții; sinonim cu *evapotranspirația plantelor și solului*).

Extreme absolute: cele mai mari și cele mai mici valori înregistrate de către un anumit element meteorologic, la o anumită stație, în întreaga perioadă de observații.

F

Factori climatici: anumite condiții fizice (altele decât elementele climatice) care controlează clima (latitudinea, altitudinea, repartiția uscatului și a apei, topografia, curenții oceanici etc.).

Factori genetici ai climei: anumite condiții fizice (altele decât elementele climatice) care în interacțiunea lor continuă generează clima atât la scară planetară, cât și la scară regională sau locală; pot fi: *radiativi* (totalitatea fluxurilor radiative care străbat atmosfera); *dinamici* (centrii barici și circulația maselor de aer); *fizico-geografici* (natura suprafeței active, relieful, vegetația, solul etc.); *antropici* (despăduriri, desecări, irigații, poluare etc.); *cosmici*.

Fenomen climatic: manifestare exterioară vizibilă a unui element climatic.

Fluctuații climatice: inconstanță climatică reprezentată de orice formă de schimbare sistematică, fie ea regulată sau neregulată, cu

excepția tendinței și discontinuității; este caracterizată de cel puțin două maxime și o minimă sau două minime și o maximă, inclusiv cele de la capetele șirului de date.

Fracția de insolație: raportul exprimat în procente dintre durata efectivă și durata posibilă a strălucirii Soarelui.

Frecvența (frecvența absolută): numărul de cazuri din numărul total de cazuri în care se repetă o anumită valoare a unui element climatic.

H

Hartă climatologică: material cartografic ce redă repartitia teritorială, fie a zonelor și tipurilor de climat, fie a diferitelor caracteristici climatice.

Hazard climatic: fenomen climatic care se produce întâmplător, prevederea sa fiind dificil de realizat.

Histograma: diagramă climatică simplă care redă sub formă de coloane repartitia în cursul anului a cantităților de precipitații, a umezelii relative și a altor elemente climatice.

I

Inconfort: stare umană neplăcută, datorată unor condiții climatice nefavorabile sau unor forme ușoare de poluare fonică, odorică, termică, electromagnetică, manifestată prin ușoare deteriorări auditive, gustative, olfactive, estetice, termice.

Index climatic: număr care caracterizează un climat ca pe o funcție de elemente climatice principale.

Indice: fapt, indicație sau raport cantitativ sau calitativ care sub forma unui număr, a unei formule sau expresii, înfățișează aspectul unui fenomen, al unei acțiuni, al unei situații etc.; se deosebesc:

i. *Angot* (formulă care, pe baza cantității medii lunare – q - și anuale – Q - de precipitații, a numărului de zile dintr-un an – 365 - și a numărului de zile dintr-o lună – n -, arată nuanța climatică, secetoasă sau ploioasă a fiecărei luni dintr-un an:

$$I = q \cdot 365 / (Q \cdot n);$$

i. *Bagnouls-Gaussen* (indice sezonier al lunilor în care suma precipitațiilor nu atinge dublul mediei termice și indică gradul de uscăciune al lunilor respective);

i. *Bagnouls-Legris* (formulă care evidențiază gradul de umiditate al unei luni, utilizând cinci parametri: numărul de zile cu ploaie – n -, numărul zilelor cu ceață – b -, numărul zilelor cu rouă – r - și o constantă – k - a cărei valoare variază în funcție de higrometria aerului:

$$I = k [N - n - (b + r/2)]$$

i. *biomedical* (formulă utilizată în bioclimatologie, elaborată pe baza mai multor compuși climatici care indică dacă o zi sau o perioadă este nocivă sau nu pentru sănătate:

$$IBA = \psi_1 + \theta + V + \psi_2 + \psi_3 - 2I, \text{ unde:}$$

ψ_1 = umiditatea relativă mai mare de 50% + cantitatea de precipitații (mm) + durata precipitațiilor (ore), totul împărțit la 5;

θ = numărul de grade Celsius sub 12 sau sub 25°C;

V = viteza medie a vântului (m/s);

ψ_2 = constantă cu valoarea 5 pentru fiecare variație bruscă a presiunii atmosferice care depășește 2hPa/oră;

ψ_3 = constantă cu valoarea 5 pentru orice fenomen meteorologic deosebit, precum ceața, furtuna, vijelia;

I = durata de strălucire a Soarelui (S);

i. *climatic balnear* (formulă care estimează calitatea turistică a sezonului estival raportând numărul de zile ploioase din cele patru luni caracteristice ale sezonului estival – N -, la temperatura medie a aerului în perioada respectivă – T - :

$$ICB = N/T;$$

i. *climato-marin* (formulă care evidențiază potențialul climato-turistic al unei regiuni, utilizând datele privind temperatura aerului – T -, temperatura medie a apei marine – T_e -, durata medie a strălucirii Soarelui – I -, numărul de zile cu vânt puternic – N_v -, numărul de zile cu ceață – N_k -, numărul de zile cu ger – N_g - și numărul de zile cu zăpadă – N_n - și numărul zilelor cu ploaie – N - :

$$ICM = (T + T_e + I) - (N + N_v + N_k + N_g + N_n);$$

i. *de confort termic* (este dat de temperatura echivalent efectivă cuprinsă între 16,8° și 20,6° TEE, adică de o valoare rezultată din calcul care redă temperatura efectiv resimțită de organismul uman, în anumite condiții de

încălzire a aerului, de încărcare cu vapori de apă și curenți de aer. Pentru determinarea temperaturii efective se utilizează formula:

$$TEE = 0,4 (t_d + t_w) + 4,8, \text{ unde:}$$

TEE = temperatura echivalent – efectivă;

t_d = temperatura termometrului uscat;

t_w = temperatura termometrului umezit la o viteză a vântului $< 0,1 \text{ m/s}$

i. *climato – turistic* (formulă care permite evidențierea duratei optime a sezonului turistic și a curenților în aer liber în perioada caldă a anului, utilizând datele privind durata de strălucire a Soarelui – S - , temperatura medie lunară a aerului – T- și durata precipitațiilor din timpul zilei între orele 7 și 19 – D - :

$$I = (S + T - 5D) : 5;$$

i. *de ariditate "de Martonne"* (formulă care pe baza cantității de precipitații medii anuale – P – sau lunare – p - , a temperaturii medii anuale – T – sau lunare – t - și a unei constante – 10 - , evidențiază caracteristicile termopluviometrice ale regiunii, caracteristicile covorului vegetal, caracteristicile rețelei hidrografice, variabilitatea climatică dintr-o anumită perioadă:

$$I_a = \frac{P}{T+10}, \text{ pentru un an și: } I_a = \frac{12p}{t+10}, \text{ pentru o lună);}$$

i. *d'Emberger* (formulă utilizată pentru caracterizarea climatelor cu influențe mediteraneene, sens în care utilizează patru parametri: cantitatea anuală de precipitații – P - , numărul de zile cu ploaie – n, - temperatura maximă – M - , temperatura minimă – m - :

$$I = \frac{50p}{(M+n)(M-n)});$$

i. *Gaus* (formulă care exprimă preponderența tipului de influență climatică, raportând cantitatea de precipitații – P - la altitudinea stației meteorologice – Alt - :

$$I = \frac{P}{Alt});$$

i. *Gauszen* (formulă cu ajutorul căreia se obține un coeficient al stării higrometrice care evidențiază numărul de zile ploioase dintr-o regiune:

- coeficientul 0,9 pentru 40-60% zile ploioase;
- coeficientul 0,8 pentru 60-80% zile ploioase;

- coeficientul 0,7 pentru 80-90% zile ploioase;
- coeficientul 0,6 pentru mai mult de 90% zile ploioase;
- coeficientul 0,5 pentru zilele noroase și cețoase);

i. *grade* – zile (reprezintă diferența algebrică, exprimată în grade, între temperatura medie a unei zile date și o temperatură de referință, de exemplu 10°C sau 0°C. Pe o perioadă dată, luni sau ani, reprezintă suma algebrică a “gradelor-zile” ale diferitelor zile din perioada respectivă);

i. *hidrotermic* (formulă care, pe baza cantității anuale de precipitații – p -, temperaturii medii anuale – t - și a unei constante – 1000 - , indică gradul de favorabilitate a ansamblului climatic pentru dezvoltarea, structurarea, repartitia culturilor agricole și a vegetației naturale:

$$I = \frac{p \cdot t}{1000};$$

i. *K* (formulă care exprimă gradul de favorabilitate climatică pentru vegetația forestieră și se calculează ca raport între cantitatea de precipitații din perioada cu temperaturi mai mari de 10°C – p - și suma temperaturilor din aceeași perioadă – t -

$$K = p/t);$$

i. *Köppen* (se calculează pe baza relației:

$$I = \frac{p}{T+7},$$

unde: p = cantitatea anuală de precipitații; T = temperatura medie anuală; 7 = constantă.

i. *Lang* (formulă care pe baza raportului dintre cantitatea anuală sau multianuală de precipitații – p - și temperatura medie anuală sau multianuală – t - , exprimă gradul de umiditate atmosferică și variația sa sezonieră sau anuală în cadrul unei regiuni:

$$I = \frac{p}{t});$$

i. *Marchand* (relație care estimează potențialul climato-turistic al unei regiuni pe baza diferenței dintre cantitatea de precipitații atmosferice – P - și evapotranspirația potențială – ETP - :

$$IM = P - ETP);$$

i. *Mayr* (exprimă media de temperatură a celor patru luni ale anului cu cea mai mare temperatură – mai, iunie, iulie, august – care exprimă optimul termic al vegetației din perioada cu activitate biologică maximă)

i. *Musset-Gaussen* (formulă dată de gruparea inițialelor celor patru anotimpuri în ordinea descrescândă a cantităților de precipitații și evidențiază distribuția anuală a cantităților medii anotimpuale ale acestora);

i. *planetar* (formulă care își propune evaluarea potențialului climatologic la nivelul întregului glob terestru, utilizând cinci indici elementari:

$$ICT = 8C_{id} + C_{ia} + 4R + 4S + 2W, \text{ unde:}$$

C_{id} = indicele de confort obținut cu ajutorul unui grafic realizat pe baza valorilor maxime de temperatură și a celor minime ale umezelii relative;

C_{ia} = indicele de confort mediu obținut prin asocierea valorilor temperaturilor medii cu cele ale umidității relative medii;

R = indice pluviometric dedus dintr-un tabel special;

S = indice de insolație dedus dintr-un tabel special;

W = indicele anemometric dedus dintr-un tabel special);

i. *Poulter* (formulă care determină calitatea sezonului estival pe baza temperaturii medii a acestuia - T -, a duratei de strălucire a Soarelui din perioada respectivă - I -, a sumei cantităților de precipitații din sezonul estival - P - și a unei constante - 320 - :

$$IP = 18T + 0,167I - 0,2P + 320;$$

cuprinde și alte variante:

$$I_h = T_x + 0,045I - 0,2P_r, \text{ elaborată de Hughes (1967);}$$

$$I_d = 18T_x + 0,217I - 0,276P + 320, \text{ elaborată de Davis (1968);}$$

$$I_s = 18T + 0,106I - 0,303P + 320, \text{ elaborată de Flocas (1975);}$$

în care:

T_x = media temperaturilor maxime înregistrate în sezonul estival;

I = durată însumată a strălucirii Soarelui în perioada respectivă;

P = cantitatea totală de precipitații înregistrată în sezonul estival;

P_r = numărul de zile cu ploaie);

i. *anomalia standardizată de precipitații - ASP-* (formulă care indică într-o anumită perioadă - lună, anotimp, semestru, an etc. - deficitul sau excesul de precipitații dintr-o regiune, raportând diferența dintre termenul din șir și media șirului, la abaterea medie pătratică:

$$ASP = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$$

în care: x_i = cantitatea lunară sau anuală de precipitații dintr-un anumit an;

$\bar{x}$ = media multianuală a cantităților lunare sau anuale de precipitații;

σ = abaterea medie pătratică a șirului de valori;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

N = numărul de ani luați în calcul.

i. *de temperatură – umezeală* (formulă care indică gradul de confort termo-higrometric din încăperile închise pe baza valorilor de temperatură și umiditate relativă înregistrate la un moment dat:

$$\text{I.T.U.} = (T \cdot 1,8 + 32) - (0,55 - 0,0055U)[(T \cdot 1,8 + 32) - 58],$$

unde: I.T.U. = indicele de temperatură – umezeală;

T = temperatura aerului;

U = umezeala relativă a aerului.

Formula poate fi folosită de publicul larg, pe baza informațiilor din buletinele meteorologice locale și indică o anumită valoare în funcție de care gradul de confort se apreciază astfel:

$\text{I.T.U.} \leq 65$ - stare de confort;

$66 \leq \text{I.T.U.} \leq 79$ - stare de alertă;

$\text{I.T.U.} \geq 80$ - stare de inconfort).

Instabilitate climatică: o fluctuație în care variabila climatică tinde să se situeze alternativ în jurul a două sau mai multe valori medii și să migreze de la o valoare la alta la intervale regulate sau neregulate.

Interval: perioada de timp în care se poate produce un fenomen climatic; poate fi: minim, mediu, maxim.

Interval de risc: durata cuprinsă între data extremă de producere a unui fenomen climatic și data medie, în care se pot produce diverse pagube.

Izalobară: linie care unește punctele cu valori egale ale variației presiunii dintr-un interval dat.

Izalotermă: linie care unește punctele cu valori egale ale variației temperaturii aerului dintr-un interval dat.

Izanacatabară: linie care unește punctele cu valori egale ale amplitudinii presiunii atmosferice.

Izanemonă: linie care unește punctele cu valori egale ale vitezei medii a vântului.

Izanomală: linie care unește punctele cu valori egale ale unei anomalii (abateri) oarecare.

Izanomalia: linie de-a lungul căreia anomalia unui element climatic are aceeași valoare (de exemplu, o anomalie izotermă).

Izoatmă: linie care unește punctele cu valori egale ale evaporării reale sau potențiale.

Izobară: linie care unește punctele cu valori egale ale presiunii atmosferice.

Izocineta: v. Izotahă.

Izofenă: linie care unește punctele cu date identice de apariție a unui anumit fenomen ce are influență asupra dezvoltării ciclice a unor organisme vegetale sau animale.

Izofotă: linie care unește punctele cu valori egale ale intensității luminii.

Izogeotemă: linie care unește punctele cu valori egale ale temperaturii solului.

Izogonă: linie care unește punctele caracterizate prin aceeași direcție a vântului.

Izogramă: linie care unește punctele cu aceleași valori ale umezelii specifice.

Izohalină: linie care unește punctele de egală salinitate într-un bazin marin, oceanic sau lacustru.

Izohasmă: linie care unește punctele cu valori egale ale frecvenței aureolelor polare.

Izohelă (v. helioizopletă): linie care unește punctele cu valori egale ale duratei strălucirii Soarelui.

Izohietă: linie care unește punctele cu valori egale ale cantității precipitațiilor.

Izolinie: linie care unește pe o hartă, punctele de egală valoare a unor elemente geografice, geologice etc.

Izoncă: linie care unește punctele (de pe suprafața terestră) cu valori egale ale nebulozității.

Izopectă: linie care unește punctele cu date identice de producere a gerului.

Izopletă: linie care prezintă variația unui element meteorologic oarecare, în raport cu două variabile, cum sunt de pildă timpul și înălțimea, regimul diurn și regimul anual etc.

Izotahă: linie care unește punctele de egală viteză, în secțiune transversală, a unui curs de apă sau punctele cu valori egale ale vitezei vântului etc.

Izotermă: linie care unește punctele cu valori egale ale temperaturii aerului.

Izotropie: stare a atmosferei în care însușirile ei fizice sunt identice în orice direcție.

Izovelă: v. Izotahă.

L

Limita zăpezilor persistente (perpetue, perene, veșnice): linia începând de la care pot exista, în funcție și de condițiile locale (de expoziție și microclimat), formațiuni de firn sau chiar ghețari permanenți. Pentru vechea glaciațiune această limită este marcată, cu oarecare aproximație, de *nișele nivale*, *circurile suspendate* aliniate imediat sub unele creste, ca și de *nivelul mediu al fundului circurilor obișnuite*. Această limită este, de obicei, mai ridicată pe versanții orientați către Soare și mai coborâtă pe versanții orientați către poli, fiind totodată mai ridicată în interiorul lanțului muntos decât pe marginile sale.

Limita orografică a zăpezilor persistente: limita sinuoasă care unește punctele cele mai joase ale unei zone ce are condiții regionale și locale de menținere a zăpezii de la un an la altul. Aici zăpezile permanente coboară sub forma unor petice nu prea întinse, situate în porțiunile concave ale reliefului, unde radiația solară are valori mai reduse.

M

Macroclimă: clima unei regiuni geografice întinse, a unui continent sau chiar a întregului Glob.

Media unui element climatic: raportul dintre suma algebrică a valorilor măsurate ale elementului respectiv și numărul valorilor însumate; se calculează *media diurnă, lunară, anotimpuală, anuală pentru orice element climatic* (temperatură, umezeală, precipitații, vânt etc.), *media anuală a temperaturii minime sau maxime* (media temperaturilor minime sau maxime observate într-un an sau într-o anumită perioadă), *media periodică* (media calculată pe o perioadă de cel puțin 10 ani, începând cu data de 1 ianuarie a primului an și sfârșind cu data de 31 decembrie a ultimului an).

Mesaje climat: mesaje publicate lunar de către Serviciile Meteorologice Naționale, conținând date climatice de suprafață codificate din luna precedentă (rapoarte climat) de la stații selecționate.

Metodă climatică: modalitate de exprimare prin indici calitativi sau de exprimare grafică a unor parametri climatici în vederea caracterizării unei regiuni din punct de vedere climatic; se utilizează:

m. arealelor (tehnică de realizare a hărților climatice care prezintă răspândirea pe suprafață a fenomenelor și proceselor discontinue: mase de aer, oraje, cețuri, înghețuri, brume etc., suprafețele respective fiind delimitate prin linii curbe sau prin contururi imprecise, dacă au răspândire difuză, iar pentru evidențierea calității fenomenelor se hașurează sau se colorează;

m. Besancenot-Mounier-Lavenne (modalitate de analiză a potențialului turistic al climei care utilizează cinci parametri climatici: durata de strălucire a Soarelui, durata precipitațiilor între orele 6 și 18, temperatura maximă a aerului, viteza vântului, tensiunea vaporilor din timpul zilei, în funcție de care se disting nouă tipuri de vreme, primele șapte se pretează într-o anumită măsură activităților turistice, iar ultimele două nu permit desfășurarea acestora);

m. cartodiagramei (tehnică de întocmire a hărților climatice care permite redarea simultană, atât a repartiției geografice, cât și a regimului anual al unor elemente climatice prin diagrame construite la scară și plasate în apropierea punctelor de observație);

m. cartogramei (tehnică de întocmire a hărților climatice care prezintă repartiția radiației solare, a umezelii din sol etc. în funcție de orientarea și înclinarea versanților, redarea acestora făcându-se prin arceale de forme neregulate, prin hașuri sau culori gradate după intensitatea fenomenelor);

m. Feodorov – Ciubukov (modalitate de analiză a caracteristicilor bioclimatice și climato-turistice ale unei regiuni, utilizând marea varietate a tipurilor de vreme care sunt împărțite în trei grupe principale: vreme fără ger, vreme cu trecerea temperaturii prin 0°C și vreme geroasă. Aceste grupe cuprind 16 clase de vreme delimitate pe baza valorilor temperaturii medii și minime din 24 ore, ale umezelii medii relative a aerului, ale nebulozității, ale precipitațiilor și ale caracteristicilor vântului);

m. fondului calitativ (tehnică de realizare a hărților climatice care presupune delimitarea și ierarhizarea tipurilor și subtipurilor climatice în funcție de acțiunea factorilor zonali și a celor azonali, utilizând culorile sau hașurile);

m. izoliniilor (tehnică de realizare a hărților climatice care reprezintă repartiția unui element climatic cu ajutorul liniilor ce unesc punctele cu aceeași valoare a respectivului element climatic);

m. liniilor în mișcare (tehnică de întocmire a hărților climatice care redă dinamica în timp și spațiu a fenomenelor climatice - traiectoria maselor de aer, vântul dominant etc.- prin săgeți a căror grosime indică intensitatea fenomenelor, în timp ce direcția și întinderea lor sunt sugerate de orientarea și lungimea vectorilor);

m. mediilor glisante (modalitate de analiză care utilizează șiruri foarte lungi, continue și omogene de observații meteorologice - peste 100 ani -, pentru care se calculează valorile medii pe intervale de 5, 10, 20 sau 30 ani, decalate succesiv cu câte un an pentru a se reduce amplitudinile oscilațiilor accidentale și a se evidenția schimbările de lungă durată ale climei; în acest scop se calculează mediile glisante pentru trei elemente de bază care caracterizează clima: temperatura, precipitații și presiunea aerului);

m. meteorologilor brazilieni (modalitate de analiză ritmică și calitativă a tipurilor de vreme, fondată pe evoluția în zile succesive a opt elemente climatice: umiditatea relativă, durata de strălucire a Soarelui, temperatura aerului, cantitatea de precipitații, fenomenele meteorologice, nebulozitatea, vântul și tipul de circulație atmosferică);

m. meteorologilor canadieni (modalitate de analiză a potențialului turistic al climei care utilizează o clasificare a vremii în șapte tipuri de zile, șase dintre acestea fiind favorabile diferitelor activități turistice, iar al șaptelea tip fiind defavorabil oricăror activități turistice);

m. punctelor (tehnică de realizare a hărților climatice care prezintă răspândirea elementelor și fenomenelor climatice discontinue în timp și spațiu: temperatura maximă sau minimă, cantitatea maximă de

precipitații etc., prin cifre înscrise în dreptul punctului de stație corespunzător);

m. tipurilor de vreme (modalitate de analiză a potențialului turistic al climei ce presupune identificarea mai multor tipuri de zile caracteristice, în care combinarea elementelor climatice indică dacă respectivul tip de vreme se pretează sau nu activităților turistice).

Mezoclimă: clima unei regiuni naturale de mici dimensiuni (vale, poiană, pădure etc.) care este poziționată intermediar, pe scală, între microclimă și macroclimă. v. **Topoclimă**.

Microclimatologie: ramură a climatologiei care studiază microclima.

Microclimă: totalitatea variațiilor înregistrate de elementele meteorologice în stratul de aer inferior, de regulă sub 2 m înălțime, ca urmare a influenței directe exercitate de porțiunile mici, omogene ale suprafeței active subiacente.

N

Nebulozitate: termen care indică gradul de acoperire a cerului cu nori, exprimat în zecimi sau optimi de cer acoperit; se disting următoarele situații: *cer senin* (gradul de acoperire a cerului cu nori este cuprins între 0 și 1 zecime); *cer variabil* (gradul de acoperire a cerului cu nori este cuprins între 2 și 6 zecimi); *cer noros* (gradul de acoperire a cerului cu nori este cuprins între 6 și 8 zecimi); *cer mai mult acoperit* (gradul de acoperire a cerului cu nori este cuprins între 8 și 9 zecimi); *total acoperit* (gradul de acoperire a cerului cu nori este de 10 zecimi).

Noapte geroasă: noapte în care temperatura minimă este $\leq -10^{\circ}\text{C}$.

Nomograme: grafice lineare reprezentate în coordonate rectangulare care servesc pentru calculul datelor medii de producere a înghețului sau ale altor fenomene.

Normale: medii calculate pentru perioade uniforme și relativ lungi, respectiv pentru cel puțin trei intervale consecutive de câte zece ani.

Normale climatologice standard: medii ale datelor climatologice calculate pentru următoarele perioade consecutive de 30 de ani: de la 1 ianuarie 1931, la 31 decembrie 1960; de la 1 ianuarie 1961, la 31 decembrie 1990 etc.

Numărul de zile cu Soare: suma tuturor zilelor dintr-o anumită perioadă (lună, anotimp, an) în care Soarele a strălucit pe cer indiferent de durată.

O

Observație climatică: observație meteorologică efectuată zilnic, la patru termene orare standard (00, 06, 12, 18) după timpul solar mediu local.

Observație meteorologică: determinarea pe cale vizuală sau instrumentală a valorii (caracteristicii) unuia sau a mai multor elemente meteorologice.

Omogenizarea datelor: modalitate prin care datele rezultate din observațiile meteorologice se ajustează în așa fel, încât datele înregistrate într-o anumită perioadă să se poată compara cu cele din altă perioadă care sunt diferite de primele, datorită schimbării tipurilor de instrumente, modificării programului de observații, schimbării amplasamentului platformei meteorologice etc. În acest scop se utilizează metode specifice, respectiv metoda corelației și metoda diferențelor.

Optimum climatic: fază climatică postglaciară relativ caldă și uscată care a fost localizată în Europa meridională și fixată între anii 9 000 și 5 000 îen, respectiv între Boreal și Atlantic. Reprezintă cea mai caldă perioadă înaintea celei actuale, în care plantele termofile și xerofile s-au extins mult.

Oscilație climatică: o funcție în care variabila tinde să se afle constant în minime și maxime succesive.

Oscilațiile climei: modificările ritmice neprogresive ale climei, care depind de oscilațiile activității solare și de cele ale circulației atmosferice generale.

P

Paleoclimat: climat vechi ale cărui caracteristici se deduc din studiul mărturiilor geologice și paleontologice (fragmente de floră, faună, fosile, chiar forme de relief etc.).

Paleoclimatologie: ramură a climatologiei care studiază condițiile climatice din fiecare perioadă geologică, în scopul reconstituirii și explicării, atât a evoluției lor de-a lungul istoriei Pământului, cât și a

repartiției teritoriale caracteristice. La bază ei stau cercetările paleontologice, precum și diferite legi și ipoteze ale astronomiei.

Perioada de observații: intervalul de timp în care s-au efectuat observații la o anumită stație meteorologică.

Periodicitate climatică: un ritm în care intervalul de timp dintre minime și maxime succesive este constant sau aproape constant de-a lungul șirului de date.

Periodic climatologic: publicație care are ca scop pregătirea și publicarea unor serii săptămânale, lunare sau anuale de date, dintr-o bază de date seculare.

Ploaie torențială: ploaia care dă o cantitate foarte mare de precipitații într-un interval scurt de timp.

Polii căldurii: punctele în care s-au înregistrat cele mai ridicate temperaturi ale aerului pentru fiecare dintre cele două emisfere ale planetei (Al Aziziyah, Libia $58,0^{\circ}\text{C}$, valoare înregistrată la 13 septembrie 1922, pentru emisfera nordică și $52,5^{\circ}\text{C}$, temperatură înregistrată la Cloncurry – Queensland, Australia pentru emisfera sudică).

Polii frigului: punctele în care s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi ale aerului pentru fiecare dintre cele două emisfere ale Pământului (Oimeakon, Rusia, cu temperatura de $-71,1^{\circ}\text{C}$, înregistrată în ianuarie 1964 pentru emisfera nordică și Vostok, Antarctica, cu temperatura de $-89,2^{\circ}\text{C}$, înregistrată la 21 iulie 1983, pentru emisfera sudică).

Post pluviometric: locul unde se fac observații asupra precipitațiilor (lichide și solide).

Prelucrarea primară a datelor meteorologice: etapa de pregătire a datelor de observație meteorologică în vederea realizării analizei climatologice. Constă în aplicarea corecțiilor la valorile citite la instrumentele meteorologice, descifrarea diagramelor de la aparatele înregistratoare, verificarea rezultatelor observațiilor meteorologice și întocmirea tabelelor lunare conform instrucțiunilor elaborate de INMH.

Prelungirea datelor: modalitate prin care datele rezultate din observațiile meteorologice care lipsesc de la o anumită stație (datorită întreruperii activității, a înființării mai târzii a stației etc.), se completează cu datele de la o stație învecinată amplasată în aceleași condiții geografice. În acest scop se utilizează metode specifice, respectiv metoda corelației și metoda rapoartelor.

Presiune atmosferică: forța cu care aerul apasă asupra suprafeței terestre; se măsoară în milimetri coloană de mercur, milibari sau hectopascali.

Prevedere climatologică: anticiparea condițiilor climatice pentru o perioadă viitoare de lungă durată, pe baza prelucrării statistice a datelor meteorologice din anii precedenți.

Probabilitatea (frecvența relativă): parametru care indică măsura în care este posibilă producerea unei anumite valori a unui element climatic (temperatură, precipitații etc.); se exprimă în procente.

Prognoza climatologică: anticiparea caracteristicilor climatului unei regiuni.

Publicație climatologică specială: material scris care apare ocazional și include capitole cu date medii și extreme, diferite tipuri de date statistice, descrierea climatelor regionale sau naționale, rapoarte asupra aspectelor speciale ale climei unei țări, studii de climatologie aplicată etc.

Publicație cu date curente: material scris care cuprinde date foarte recente, tipărite, deși nu au trecut încă prin controlul de calitate standard.

Publicație cu date istorice: material scris care cuprinde date oficiale despre vremea din anumite locuri și perioade bine stabilite. Datele au fost atent verificate înaintea publicării.

Publicație cu date statistice: material scris conținând date prelucrate statistic, din care au rezultat valori medii, extreme, frecvențe pentru anumite perioade de ani sau decenii.

R

Record climatic: fenomen climatic deosebit de intens, evidențiat de cea mai mare sau cea mai mică valoare absolută pe care aceasta a înregistrat-o vreodată.

Regim climatic: termen folosit în climatologie pentru a caracteriza distribuția sezonieră a unuiu sau a mai multor elemente climatice într-un anumit loc. Se deosebește regimul diurn, lunar, anotimpual, anual al temperaturii aerului, al umezelii aerului, al precipitațiilor atmosferice etc.

Regiune climatică: spațiu în care conform unor criterii specifice, climatul este relativ uniform.

Rețea climatologică: toate stațiile de un anumit tip (de exemplu stațiile climatologice obișnuite) sau stațiile care, indiferent de tipul lor (de exemplu stațiile radiometrice), participă la programe speciale în care datele observate provin de la instrumente oficiale amplasate și utilizate conform standardelor prestabilite.

Ridicare microclimatică: program de observații microclimatice efectuate sincron într-un număr determinat de puncte pe o perioadă, de obicei, scurtă.

Risc climatic: fenomen climatic cu potențialitate distructivă mare. El incumbă atât cauza (hazardul), cât și consecința (dezastrul).

Ritm climatic: oscilație, fluctuație sau ciclu în care maximele și minimele succesive se produc la intervale de timp aproximativ egale.

Rosa vânturilor: grafic complex care ilustrează direcția și viteza vântului la o anumită stație meteorologică.

S

Schimbare climatică: în sensul cel mai general termenul include toate formele de inconstanță climatică, indiferent de natură sau cauze fizice.

Schimbările climei: variații progresive sau regresive de lungă durată ale caracteristicilor climei, care au avut loc în trecutul geologic al Pământului și s-au datorat, fie unor cauze exogene de natură cosmică (schimbarea intensității radiației solare, modificarea axei globului etc.), fie unor cauze endogene (modificarea structurii suprafeței Pământului ca urmare a diferitelor orogeneze etc.).

Secetă: interval de timp caracterizat prin absența precipitațiilor în cel puțin 14 zile consecutive în perioada rece a anului (octombrie - martie) și în cel puțin 10 zile consecutive în perioada caldă (aprilie - septembrie) sau dacă s-au produs precipitații, acestea nu au depășit 0,1 mm.

Serie climatologică: un set omogen de date compus din variabile aleatorii, discrete sau continue, selecționate dintr-o singură populație cu dimensiuni în general infinite.

Serie omogenă: un set omogen de date de la o stație care indică faptul că estimările statistice vor fi valide pentru parametrii respectivi.

Stație climatică automată: o stație climatologică la care instrumentele transmit sau înregistrează observațiile automat, codificarea datelor fiind făcută fie direct, fie la o stație colectoare.

Stație climatologică: un amplasament special conceput și dotat cu instrumente meteorologice și personal de specialitate care efectuează observații și măsurători asupra elementelor și fenomenelor meteorologice, datele respective fiind apoi prelucrate în scopuri climatologice; poate fi: *s.c. obișnuită* (efectuează observații cel puțin o dată pe zi, inclusiv citirile zilnice ale temperaturilor extreme și măsurarea cantității de precipitații); *s.c. principală* (efectuează observații orare sau de cel puțin patru ori pe zi); *s.c. de referință* (efectuează observații care sunt folosite apoi pentru determinarea tendinței climatice, respectiv beneficiază de șiruri lungi de peste 30 ani și omogene de observații, care nu sunt sau sunt foarte puțin afectate de influențele antropice); *s.c. automată* (stație la care instrumentele și aparatele transmit sau înregistrează automat datele, codificarea acestora fiind făcută fie direct, fie la o stație colectoare); *s.c. pentru scopuri speciale* (efectuează observații numai asupra anumitor elemente specifice sau numai asupra unui anumit element).

Stație meteorologică: un amplasament special conceput și dotat cu instrumente meteorologice și personal de specialitate care efectuează observații și măsurători asupra elementelor și fenomenelor meteorologice, datele respective fiind utilizate imediat pentru prognoza vremii.

Stație pentru precipitații: o stație la care se fac numai observații asupra precipitațiilor.

Strat microclimatic: strat de aer din imediata apropiere a suprafeței terestre (întal de 1,5-2,0 m) în care influența acesteia este deosebit de puternică.

Stres bioclimatic: acțiune cu efect negativ asupra organismului uman determinată de condițiile climatice nefavorabile; poate fi: *s.b. cutanat* (senzațiile de căldură și de frig, dependente de temperatura aerului și de viteza vântului, pe care le resimte organismul uman în procesul termoreglării prin intermediul pielii); *s.b. pulmonar* (senzațiile de sufocare resimțite de organismul uman ca urmare a acțiunii vaporilor de apă asupra mucoaselor căilor respiratorii); *s.b. total* (suma dintre stresul bioclimatic cutanat și cel pulmonar, adică solicitarea globală a

climatului asupra organismului uman atacat simultan la nivelul pielii și al plămânilor).

Suma: totalitatea intervalelor în care s-a produs un fenomen climatic; spre exemplu pentru precipitații se calculează *s. zilnică*; *s. lunară*; *s. anotimpuală*; *s. semestrială*; *s. anuală*; *s. precipitațiilor din perioada de vegetație* (cantitatea totală de precipitații căzută în intervalul în care temperatura aerului depășește 5°C pentru vegetația ierboasă și 10°C pentru cea forestieră); *s. precipitațiilor din perioada rece a anului* (cantitatea totală de apă acumulată în sol în perioada noiembrie-martie care este folosită în următorul an agricol); *s. precipitațiilor din perioada caldă a anului* (cantitatea de precipitații care cade în perioada aprilie-octombrie, utilizată de plante în perioada în care se înregistrează cele mai mari temperaturi).

Sumar climatologic lunar sau sumar lunar: frecvențe, medii sau sume lunare ale observațiilor făcute timp de o lună, cu calculele climatologice aferente.

Sumar climatologic anual sau sumar anual: frecvențe anuale, medii sau sume anuale, împreună cu calculele climatologice aferente.

T

Temperatura: mărime fizică, exprimată în grade Celsius, Réaumur, Fahrenheit, Kelvin etc. care indică starea termică a unui corp; se determină: *t. medie* (valoarea mijlocie a temperaturii aerului obținută prin însumarea valorilor măsurate într-un anumit interval de timp, rezultatul obținut fiind apoi împărțit la numărul valorilor adunate); aceasta poate fi: *t. m. diurnă*; *t. m. lunară*; *t. m. anuală*; *t. m. maximă* (însumarea celor mai mari valori de temperatură măsurate într-un interval de timp de o zi, o lună, un an etc. și împărțirea rezultatului la numărul valorilor însumate); *t. m. minimă* (însumarea celor mai mici valori de temperatură măsurate într-un interval de timp de o zi, o lună, un an etc. și împărțirea rezultatului la numărul valorilor însumate); legat de temperatură se mai utilizează noțiunile de *t. absolută* (valoarea de temperatură exprimată în $^{\circ}\text{K}$, conform scării Kelvin de temperatură); *t. extremă* (cea mai mare sau cea mai mică valoare de temperatură înregistrată într-un anumit interval); *t. echivalent-efectivă* (valoarea optimă pentru organismul uman, cuprinsă între 16 și 22°C); *t. constantă* (valoarea în grade Celsius a temperaturii care reprezintă pragul de la care au loc anumite procese biologice specifice. Depășirea în direcție

pozitivă sau negativă a t. c. produce stoparea procesului respective care se declanșează imediat la revenirea t. c.).

Tendință climatică: creșterea sau scăderea lentă și monotonă a valorii medii a unui element climatic, manifestată printr-o singură maximă sau o singură minimă la capătul șirului de date.

Tip climatic: clima unei regiuni caracterizată prin anumite valori medii și un anumit regim al temperaturii, precipitațiilor și al altor elemente climatice. Tipurile climatice sunt notate adesea cu litere cum este cazul clasificării făcute de Köppen.

Tip de insolație: distribuția verticală a temperaturii aerului și a solului, caracterizată prin valori mari la suprafața solului și valori din ce în ce mai mici, pe măsura creșterii înălțimii sau adâncimii. Este proprie orelor de zi cu timp calm și senin, mai ales vara.

Tip de radiație: distribuția verticală a temperaturii în stratul microclimatic, caracterizată prin valori mari la suprafața solului și valori din ce în ce mai mici, pe măsura creșterii înălțimii sau adâncimii. Este proprie orelor de noapte cu timp calm și senin, în toate anotimpurile.

Tip de timp: totalitatea condițiilor meteorologice determinate de un anumit tip de circulație atmosferică.

Topoclimatologie: ramură a climatologiei care studiază topoclima.

Topoclima: ansamblul variațiilor înregistrate de elementele meteorologice din cadrul complexelor fizico-geografice și economico-geografice, incluzând deosebirile față de regiunile înconjurătoare și particularitățile microclimatice existente în limitele lor, ca urmare a influenței specifice exercitate de suprafața activă.

U

Uscăciune: interval de timp caracterizat prin absența precipitațiilor în cinci zile consecutive sau, dacă a plouat, precipitațiile căzute nu au depășit media zilnică respectivă.

V

Vara fetelor bătrâne: interval de încălzire care se produce frecvent la începutul celei de-a doua decade a lunii noiembrie în Europa de Vest și către sfârșitul lunii octombrie în Europa Centrală.

Variație climatică: o fluctuație sau o componentă a acestei fluctuații, a cărei durată în timp este suficient de lungă pentru a produce o inconstanță semnificativă în cadrul mediilor succesive (normale) pe 30 de ani ale variației respective. Este frecvent folosită pentru a desemna variațiile naturale obișnuite de la un an la altul sau schimbările de la o decadă la alta.

Z

Zăpezi persistente (permanente): straturi de zăpadă care nu se topesc total de la un an la altul. Se găsesc deasupra *limitei zăpezilor persistente*, atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Zi cu cer acoperit: v. cer acoperit.

Zi cu îngheț: interval de timp în care temperatura minimă a fost egală sau mai mică de 0°C .

Zi cu ninsoare: interval de timp în care au căzut fulgi de zăpadă, iar echivalentul în apă al zăpezii căzute este egal sau mai mare de 0,1 mm.

Zi cu ploaie: interval de timp în care cantitatea de apă căzută sub formă de ploaie este egală sau mai mare decât 0,1 mm.

Zi cu precipitații: interval de timp în care cantitatea de apă provenită din precipitații de orice fel este egală sau mai mare de 0,1 mm;

Zi cu strat de zăpadă: interval de timp în care s-a consemnat strat de zăpadă continuu.

Zi cu strat de zăpadă stabil: interval de timp în care stratul de zăpadă persistă neîntrerupt într-o perioadă optimă dată.

Zi cu Soare (zi cu cer senin): v. cer senin.

Zi de iarnă: interval de timp în care temperatura maximă a fost egală sau mai mică de 0°C .

Zi de vară: interval de timp în care temperatura maximă a fost egală sau mai mare de 25°C .

Zi noroasă (cu nebulozitate trecătoare): v. cer noros.

Zi tropicală: interval de timp în care temperatura maximă a fost egală sau mai mare de 30°C .

Zonal: calificativ aplicat fenomenelor geografice care depind ca formă, evoluție sau răspândire de zonalitatea climatică (soluri zonale, vegetație zonală etc.); *azonal* este un fenomen independent de un anumit tip de climă (de exemplu: solul de luncă); *extrazonal* este un fenomen caracteristic unei zone, dar întâlnit totuși pe alocuri și în altă zonă; *polizonal* este acel fenomen întâlnit în mai multe zone.

Zonalitate geografică: organizarea majorității fenomenelor fizico-geografice de la suprafața globului și în primul rând a celor climatice în fâșii numite zone, dispuse aproximativ în lungul paralelelor și succedându-se de la ecuator spre poli și în altitudine în funcție de curbele de nivel. Z. g. provine de la sfericitatea Pământului.

Zone climatice: suprafețe ale Pământului dezvoltate longitudinal și având condiții climatice care le disting net unele de altele: z. c. *ecuatorială*; z. c. *subecuatorială*; z. c. *tropicală*; z. c. *subtropicală*; z. c. *temperată*; z. c. *subpolară*; z. c. *polară*.

Zone climatice verticale: etaje climatice care se succed în munți, ca urmare a modificărilor cantitative (valorile) și calitative (regimurile) ale tuturor elementelor.

INSTITUTUL DE METEOROLOGIE ȘI HIDROLOGIE

TABELA LUNARĂ CU DATE DIN OBSERVAȚII METEOROLOGICE DE LA TERMENELE CLIMATOLOGICE

alla meteorologia

Nr. _____ Județul _____

board. reggr. a

五

3

4

3

Two

19

TM-11

[illegible]

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

TABELA LUNARĂ CU CANTITATEA ȘI DURATA ORARĂ A PLOILOR

TN-4

Stația meteorologică Nr. Județul Luna Anul
 Latitudinea (φ) Longitudinea (λ) Alitudinea m. Pluviograf Up. Seria

Zila	Cantitatea de precipitații (mm) în 24 de ore																								Durata precipitațiilor în 24 h 0 h-24 h
	După pluviograf		Pluviometrul IMG																						
	0 h-24 h	15 h-19 h	19 h-15 h																						
1	0-1																								
2	1-2																								
3	2-3																								
4	3-4																								
5	4-5																								
6	5-6																								
7	6-7																								
8	7-8																								
9	8-9																								
10	9-10																								
11	10-11																								
12	11-12																								
13	12-13																								
14	13-14																								
15	14-15																								
16	15-16																								
17	16-17																								
18	17-18																								
19	18-19																								
20	19-20																								
21	20-21																								
22	21-22																								
23	22-23																								
24	23-24																								
Suma																									

Descrierea plășilor formajale
 Însemnări speciale
 Șeful stației Tabela înlocuită de Control tehnic la stație efectuat de
 Controlul tehnic la Serviciul Meteorologie efectuat de Analiza critică a efectuării de
 Concluzii și observații

INSTITUTUL DE METEOROLOGIE ȘI HIDROLOGIE

TABELA LUNGĂ CU DATE OABRE DE

TM-5

Legea..... Anul.....

Stația meteorologică..... Nr..... Județul..... Latitudinea (φ)..... Longitudinea (λ)..... Altitudinea..... m
Inregistrator..... TP..... Nr..... Invențiar special.....

Ziua		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Suma 1-12	13	14	15	16	17	18	Suma 13-18	19	20	21	22	23	Suma 19-23	24	Suma 1-24	25	26	27	28	29	30	31	Suma 1-31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	...</
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	--------------	----	----	----	----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	---------------	----	--------------	----	----	----	----	----	----	----	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Luna..... April

[illegible]

• Se vor înscrie oca și mbratul răsăritului și apusul de soare, după ora locală, în zilele cu timp senin.

INSTITUTUL DE METEOROLOGIE ȘI HIDROLOGIE

Anul..... luna.....

TM-6

TABELA

cu datele orare ale duratelor de
STRĂLUCIRE A SOARELUI

Stația

Județul

Nr.

$\varphi = \dots\dots\dots$ N, $\lambda = \dots\dots\dots$ E Gr, Hs = $\dots\dots\dots$ m

Heliograf sistem Nr. de fabricație

Înălțimea heliografului deasupra solului m

Observații speciale privind obstacole ce umbresc heliograful

Numele observatorului

Controlul tehnic la stație,
executat de

Controlul tehnic la Serv. Meteorologic,
efectuat de

Analiza critică executată de

Durata efectivă
Durata posibilă
Fracția de insolație
Maximum în 24 de ore la
Zile cu soare
Zile fără soare

Concluzii

.....

.....

.....

.....

.....

**TABELA CU OBSERVAȚII ASUPRA
DEPUNERILOR DE GHEAȚĂ PE CONDUCTOARE**

TM-7,

Anul : Luna :

Stația meteorologică _____ Nr. _____ Județul _____

Latitude _____ Longitude _____ Altitude _____

Inseamnări speciale

Sejul stalet meteorologicke

Tabelă întocmită de _____ Control tehnic primar efectuat de _____

Controlul tehnic la Serv. Meteorologic efectuat de

Analiza critică efectuată de

Concluzii și observații

[illegible]

TM-7

Stația	Luna	Anul
--------	------	------

[illegible]

Time of era	Observation	Time of era	Observation

182

Anul -----
 Stația meteorologică ----- Nr. ----- Județul -----
 Latitudine (φ) ----- Longitudine (λ) ----- Altitudine (h) -----
 Heliograf tip ----- Seria ----- Înălțimea heliografului -----
 Locul de instalare a heliografului -----
 Însemnări speciale privind obstacolele ce umbresc heliograful -----
 Tabela înțermită de ----- Control tehnic efectuat de -----
 Analiza critică efectuată de -----
 Concluzii și observații -----

TM 16

Sume ore (ore și zecimi)

Anul.....

Stația..... Nr.....

Oră	3 ³⁰ -4 ³⁰	4 ³⁰ -5 ³⁰	5 ³⁰ -6 ³⁰	6 ³⁰ -7 ³⁰	7 ³⁰ -8 ³⁰	8 ³⁰ -9 ³⁰	9 ³⁰ -10 ³⁰	10 ³⁰ -11 ³⁰	11 ³⁰ -12 ³⁰	12 ³⁰ -13 ³⁰	13 ³⁰ -14 ³⁰	14 ³⁰ -15 ³⁰	15 ³⁰ -16 ³⁰	16 ³⁰ -17 ³⁰	17 ³⁰ -18 ³⁰	18 ³⁰ -19 ³⁰	19 ³⁰ -20 ³⁰	20 ³⁰ -21 ³⁰	SUMA	MEDIA	DURATA POSIBILĂ	Fracția de insolație	Nr. DE ZILE cu SOARE
I																							
II																							
III																							
IV																							
V																							
VI																							
VII																							
VIII																							
IX																							
X																							
XI																							
XII																							
total																							

SECTIUNEA 3 (333//)													GRUPE SPECIALE													
ORA UTC																										
Z	VTC	h _m	l _a	h	km	VV	N	da	ff	cod	Vr	V _m	CI	CII	s _a	TTT	Uh	Tv	D _a	s _a	T ₂ T ₃	T ₃	T ₄	P _b	P _{cb}	P _{cbp}
	00														1						2					
	1														1						2					
	2														1					2						
	3														1					2						
	4														1					2						
	5														1					2						
	06														1					2						
	7														1					2						
	8														1					2						
	9														1					2						
	10														1					2						
	11														1					2						
	12														1					2						
	13														1					2						
	14														1					2						
	15														1					2						
	16														1					2						
	17														1					2						
	18														1					2						
	19														1					2						
	20														1					2						
	21														1					2						
	22														1					2						
	23														1					2						

Temperaturi extreme aer		Stare sup. solid		Tempe. extreme su		Stare total		Gros. Srat. Alupa	
Valoare	Unitate	Valoare	Unitate	Min	Max	Min	Max	Min	Max
T ₁ T ₂ T ₃	T ₁ T ₂ T ₃	Capacitor	Capacitor	T ₁ T ₂ T ₃	T ₁ T ₂ T ₃	T ₁ T ₂ T ₃	T ₁ T ₂ T ₃	Capacitor	E ₁
								Capacitor	E ₂
									4
									4
									4
1 _a , 1 _b , 1 _c , 1 _d	2 _a , 2 _b , 2 _c , 2 _d								
1	2								
3 _a , 3 _b , 3 _c	2 _a , 2 _b , 2 _c								
1	2								

DL	O°C	Po	Nut	ppps/ s ₀ bhh	scma	a	ppp	fa clar	RRR	t _g	Start timp	ww	Start timp	V ₁	Start timp	W ₁	N ₀	Gen	C ₀	Gen	C ₀	Nume
00	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
01	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
02	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
03	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
04	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
05	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
06	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
07	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
08	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
09	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

SECTIONEA 5 (555/7)
 06 UTC 6RRRR 07 UTC 55555

FENOMENE METEOROLOGICE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- ALISOV, B. P., DROZDOV, O. A., RUBINSTEIN, E. S. (1952), *Kurs Klimatologhiji*, Ghidrometeoizdat, Leningrad.
- APETREI, M., GROZA, O., GROSLAND, C. (1996), *Elemente de statistică cu aplicații în geografie*, Ed. Univ. "Al. I. Cuza" Iași.
- ARDELEAN, I., BARNEA, M. (1972), *Elemente de biometeorologie medicală*, Editura Medicală, București.
- ARLERY, R., GRISOLLET, H., GUILMET, B. (1973), *Climatologie, méthodes et pratiques*, 2^e éd., Gauthier – Villars, Paris.
- BACINSCHI, D., BURCIU, Gh. (1981), *Meteorologie*, Edit. Did. și Ped., București.
- BAIBAKOVA, E. M., ILICEVA, E. M., NEVRAEV, B. A., ȘVAREVA, I. N. (1964), *Metodika izucenia i schema opisania klimata kurortov*, Tînt. naucino – isledov. inst. kurort. i fiziot., Moskva.
- BALAFOUTIS, C., MAHERAS, P. (1983), *The climatic conditions of the coastal areas at Thesaloniki during the high touristic period*, Scientific Annals of the Faculty of Sciences, Aristotelian University of Thessaloniky, t. XXIII.
- BALSEINTE, R. (1966), *Climats montagnards et stations climatiques d'altitude en France. Essai méthodologique de bioclimatologie humaine et pré-médicale. Introduction à un aménagement climatique des montagnes française*, Fabre, Paris.
- BARBIERRE, E.B. (1981), *O fator climatico nos sistemas territoriais de recreação*, Revista brasileira de geografia, t. XLIII, n^o 2.
- BASILE, R. M., CORBIN, S. M. (1969), *A Geographical method for determining Thornthwaite climate classification*, Annals of the Association of American Geographers.
- BĂLESCU, O.I. (1962), *Condițiile sinoptice care favorizează depunerile de gheață în R.P.R., M.H.G.A.*, VII, 4, București.
- BELOZEROV, V., FĂRCAȘ I. (1971), *Îndrumător metodologic pentru lucrările practice de meteorologie și climatologie*, Univ. "Babeș - Bolyai" Cluj.
- BESANCENOT, J.P. (1987), *Les bioclimats humains en façade méditerranéenne de l'Europe. Etude géographique des effets physiologiques, psychiques et pathologiques d'une ambiance climatique sur les hommes*, Centre de Recherches de Climatologie, Dijon.
- BESANCENOT, J. P. (1990), *Climat et tourisme*, Masson, Paris.
- BESANCENOT, J.P., MOUNIER, J., LAVENNE, F. de (1978), *Les conditions climatiques du tourisme litoral : une méthode de recherche compréhensive*, Norois, t. XXV, n^o 99.

- BOGDAN, Octavia (1978), *Fenomene climatice de iarnă și de vară*, Edit. Șt. și Enciclop., București.
- BOGDAN, Octavia (1980), *Potențialul climatic al Bărăganului*, Editura Academiei R.S.R., București.
- BOGDAN, Octavia (1981), *Fenomene caracteristice întregului an – uscăciunea și seceta*, Studii geografice cu elevii asupra calității mediului, Editura Didactică și Pedagogică, București.
- BOGDAN, Octavia, MIHAI, Elena, TEODOREANU, Elena (1974), *Clima Carpaților și Subcarpaților de Curbură dintre Teleajen și Slănicul Buzăului*, Institutul de Geografie al Academiei Române, București.
- BOGDAN, Octavia, NICULESCU, Elena (1999), *Riscurile climatice din România*, Sega International, București.
- BURNET, L. (1963), *Villégiature et tourisme sur le côtes de France*, Hachette, Paris, Bibliothèque des Guides Bleus.
- BURNET, L. (1970), *Climat et vie balnéaire*, Espaces. Tourisme, Loisirs, Environnement, n° 1.
- CHIRIAC, V., CIREȘ, C., RADULESCU, Sirena (1968), *Variația de lungă durată a precipitațiilor și temperaturii aerului la Iași*, Cul. de lucr. de meteo. pe anul 1966, C.S.A., I.M., București.
- CIUBUKOV, L. A. (1949), *Kompleksnaia klimatologhija*, Izd. A. N., Moskva.
- CLAUSSE, R., GUEROUT, A. (1955), *La durée des précipitations, indice climatique ou élément de climatologie touristique*, La Météorologie, n° 37.
- CONRAD, V., POLLAK, L.D. (1967), *Methods in climatology*, Harvard Univ. Press Cambridge, Massachusetts.
- CRIVEANU, H., BOZAC, Rodica (1991), *Îndrumător pentru lucrările practice de fizică și agrometeorologie*, Cluj-Napoca.
- CROWE, R. B., MCKAY, G. A., BAKER, W. M. (1977), *Le climat de l'Ontario et son influence sur le tourisme et les loisirs de plein air. I. Objectifs et définitions des saisons. II. Été. III. Hiver.*, Environment Canada / Atmospheric Environment, Toronto.
- DAUPHINE, A., GHILARDI, N. (1978), *Essai de bioclimatologie touristique: la Côte d'Azur, Méditerranée*, n° 3.

- DAVIS, N.E. (1968), *An optimum summer weather index*, Weather t. XXIII, n° 8.
- DINCĂ, Ileana, PATRICHI, Silvia, MIHA, Iosefina, ȚEPEȘ, Elena (1972), *Fluctuațiile de lungă durată ale precipitațiilor în bazinul Transilvaniei*, Cul. de lucr. de meteo. pe anul 1969, C.S.A., I.M., București.
- DINCĂ, Ileana, PATRICHI, Silvia, MIHA, Iosefina, ȚEPEȘ, Elena (1973), *Fluctuațiile de lungă durată ale precipitațiilor atmosferice în Moldova*, Cul. de lucr. de meteo. pe anul 1970, C.S.A., I.M., București.
- DONCIU, C. (1958), *Evapotranspirația în R.P.R.*, M.H.G.A., 1, București.
- DONCIU, C. (1959), *Contribuții la caracterizarea climei R.P.R.*, M.H.G.A., 2, București.
- DONCIU, C. (1963), *Abace de calcul al evapotranspirației potențiale și al bilanțului apei din sol*, M.H.G.A., 1, București.
- DONCIU, C. (1965), *Contribuții la studiul evapotranspirației potențiale în R.S.R.*, M.H.G.A., 9, București.
- DRAGOTĂ, Carmen (1994), *Particularități în distribuția pe teritoriul României a înghețului în aer*, A.U.O., Tom IV, Oradea.
- DRAGOTĂ, Carmen (1995), *Tendința evoluției și probabilitatea de producere a înghețului în Câmpia Crișurilor*, A.U.O., Tom V, Oradea.
- DRAGOTĂ, Carmen, VASENCIUC, Felicia, MATEESCU, Elena, RĂTOIU, Zoe (1999), *Stâna de Vale – caracteristicile favorabile activităților turistice*, A.U.O., Tom IX, Oradea.
- DRAGOTĂ, Carmen, RĂTOIU, Zoe, SĂRARU, L. (1999), *Indicele climato – turistic pe traseul Băișoara – Vlădeasa – Stâna de Vale – Oradea*, A.U.O., Tom IX, Oradea.
- DUMITRESCU, Elena, GLĂJA, Maria (1972), *Metodica prelucrării datelor climatologice*, Centrul de multiplicare al Universității din București.
- DUMITRESCU, Elena (1973), *Curs de meteorologie-climatologie*, Litografia Univ. Buc., București.
- ERHAN, Elena (1979), *Clima și microclimatele din zona orașului Iași*, Edit. Junimea, Iași.
- ERHAN, Elena (1999), *Meteorologie și climatologie practică*, Edit. Univ. "Al. I. Cuza" Iași.
- ESCOURROU, Giselle (1978), *Climatologie pratique*, Masson, Paris.
- ESCOURROU, P. (1980), *Climat et tourisme sur les côtes françaises de Dinard à Biarritz*, Paris.

- ESCOURROU, P. (1989), *Les critères d' étude de biométéorologie humaine*, Climat et santé. Cahiers de bioclimatologie et biométéorologie, nr. 1.
- ESTIENNE, P., GODARD, A. (1970), *Climatologie*, A. Colin, Paris, coll. "U".
- FANGER, P.O. (1970), *Thermal comfort*, Mc Graw Hill, New York, Düsseldorf.
- FĂRCAȘ, I. (1988), *Măsurători și calcule de meteorologie*, partea a II-a, *Metodologia prelucrării și interpretării datelor climatice*, Cluj – Napoca.
- FĂRCAȘ, I., BENTE, D., TRIFA, P. (1968), *Indicele climatic – turistic. Aplicații la teritoriul Republicii Socialiste România*, Studia Universitatis Babeș – Bolyai, fasc.1, Cluj.
- FĂRCAȘ, I., BENTE, D., TRIFA, P. (1970), *Harta climatică – turistică a Republicii Socialiste România*, Studia Universitatis Babeș – Bolyai, fasc.2, Cluj.
- FERGUSON, P. (1964), *Summer weather at the English seaside*, Weather, t. XIX, n° 5.
- FLOCAS, A.A. (1975), *Winter and summer indices in Athens*, Scientific Annals of the Faculty of Physics and Mathematics, Aristotelian University of Thessaloniki, t. XV.
- GACEU, O. (1997), *Regimul termic al stațiunii balneoclimaterice Stâna de Vale*, A.U.O., Seria Geografie, Tom VII.
- GACEU, O. (1998), *Regimul pluviometric al stațiunii balneoclimaterice Stâna de Vale*, A.U.O., Seria Geografie, Tom VIII.
- GATES, A. D. (1975), *Le climat des Maritimes en fonction du tourisme et des loisirs de plein air*, Environment Canada / Atmospheric Environment, Toronto.
- GRIFFITHS, I. (1978), *Applical climatology: an introduction*, Univ. Press Oxford.
- GRISOLLET, H., GUILMET, B., ARLERY, R. (1962), *Climatologie – Méthodes et pratiques*, Gauthier Villard, Paris.
- GUGIUMAN, I. (1973), *O nouă metodă de construire a rozei vânturilor*, Terra, 1, București.
- HEURTIER, R. (1968), *Essai de climatologie touristique synoptique de l'Europe occidentale et méditerranéenne pendant la saison d'été*, La Météorologie, 5^e Serie, n° 5.
- HEINRICH, W., HELMUTH, L. (1960), *Klimadiagram – Weltatlas*, Web. G. Fischer Verlag, Jena.
- HROMOV, S. P. (1968), *Meteorologhija i klimatologhija dlja geografseskih fakultetov*, Ghidrometeoizdat, Leningrad.

- HUFTY, A. (1976), *Introduction à la climatologie*, P.U.F., Paris, coll. "Magellan" n° 5.
- HUGHES, G.H. (1967), *Summers in Manchester*, Weather, t. XXII, n° 5.
- ILIESCU, Maria-Colette (1994), *Tendance de la variation à longue durée de la température de l'air sur le territoire de la Roumanie*, R.R.G., Tome 38, București.
- ILIESCU, Maria-Colette (1996), *Variația de lungă durată a cantităților de precipitații atmosferice pe teritoriul României*, S.C.G., Tom XXXIX, București.
- ILIESCU, Maria-Colette (1997), *Variabilitatea și variația seculară a presiunii atmosferice*, S.C.G., Tom XLIV, București.
- IONAC, Nicoleta (1998), *Clima și comportamentul uman*, Editura Enciclopedică, București.
- IVANOV, M., VINOGRADOV, M., FETOV, V. (1962), *Nomograme pentru determinarea primului și ultimului îngheț și a duratei perioadei fără îngheț cu diferite asigurări pentru teritoriul R.S.R.*, Cul. de lucr. de meteo., C. S.A., I. M., București.
- IVANOV, M., VINOGRADOV, M., FETOV, V. (1964), *Nomograme pentru determinarea datei trecerii temperaturii medii zilnice a aerului prin - 5°C, 0°C, 5°C, 10°C și 15°C pe teritoriul Republicii Socialiste România*, Cul. de lucr. de meteo., C. S.A., I. M., București.
- KOSTIN, S.V., POKROVSKAIA, T.V. (1964), *Climatologie – Metode de prelucrare a datelor*, Editura Științifică și Enciclopedică, București.
- LUNGU, I. (1962), *Meteorologie și climatologie*, Edit. Did. și Ped., București.
- MARCHAND, J.P. (1986), *Tourisme et contraintes climatiques. L'exemple irlandais*, Bulletin de l'Association de Géographes Français, t. LXIII, n° 5.
- MARCU, M. (1983), *Meteorologie și climatologie forestieră*, Edit. Ceres, București.
- MARIN, I. (1986), *Măsurători și calcule în meteorologie și climatologie*, București.
- MASTERTON, J.M., CROWE, R.B., BAKER, W.M. (1976), *The tourism and outdoor recreation climate of the Prairie provinces*, Environment Canada / Atmospheric Environment, Toronto.
- MATVEEV, L.T. (1964), *Meteorologie generală*, vol. I, C.S.A., I.M., București.
- MAUNDER, W.J. (1970), *The value of the weather*, Methuen and Co., London.
- MAUNDER, W.J. (1986), *The uncertainty business: risks and opportunities in weather and climate*, Methuen and Co., London.

- MAYER, H., HOPPE, P. (1987), *Thermal comfort of man in different urban environments*, Theoretical Applied Climatology, 38, (1).
- MĂHĂRA, GH., POP, GR. P., POSEA, Aurora, BERINDEI, I. O. (1977), *Câmpia Crișurilor, Crișul Repede, Țara Beiușului*, Edit. Științifică și Enciclopedică, București.
- MĂHĂRA, GH. (1979), *Circulația aerului pe glob*, Edit. Șt. și Enciclop., București.
- MĂHĂRA, GH., MĂHĂRA Nadia (1980 - 1981), *Regimul precipitațiilor în zona stațiunii Stâna de Vale din Munții Apuseni*, Nymphaea, Oradea.
- MĂHĂRA, GH. (1994), *Contribuții la stabilirea stresului bioclimatic în depresiunile golf din vestul Munților Apuseni*, A.U.O., Tom. IV.
- MĂHĂRA, GH. (1995-1996), *Stresul bioclimatic pe versantul vestic al Munților Apuseni*, Revista Geografică, tom. II-III, București.
- MĂHĂRA, GH. (2002), *Meteorologie*, Edit. Universității din Oradea, Oradea.
- MĂHĂRA, GH., LINC, Ribana, GACEU, O. (2002), *Umezeala relativă a aerului în județul Bihor*, A.U.O., Tom XI.
- MECZKOWSKI, Z. (1983), *The feasibility and necessity of climatic classification for purposes of tourism*, Proceedings. International Geographical Union Commission for Tourism and Leisure, Lodz Symposium.
- MECZKOWSKI, Z. (1985), *The Tourism climatic index : a method of evaluating world climates for tourism*, The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, t. XXIX, n° 3.
- MISENARD, A. (1937), *L'homme et le climat*, Libr. Plon., Paris
- MOHAN, GH., ARDELEAN, A. (1993), *Ecologie și protecția mediului*, Edit. "Scaiul", București.
- MOUNIER, J. (1980), *Un indice climatique de tourisme estival*, Données météorologiques et climatologiques d'Ille et Vilaine, n° 5.
- MOUNIER, J. (1981), *Une approche globale de description du climat : la climatologie compréhensive*, La Presse thermique et climatique, t. CXVIII, n° 1.
- MUNN, R.E. (1970), *Biometeorological methods*, Acad. Press, New York and London.
- NEACȘA, O., POPOVICI, O., TUINEA, P., POPA, G. (1974), *Contribuții la studiul climei orașului București*, Studii de climatologie, I, I.M.H., București.
- PAGNEY, P. (1985), *La climatologie*, 3^e éd., P.U.F., Paris, coll. "Que Sais-Je", n° 172.

- PAUN, C. (1998), *Carpații dintre Valea Dâmboviței și Valea Buzăului*, Editura Macarie, Târgoviște.
- PAUN, C. (2001), *Aparate meteorologice. Hărți climatologice. Coduri sinoptice*, Editura Oraj, Târgoviște.
- PEGUY, CH. P. (1970), *Précis de climatologie*, 2^e éd., Masson, Paris.
- PERRY, A.H. (1972), *Weather, climate and tourism*, Weather, t. XXVII, n° 5.
- POP, GH. (1988), *Introducere în meteorologie și climatologie*, Edit. Științifică, București.
- POULTER, R.M., (1962), *The next few summers in London*, Weather, t. XVII, n° 8.
- REIFSNYDER W.E. (1979), *A bioclimatology for outdoor recreation*, Wissenschaftliche Mitteilungen, Universität von München, Meteorologisches Institut, n° 35.
- RIVOLIER, J., CAMPONS, R. LEMEE, P., WOLFROMM, R. (1967), *Incidentes biométéorologiques sur le traitement de l'asthme*, Presse thermale et climatique, t.CI, n° 3.
- SARRAMEA, I. (1980), *Un indice climatico – touristique pour quelques stations balnéaires francaises*, Annales de Géographie, t. LXXXIX, n° 495.
- SARGENT, F. JR. (1964), *A survey of human biometeorology*, Technical note n° 65, W.M.O.
- SINGH T.V. (1979), *Climatology of recreation. An appraisal of climate as resource-input in Indian tourism*, Wiener geographische Schriften, n° 53/54, Beiträge für Fremdenverkehrsgeographie.
- SIPLE, P. A., PASSEL, C. F. (1945), *Measurements of dry atmospheric cooling in subfreezing temperatures*, Proceedings of the American Philosophical Society, t. LXXXIX, n° 1.
- SMITH, K. (1975), *Principle of applied climatology*, Mc. Graw – Hill Book Company, London.
- STĂNCESCU, I., BALIFF, S. (1976), *Meteorologie și drumeție*, Edit. Sport – Turism, București.
- STĂNCESCU, I., POPA, Florinela (1997), *Condițiile meteosinoptice care au determinat vremea deosebit de caldă din februarie 1995 în România*, Stud. și cercet. de geogr., XLIV, București.
- ȘEITAN, Octavia, MIHAI, Elena (1966), *Câteva probleme ale climatologiei aplicate*, Natura, ser. geogr.-geol., XVIII, nr. 4.
- SELIANINOV, G.T. (1966), *Agroclimaticeskaja karta mira*, Ghidrometeoizdat, Leningrad.
- STOENESCU, ȘT. M. (1960), *Curs de climatologie a R.P.R.*, Edit. Didactică și Pedagogică, București.

- STOENESCU, ȘT. M., MIHAI, Elena, CAZACU, Gabriela (1967), *Unele particularități ale oscilațiilor diurne ale umezelii relative în zonele de mică altitudine ale teritoriului R.S.R.*, Cul. de lucr. de meteo. pe anul 1967, C.S.A., I.M., București.
- STOENESCU, ȘT. M., ȘCHIOPESCU, Ana, DINCA, Ileana, PATRICHI, Silvia, ȚEPES, Elena, POPESCU, Elena (1968), *Fluctuațiile cronologice ale cantităților de precipitații atmosferice în partea sudică a teritoriului R.S.R.*, Cul. de lucr. de meteo. pe anul 1966, C.S.A., I.M., București.
- ȚĂȘTEA, D., BACINSCHI, D., NOR, R. (1965), *Dicționar meteorologic*, C.S.A., I.M., București.
- TEODOREANU, Elena (1980), *Culoarul Rucăr-Bran. Studiu climatic și topoclimatic*, Edit. Academiei R.S.R., București.
- TEODOREANU, Elena (1994), *Caracteristicile bioclimatice ale perioadei reci a anului*, S.C.G., Tom XLI, București.
- TEODOREANU, Elena (1995-1996), *Caracteristicile bioclimatice ale perioadei calde a anului în România*, Revista Geografică, Tom. II-III, București.
- TEODOREANU, Elena (1997), *Bioclimatul din Carpații Românești și efectele sale asupra organismului uman*, S.C.G., Tom XLIV, București.
- TEODOREANU, Elena (2002), *Bioclimatologie umană*, Editura Academiei Române, București.
- TEODOREANU, Elena, MIHAI, Elena (1968), *Câteva metode de reprezentare grafică a datelor climatice*, Natura, Geogr. – geol., București.
- TEODOREANU, Elena, DACOȘ-SWOBODA, Mariana, VOICULESCU, Camelia, ENACHE, L. (1984), *Bioclima stațiunilor balneoclimaterice din România*, Editura Sport-Turism, București.
- TEODOREANU, Elena, SWOBODA, Mariana (1983), *Thermal comfort in Romania*, R.R.G.G.G.-Géogr., Tom 27., București.
- TERJUNG, W. H. (1968), *Some thoughts on recreation geography in Alaska from a physio – climatic viewpoint*, The Californian Geographer.
- THOM, E. C. (1959), *The discomfort index*, Weatherwise, t. XX.
- TROLL, K. (1943), *Termische klimatypen der Erde*, Peterman Geographische Mitteilungen, 3-4.
- TROMP, S. W. (1980), *Biometeorology. The impact of the weather and climate on humans and their environment*, Heyden, London – Philadelphia – Rheine.
- TUCKER G.W.L.(1965), *The Weather and the holiday-maker, What is weather worth?*, Australian Bureau of Meteorology, Melbourne.

- UJVARI, I., BUZ, V., GALAN, P. (1967), *Indicele de ariditate de tip Selianinov – Budáko pe teritoriul Republicii Socialiste România*, Studia Universitatis Babeş – Bolyai, fasc. 1, Cluj.
- VIERS, G. (1968), *Eléments de climatologie*, F. Nathan, Paris.
- VOICULESCU, M. (2001), *Biogeografie – Caiet de lucrări practice*, Timişoara.
- WELSCH, R. (1972), *Tourisme et météorologie*, Journal de la Météorologie du Sud-Ouest, n° 159.
- *** (1920 - 1960), *Buletinele meteorologice lunare*, I.M.C., Bucureşti.
- *** (1961 - 1972), *Anuarul meteorologic al R.P.R./R.S.R.*, I.M.H., Bucureşti.
- *** (1961 - 2000), *Tabelele TM₁*, Arhiva I.N.M.H., Bucureşti.
- *** (1961), *Instrucţiuni pentru staţiile şi posturile meteorologice*, vol. I, partea I a, *Prelucrarea datelor rezultate din observaţiile meteorologice*, C.S.A., I.M., Bucureşti.
- *** (1962, 1966), *Clima R.P.R./R.S.R.*, C.S.A., I.M.H., Bucureşti.
- *** (1963), *Instrucţiuni pentru staţiile şi posturile meteorologice*, vol. I, partea I a, *Observaţii meteorologice la staţii*, C.S.A., I.M., Bucureşti.
- *** (1963), *Instrucţiuni pentru staţiile şi posturile meteorologice*, vol. IV, *Observaţii agrometeorologice la posturi*, C.S.A., I.M., Bucureşti.
- *** (1965), *Instrucţiuni pentru staţiile şi posturile meteorologice*, vol. V, C.S.A., I.M., Bucureşti.
- *** (1966), *Atlas climatologic al R.S.R.*, C.S.A., I.M., Bucureşti.
- *** (1983), *Atlas internaţional de nori*, I.M.H., Bucureşti.
- *** (1983), *Geografia României, I, Geografia Fizică*, Edit. Academiei, Bucureşti.
- *** (1986), *Culegere de lucrări de climatologie aplicată*, I.N.M.H., Bucureşti.
- *** (1986), *Geografia de la A la Z*, Edit. Şt. şi Enciclop., Bucureşti.
- *** (1990), *Guide de pratique climatologique*, Deuxième édition, O.M.M., Genève.
- *** (1995), *Instrucţiuni pentru staţiile meteorologice*, I.N.M.H., Bucureşti.

BCU/IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY